

ЕЖЕГОДНИКЪ
ТОБОЛЬСКАГО ГУБЕРНСКАГО МУЗЕЯ,
состоящаго подъ АВГУСТЪЙШИМЪ
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМЪ.

Годъ 9.

1901.

Выпускъ XII.

ANNUAIRE
du
Musée de Tobolsk,
placé sous la très Auguste
protection
DE SA MAJESTÉ IMPÉRIALE.

Année 9.

1901.

Livraison XII.

TOBOЛЬСКЪ.
Типографій Епарх. Братства.
1901—1902.

Содержание вышедшихъ выпусковъ „Ежегодника“.

I ВЫПУСКЪ.—Отъ Редакціи.—Отчетъ по Музею за 1892 г.—Текущая хроника Музея.—Статьи и замѣтки, кас. Тоб. Губ. Музея (въ сибирскихъ періодическихъ изданіяхъ за 1892 и 1893 гг.).—Гурскій, И. Поездка на Сѣверный Ураль, Съ кар. и чер. (Изъ дневника).—Газенвинкель, К. Б. Матеріалы для справочно-біографического словаря сибирскихъ дѣятелей. Дѣятели XVI и XVII столѣтій. Князья Шаховскіе, Щербатовы и Мосальскіе.—Палопеженцевъ, Н. И. Народное образованіе въ г. Ялуторовскѣ и Ялуторовскомъ округѣ Тобольской губерніи. Истор.-стат. оч. Часть I. Исторія Ялуторовскихъ школъ (главы I и II).—Терновскій, А. А. Матеріалы для бібліографіи Сибири. Указатель статей и главнѣйшихъ замѣтокъ, касающихся Сибири и помѣщенныхъ въ періодическихъ изданіяхъ 1892 г. Съ алф. указ.—Носовъ, И. Н. Отчетъ отряда преподавателей Красноуфимской сельско-хозяйственной школы и учениковъ Красноуфимского промышленного училища, приглашенныхъ на лѣто 1893 г. въ Тобольскую губернію для мѣропріятій въ борьбѣ съ «кобылкой». Съ табл. рис.

II ВЫПУСКЪ.—Отъ Редакціи.—Отчетъ по Музею за 1893 г.—Проектъ устава Тобольского Губернского Музея, состоящаго подъ Августѣйшимъ покровительствомъ Государя Наслѣдника Цесаревича (Выработанъ 28 февр. и 1 марта 1894 г. въ соединеніи засѣданіи членовъ Правленія и особой Комиссіи, избранной въ общемъ собраніи Комитета 2 февр. 1892 г.).—Текущая хроника Музея.—Терновскій, А. А. Бібліографія и иконографія Тобольского Губернского Музея (съ 1886 года по августъ мѣсяцъ 1894 года). Съ «Указателемъ изданій, въ которыхъ встрѣчаются статьи, замѣтки и даже простыя упоминанія о Тоб. Губ. Музеѣ».—Мамѣевъ, С. Н. Документы, относящіеся къ ссылкѣ Августи Коцебу въ Сибирь въ 1800 г.—Луговскій, Л. Е. Легенда, связанная съ двумя остыаками идолами изъ коллекціи «принадлежностей шаманского культа» въ Тобольскомъ Губернскомъ Музеѣ.—Мамѣевъ, С. Н. Рукописи бібліотеки Тобольского Губернского Музея за XVII и за первую четверть XVIII столѣтій. Опись дозорныхъ, переписныхъ и др. книгъ городовъ Верхотурья, Пелымы, Туринска, Тюмени, Тары и Тобольска съ ихъ уѣздами.Періодъ первый (1622—1645).—Палопеженцевъ, Н. И. Народное образованіе въ г. Ялуторовскѣ и Ялуторовскомъ округѣ, Тобольской губерніи. Истор.-стат. оч. Часть I. Исторія Ялуторовскихъ школъ. Гл. III-IV (послѣдняя). Съ прил.

III ВЫПУСКЪ.—Отъ Редакціи.—Палопеженцевъ, Н. И. Народное образованіе въ г. Ялуторовскѣ и Ялуторовскомъ округѣ, Тобольской губерніи. Истор.-стат. оч. Ч. II. Современное состояніе народного образованія. (Съ картограммой и планами учеб. зав.).—Газенвинкель, К. Б. Матеріалы для справочно-біографического словаря сибирскихъ дѣятелей. Дѣятели XVI и XVII столѣтій. IX. Князья Ростовскаго дома. (Съ прил. родословной росписи).—Костюрина, М. Н. Сибирская народная пѣснь, записанная въ подгородныхъ деревняхъ около Тобольска лѣтомъ 1894 г. (Съ прим. члена ред. ком. Л. Е. Луговскаго).—Терновскій, А. А. Къ бібліографіи Сибири. Указатель статей и главнѣйшихъ замѣтокъ, касающихся Сибири и помѣщенныхъ въ сибирскихъ періодическихъ изданіяхъ 1893 г. Съ алфавитомъ имёнъ личныхъ, предметныхъ и географическихъ, встрѣчающихся въ «Указателѣ».—Текущая хроника Музея.—Нагорскій, В. Новый способъ замѣны дорогихъ пробковыхъ пластинокъ въ ящикахъ съ коллекціями насѣкомыхъ.

IV ВЫПУСКЪ.—Отъ Редакціи.—Уставъ Тоб. Губ. Музея, утвержденный г.-министромъ земл. и госуд. им. 23 мая 1895 г.—Скалозубовъ, Н. Л. Коллекція образцовъ почвъ Тобольской губерніи, принадлежащая Тобольскому Губернскому Музею. Съ прил. табл. рис.—Якобій, А. И. Заслуж. проф. Остыки сѣверной части Тобольской губерніи. Докладъ, читанный въ соединеніи засѣданіи Тобольского Физико-Медицинского общества и Комитета Тоб. Губ. Музея 28 марта 1895 г. (Съ прил. черт., рис. и карты).

Приложение I. Мелодіи сибирскихъ народныхъ пѣсень, записанные г. S*. (Дополненіе къ статьѣ М. Н. Костюриной въ III вып. «Ежегодника»—«Сибирская народная пѣснь»).

Приложение II. Труды Комитета по устройству сельско-хозяйственной и кустарной выставки въ г. Курганѣ въ 1895 г. Вып. I.—Скалозубовъ, Н. Л. Опытъ обзора крестьянскихъ промысловъ Тобольской губерніи. (Съ алф. предм. указ.).

V ВЫПУСКЪ.—Отъ Редакціи.—Отчетъ по Музею за 1894 г.—Скалозубовъ, Н. Л. О дальнѣйшемъ направлении дѣятельности Тобольского Губернского Музея.—Шапошниковъ, К. А. О научномъ направлении дальнѣйшей дѣятельности Тоб. Губ. Музея.—Скалозубовъ, Н. Л. О работахъ по борьбѣ съ кобылкою въ 1895 г. въ Тобольской гу-

ЕЖЕГОДНИКЪ
ТОБОЛЬСКАГО ГУБЕРНСКАГО МУЗЕЯ,
состоящаго подъ АВГУСТЪЙШИМЪ
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМЪ.

Годъ 9.

1901.

Выпускъ XII.

— 1480 —

ANNUAIRE
du
Musée de Tobolsk,
placé sous la très Augste
protection
DE SA MAJESTÉ IMPÉRIALE.

Année 9.

1901.

Livraison XII.

— * —
ТОБОЛЬСКЪ.
Типографія Епарх. Братства.
1901—1902.

Печатать разрешается. 9 Марта 1902 года.

ОГЛАВЛЕНИЕ.



I.

ПРОТОКОЛЪ засѣданія общаго годичнаго собранія членовъ Тобольскаго Губернскаго Музея 4 апрѣля 1899 г.	3—5
ОТЧЕТЬ секретаря Распорядительнаго Комитета Тобольскаго Губернскаго Музея за 1897 и 1898 гг. А. О. Ушарова	6—18
ОТЧЕТЬ консерватора Тобольскаго Губернскаго Музея за 1897 и 1898 гг. Н. Л. Скалозубова	19—32
ОТЧЕТЬ о состояніи библіотеки Тобольскаго Губернскаго Музея за 1897 и 1898 гг. А. А. Терновскаго	33—42
ОТЧЕТЬ по продажѣ изданій, принадлежащихъ Музею и отданныхъ ему на комиссію, за 1897 и 1898 гг. А. О. Ушарова	43—47
ОТЧЕТЬ по продажѣ издѣлій и коллекцій изъ Уральскихъ камней за 1897 и 1898 гг. А. О. Ушарова	48
ДЕНЕЖНЫЙ ОТЧЕТЬ по Тобольскому Губернскому Музею за 1897 и 1898 гг. С. М. Трусова	50—55
АКТЪ Ревизіонной Комиссіи	56—57
СОСТАВЪ Тобольскаго Губернскаго Музея къ 1 января 1899 г.	61—69

II.

ХРОНИКА МУЗЕЯ за 1894—1897 гг. Консерватора Музея Н. Л Скалозубова	1—24
РѢКА ТУРА. Къ вопросу объ улучшеніи ея фарватера и сооруженіи желѣзной дороги до Тобольска. И. С.	1—11
ОСТЯЦКАЯ ЛЕГЕНДА о сотвореніи міра. А. Штернберга.	12—15

ПОЧВЫ ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ. Проф. Император- ского Казанского университета А. Я. Гордягина	16—115
НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ. Н. Л. Скалозубова	116—126

III.

Краткая программа для собирания этнографическихъ свѣдѣній по Тобольской губерніи.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.



ОТЧЕТЬ
по
Тобольскому Губернскому Музею,
состоящему
подъ августѣйшимъ
его императорскаго величества
покровительствомъ
за 1897 и 1898 гг.

здесь же включены протоколы заседаний Академии наук СССР по вопросам ядерной физики и атомной энергии, а также по вопросам ядерной физики и атомной энергии в СССР. Всего в книге опубликовано 120 протоколов заседаний Академии наук СССР по вопросам ядерной физики и атомной энергии, из которых 100 — по вопросам ядерной физики и атомной энергии в СССР.

ПРОТОКОЛЪ

заѣданія общаго годичнаго собранія членовъ Тобольскаго Губернскаго Музея, состоящаго подъ Августѣйшимъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА покровительствомъ, 4-го апрѣля 1899 года.

На основаниі § 34 Устава Тобольскаго Губернскаго Музея, члены его были приглашены въ общее годичное собрание, назначенное на 4-е апрѣля въ залъ зданія Музея, куда къ 1 часу пополудни и прибыли: 1) г. предсѣдатель Распорядительного Комитета Л. М. Князевъ, гг. члены Комитета: 2) А. А. Терновскій, 3) Н. П. Бутенко, 4) С. М. Трусовъ и 5) секретарь А. Н. Судницынъ; гг. члены Ревизіонной Комиссіи: 6) А. А. Смолевъ, 7) В. П. Васильевскій, 8) А. А. Городковъ, и гг. члены Музея: 9) И. А. Андронниковъ, 10) Л. Г. Беренсъ, 11) Н. Н. Де-Карлино, 12) А. А. Дунинъ-Горкавичъ, 13) С. П. Каффка, 14) Н. Г. Козловъ, 15) М. Н. Костюрина, 16) Е. В. Кузнецовъ, 17) И. П. Львовъ, 18) свящ. Д. А. Матвеевъ, 19) С. И. Москалевичъ, 20) П. Я. Новомбергскій, 21) И. И. Покровскій, 22) Ф. А. Преображенскій, 23) протоіерей Н. Д. Скосыревъ, 24) И. И. Сапожниковъ, 25) Е. Ф. Соколовъ, 26) И. И. Сухановъ, 27) В. А. Энгельфельдъ и 28) Л. Е. Юденичъ.

Согласно § 44 Устава Музея, собрание это, какъ назначеннное вторично, признано состоявшимся и засѣданіе объявлено открытымъ.

1.—Предсѣдатель собранія, открывая годичное засѣданіе, заявилъ о кончинѣ секретаря и члена-соревнователя Музея Льва Евграфовича Луговскаго, послѣдовавшой 21-го юня 1898 г.; по предложенію г. предсѣдателя, память покойнаго собраніе по-

чило вставаніемъ. Затѣмъ было выяснено общее положеніе дѣль Музея, при чемъ г. предсѣдатель указалъ на недостатокъ средствъ, какъ на обстоятельство, главнымъ образомъ задерживавшее развитіе дѣятельности Музея за то время, котораго касаются имѣющіе быть доложенными собранію отчеты.

2.—Секретарь А. Н. Судницынъ прочелъ отчетъ¹⁾ о дѣятельности Музея, какъ Общества, за 1897—1898 гг., который и былъ утвержденъ собраніемъ.

3.—Прочитанъ и утвержденъ отчетъ консерватора Музея за 1897 и 1898 гг.

4.—Прочитанъ и утвержденъ отчетъ библиотекаря Музея за 1897 и 1898 гг.

5.—Прочитанъ отчетъ казначея о приходѣ и расходѣ суммъ Музея и актъ Ревизіонной Комиссіи; отчетъ былъ утвержденъ.

6.—Прочитана смета оборота суммъ Музея на 1899-й годъ, составленная въ засѣданіи Распорядительного Комитета 2-го февраля 1899 г. Смета была утверждена собраніемъ.

7.—По предложенію г. предсѣдателя, собраніе, на основаніи примѣчанія къ § 24-му Устава, утвердило въ должностяхъ членовъ Комитета дѣйствительныхъ членовъ Музея А. Н. Судницина и А. О. Ушарова на срокъ до окончанія трехлѣтія.

8.—Предсѣдатель собранія сообщилъ объ утвержденіи г. Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 9-го марта 1899 года новаго Устава Музея. *Постановлено:* принять къ свѣдѣнію и руководству.

9.—По предложенію г. предсѣдателя, собраніе, на основаніи §§ 23 и 41 новаго Устава Музея, приступило къ избранію двухъ членовъ въ составъ Распорядительного Комитета и трехъ членовъ и двухъ кандидатовъ къ нимъ въ составъ Ревизіонной Комиссіи, при чемъ избранными оказались: въ члены Комитета—М. Н. Костюрина и В. А. Энгельфельдъ, въ члены Ревизіонной Ко-

¹⁾ Отчетъ составленъ членомъ Музея А. О. Ушаровымъ.

Примѣчаніе Редакціонной Комиссіи.

миссії—В. П. Васильевскій, А. А. Городковъ и А. А. Смолевъ и кандидатами къ нимъ—И. П. Львовъ и Е. Ф. Соколовъ.

10.—Въ 3¹/₂ ч. пополудни г. предсѣдателемъ собраніе было объявлено закрытымъ.

Съ подлиннымъ вѣрно. За секретаря *A. Ушаровъ.*

— 6 —
автогомъ А. А. и автодочеръ А. А. діланжановъ. П. И. — писакъ
автогомъ О. М. и автодочеръ Н. И. — акия же инвалидка и
онъд синдромъ автоготадаэри въ кикубоной. въ 1898 годѣ
котвимыши ономаго

ОТЧЕТЬ

Секретаря Распорядительного Комитета Тобольского Губернского
Музея за 1897 и 1898 гг.

(Составленъ членомъ Музея А. Ф. Ушаровымъ).

1-го января 1897 года кончился срокъ дѣятельности должностныхъ лицъ прежняго состава Распорядительного Комитета и комиссій. Въ виду этого въ общемъ годичномъ собраніи членовъ Музея 12-го октября 1897 г., согласно § 39 Устава, закрытой баллотировкой былъ избранъ новый составъ должностныхъ лицъ Музея на слѣдующее трехлѣтіе, т.-е. по 1-е января 1900 г.

Въ Распорядительный Комитетъ избранными оказались: предсѣдателемъ—Леонидъ Михайловичъ Князевъ, товарищемъ предсѣдателя—Михаилъ Федоровичъ Фроловъ-Багреевъ, секретаремъ—Николай Яковлевичъ Новомбергскій, консерваторомъ Музея—Николай Лукичъ Скалозубовъ, помощникомъ консерватора—Николай Петровичъ Бутенко, библіотекаремъ—Анатолій Александровичъ Терновскій, помощникомъ библіотекаря—Марія Николаевна Костюрина и казначеемъ—Степанъ Макаровичъ Трусовъ.

Въ составъ Ревизіонной Комиссіи вошли: Александръ Александровичъ Смолевъ, Владимиръ Петровичъ Васильевскій, Алексѣй Александровичъ Городковъ; кандидаты къ нимъ—Николай Степановичъ Знаменскій и Николай Николаевичъ Де-Карлино.

Въ члены Редакціонной Комиссіи избраны: Николай Лукичъ Скалозубовъ, Анатолій Александровичъ Терновскій, Левъ Евграфовичъ Луговскій.

Въ избранномъ составѣ должностныхъ лицъ Музея за отчетное время произошли слѣдующія измѣненія:

21-го іюня 1898 г. скончался членъ Редакціонной Комиссіи Л. Е. Луговскій. Въ засѣданіи Распорядительного Комитета 12 октября 1897 г. Н. Я. Новомбергскій отказался отъ возложенныхъ на него обязанностей секретаря Комитета. Въ томъ же засѣданіи Комитета, на основаніи примѣчанія къ § 24 Устава, вмѣсто выбывшаго былъ приглашенъ секретаремъ дѣйствительный членъ Музея Іосифъ Августовичъ Кучинскій. За выбытиемъ послѣдняго изъ состава Комитета, на основаніи того же примѣчанія, въ засѣданіи Распорядительного Комитета 3-го октября 1898 г. для исполненія обязанностей секретаря былъ приглашенъ дѣйствительный членъ Музея Александръ Никаноровичъ Судницынъ.

Распорядительный Комитетъ за отчетное время имѣлъ 11 своихъ засѣданій (4—въ 1897 и 7—въ 1898 г.) и образовалъ 8 общихъ собраній членовъ Музея (3—въ 1897 и 5—въ 1898 г.). Главными предметами сужденій на этихъ засѣданіяхъ и собранияхъ были: проектъ инструкціи по внутреннему распорядку Музея, составленный Распорядительнымъ Комитетомъ; вопросъ объ измѣненіи нынѣ дѣйствующаго Устава Музея, возникшій совмѣстно съ указаннымъ проектомъ инструкціи, и вопросъ по изслѣдованию кустарныхъ промысловъ въ Тобольской губерніи.

За послѣднее время дѣятельность Музея, какъ хранилища коллекцій и материаловъ для знакомства съ губерніею, уже достаточно ясно опредѣлилась. Явился вопросъ о систематизації, изученіи и популяризациіи собранныхъ богатыхъ материаловъ Музея, знакомящихъ съ разными сторонами жизни и природы губерніи. На этой почвѣ возникла мысль о составленіи особой инструкціи, опредѣляющей минимумъ обязанностей должностныхъ лицъ Музея, ихъ взаимное отношеніе и условія, въ которыхъ явилась бы возможность работать вмѣстѣ, не мѣшая другъ другу. Распорядительнымъ Комитетомъ, на основаніи § 28 Устава, и былъ составленъ проектъ такой инструкціи, подъ заглавіемъ: „Инструкція, опредѣляющая обязанности Правленія и членовъ Музея въ

отношениі достижениі Музеемъ цѣлей, изложенныхъ въ § 1 его Устава¹⁾). Этотъ проектъ быль разсмотрѣнъ и одобренъ въ засѣданіи Комитета Музея 20 сентября 1897 года, а затѣмъ онъ быль представленъ на обсужденіе и утвержденіе общаго годичнаго собранія членовъ Музея 12 октября 1897 года. По недостатку времени, обсужденіе проекта въ общемъ собраніи было отклонено и вновь передано на пересмотръ Комитету, тѣмъ болѣе, что при выработкѣ инструкціи явились разногласія. Въ засѣданіи Комитета 12 октября 1897 года по обсужденіи вопроса объ исполненіи постановленія общаго собранія относительно инструкціи и о расширеніи дѣятельности Музея включеніемъ въ его задачи изученія кустарной промышленности было постановлено помошью публикацій въ мѣстной газетѣ²⁾ пригласить гг. членовъ Музея, интересующихся означенными вопросами, къ участію въ работахъ образуемыхъ по этому поводу комиссій. 15 ноября 1897 года состоялось первое засѣданіе Комитета совмѣстно съ приглашенными членами Музея (П. И. Пановъ, Г. Я. Малышевскій, Н. А. Городковъ, И. П. Львовъ, С. Н. Мамѣевъ, А. Е. Богдановскій, Н. Я. Новомбергскій, В. П. Васильевскій, Л. Е. Луговскій и Е. Ф. Соколовъ) для обсужденія вопросовъ, связанныхъ съ выработкою инструкціи Музея по внутреннему распорядку и вызывающихъ необходимость пересмотра Устава Музея. Секретарь Комитета И. А. Кучинскій при этомъ сдѣлалъ сообщеніе, касающееся указанныхъ вопросовъ, въ которомъ доказывалъ, что выработанная Комитетомъ инструкція не можетъ существовать совмѣстно съ дѣйствующимъ Уставомъ Музея и что, признавая инструкцію вполнѣ цѣлесообразною и соотвѣтствующею задачамъ Музея, онъ считаетъ необходимымъ пересмотрѣть самый Уставъ послѣдняго. Товарищъ предсѣдателя М. Ф. Фроловъ-Багровъ на заключеніе сообщенія секретаря сдѣлалъ замѣчаніе, что нѣтъ необходимости въ измѣненіи дѣйствующаго Устава, такъ какъ онъ вполнѣ удовлетворяетъ цѣлямъ Музея, какъ хра-

¹⁾ Напечатана въ № 75 „Сиб. Листка“ за 1897 г.

²⁾ „Сибир. Лист.“ 1897 г.; объявленія при телеграммахъ №№ 273—276.

нилища различныхъ предметовъ, служащихъ къ наглядному ознакомленію съ культурою Тобольской губерніи, но что для цѣлей научнаго характера при Музеѣ должно существовать особое общество, какъ напр., отдѣлъ Географическаго Общества. Къ этому мнѣнію присоединились М. Н. Костюрина, Н. Я. Новомбергскій, а также Г. Я. Маляревскій, который, кромѣ того, указывалъ на желательность учрежденія при Музеѣ самостоятельнаго общества. Другіе члены (А. Е. Богдановскій, И. П. Львовъ, П. И. Пановъ, А. А. Терновскій, Н. Л. Скалоzубовъ и др.), напротивъ того, доказывали, что „Музей“ по дѣйствующему Уставу является безусловно обществомъ, преслѣдующимъ ученыя и учебныя цѣли, и что расширение границъ его дѣятельности возможно путемъ исправленія нѣкоторыхъ параграфовъ Устава. Послѣднее мнѣніе было принято большинствомъ членовъ и предсѣдателемъ Комитета Л. М. Князевымъ. Затѣмъ, при участіи приглашенныхъ членовъ Музея было приступлено къ разработкѣ проекта измѣненій въ дѣйствующемъ Уставѣ, при чемъ изъ 48 §§ Устава 26 были измѣнены. Въ общемъ экстренномъ собраніи членовъ Музея 9 мая 1898 года представленный на разсмотрѣніе проектъ новаго Устава Музея за малыми поправками былъ единогласно утвержденъ; затѣмъ этотъ проектъ измѣненій дѣйствующаго Устава (утвержденаго 23 мая 1895 года), съ указаніемъ мотивовъ измѣненія былъ препровожденъ (12 ноября 1898 года) черезъ господина Тобольскаго Губернатора на утвержденіе господина Министра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

Параллельно съ обсужденіями объ измѣненіяхъ дѣйствующаго Устава Музея вела свои занятія особая Комиссія по вопросу о расширеніи дѣятельности Музея въ дѣлѣ изученія кустарныхъ промысловъ въ Тобольской губерніи. Эта Комиссія была избрана общимъ собраніемъ членовъ Музея 14 декабря 1896 года. Въ составъ ея вошли: А. Н. Бекневъ, А. Е. Богдановскій, Н. П. Бутенко, В. Ф. Костюринъ, И. А. Кучинскій, Л. Е. Луговскій, Г. Я. Маляревскій, Н. С. Матіясевичъ и Н. Л. Скалоzубовъ. Задачи Комиссіи были слѣдующія: 1) привлеченіе въ составъ членовъ Музея лицъ, полезныхъ въ вышеуказанномъ дѣлѣ; 2) организація

собирания и разработки свѣдѣній о кустарныхъ промыслахъ и ихъ нуждахъ; 3) собирание коллекцій издѣлій и 4) организація помощи кустарямъ. Въ теченіе отчетнаго времени эта Комиссія имѣла 9 засѣданій (по субботамъ), на которыхъ и обсуждались указанные вопросы. Въ самомъ началѣ ея дѣятельности, между прочимъ, выяснилось, что первою ея задачею должно быть собираніе свѣдѣній о кустарной промышленности въ губерніи, для чего она приняла программы¹⁾, выработанныя известнымъ статистикомъ Н. О. Анненскимъ для Казанскаго Губернскаго Бюро. Распорядительный Комитетъ, одобравъ эту программу для цѣлей Комиссіи, постановилъ напечатать ее въ количествѣ около 1000 экземпляровъ. Кроме того, были отпечатаны программы для собиранія свѣдѣній объ ярмаркахъ, такъ какъ ярмарки и продаваемыя на нихъ издѣлія до некоторой степени указываютъ на наличность известнаго промысла въ данномъ районѣ. Принята была программа²⁾ объ ярмаркахъ Статистического Отдѣла Красноуфимской Земской Управы. Въ мартѣ и апрѣлѣ 1898 года эти программы были разосланы по всей губерніи разнымъ лицамъ (гг. учителямъ, священникамъ, чиновникамъ по крестьянскимъ дѣламъ и прч.). До настоящаго времени получено обратно съ отвѣтами 331 экземпляръ, которые распредѣляются по уѣзdamъ такъ:

Курганскій	56	Туринскій	37
Тюменскій	47	Тарскій	26
Ялуторовскій	47	Тюкалинскій	24
Ишимскій	45	Сургутскій	4
Тобольскій	41	Березовскій	4

¹⁾ Программы состоять изъ двухъ листковъ:

А.—Листокъ для общихъ свѣдѣній о крестьянскихъ промыслахъ (съ 9-ю вопросами).

Б.—Листокъ для свѣдѣній объ отдельныхъ промыслахъ (съ 15-ю вопр.).

²⁾ Программы состоять изъ трехъ отдельловъ:

А.—Продукты сельского хозяйства.

В.—Разные товары кустарного издѣлія.

С.—Ввозные товары.

Матеріаль этотъ до сихъ поръ не подвергнутъ еще надлежащей обработкѣ.

Обративъ вниманіе на развитіе кустарныхъ промысловъ въ губерніи, въ одномъ изъ первыхъ засѣданій Комиссіи (21 февраля 1898 г.) членъ ея Н. Л. Скалозубовъ представилъ по этому вопросу докладъ— „О положеніи кустарей д. Малой и Большой Балды“¹⁾, въ которомъ изображалось положеніе кустарныхъ промыловъ по обработкѣ дерева и при этомъ были выяснены условія, тормозящія развитіе этого рода промыловъ. Комиссія постановила докладъ этотъ довести до свѣдѣнія г. управляющаго Государственными Имуществами Тобольской губерніи и просить его принять возможныя мѣры къ облегченію отпуска кустарямъ лѣсного материала.

Кромѣ того, Кустарная Комиссія обратила свое вниманіе также и на условія облегченія кустарямъ кредита. Этому вопросу было посвящено засѣданіе 21 марта 1898 года. Присутствовавшимъ въ этомъ засѣданіи г. управляющимъ мѣстнаго Отдѣленія Государственного Банка было разъяснено, что въ настоящее время сфера дѣятельности Государственного Банка въ области кустарнаго кредита крайне сужена и обусловлена строгими рамками: требуется, чтобы помощь оказывалась не отдѣльнымъ кустарямъ и случайнымъ промысламъ, а лишь промысламъ, имѣющимъ значеніе въ жизни края и широко распространеннымъ въ данной мѣстности.

Затѣмъ Кустарная Комиссія приняла участіе въ организаціи Тобольской артельной мастерской издѣлій изъ мамонтовой кости. Артель образовалась изъ семи лицъ во главѣ со старостою²⁾ и открыла свои дѣйствія 1-го мая 1898 года. Въ засѣданіи Комиссіи 18-го апрѣля 1898 года члены артели, явившись на засѣданіе, обратились къ Комиссіи съ просьбой оказать имъ поддержку, главнымъ образомъ, въ смыслѣ облегченія пріобрѣте-

¹⁾ Червишевской вол., Тюменскаго уѣзда. (См. „Сиб. Лист.“ 1899 г. №№ 61, 62).

²⁾ Старостою былъ избранъ сначала г. Кепельманъ, а 25 окт. 1898 г. артель выбрала вмѣсто него г. Венгерского.

нія матеріала и сбыта готовыхъ издѣлій. На этомъ же засѣданіи былъ прочитанъ договоръ¹⁾, который заключили между собою члены артели. Въ засѣданіи 25 апрѣля, послѣ переговоровъ съ артелью, было постановлено, съ разрѣшенія Распорядительного Комитета, разослать образцы издѣлій изъ мамонтовой кости въ различные города, главнымъ образомъ, для привлеченія заказовъ: напримѣръ, въ С.-Петербургъ (въ „Соляной Городокъ“), въ Москву (въ магаз. „Союзъ“), въ Вятку, Н.-Новгородъ, Омскъ, Пермь. Для ближайшаго наблюденія за счетоводствомъ артели и за выполнениемъ артельщиками принятыхъ на себя обязанностей, по ходатайству артели, Комиссія назначила особаго наблюдателя и кандидата къ нему. Наблюдателемъ надъ артелью былъ избранъ членъ Комиссіи Н. Л. Скалезубовъ, а кандидатомъ къ нему В. Ф. Костюринъ.

Въ видахъ поощренія и улучшенія изящества издѣлій изъ мамонтовой кости, Распорядительный Комитетъ, по предложенію Комиссіи (въ засѣданіи 24 мая 1898 года), обратился съ ходатайствомъ въ Министерство Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ объ ассигнованіи пѣкоторой суммы для выдачи денежныхъ премій мастерамъ за лучшія издѣлія. Однако Кустарный Комитетъ Отдѣла Сельской Экономіи и Сельско-хозяйственной Статистики названнаго министерства, разсмотрѣвъ ходатайство Распорядительного Комитета, отклонилъ его (30 декабря 1898 г. за № 3514), мотивируя это тѣмъ, что такого рода промыселъ основанъ на случайно полученному матеріалѣ, вслѣдствіе чего не можетъ имѣть серьезной будущности, и что, на основаніи Высочайше утвержденнаго 21 марта 1888 года мнѣнія Государственного Совѣта, Министерство Земледѣлія оказываетъ содѣйствіе лишь тѣмъ кустар-

1) Главныя основанія договора таковы: каждый членъ артели вносить 25 руб. деньгами или инструментовъ на эту сумму; работа начинается съ 6 час. утра; рабочій день равенъ 9 часамъ; требуется безусловная трезвость на работѣ; по окончаніи мѣсяца каждый артельщикъ получаетъ то жалованіе, какое получалъ онъ въ послѣднее время въ частной мастерской (15—25 руб.); староста получаетъ 35 руб., а ученики—10 руб. Къ концу года весь чистый доходъ дѣлится поровну между всѣми членами артели.

нымъ промысламъ, которые составляютъ поддержку для населения, имѣющаго основнымъ промысломъ земледѣліе.

Артельная мастерская издѣлій изъ мамонтовой кости продолжаетъ свои работы и въ настоящее время. Что касается Кустарной Комиссіи, то она, за выездомъ членовъ ея А. Н. Бекнева, А. Е. Богдановскаго и др. и за смертю Л. Е. Луговскаго, въ концѣ 1898 года болѣе не собиралась.

Инициативѣ Кустарной же Комиссіи принадлежитъ устройство публичныхъ объяснительныхъ чтеній въ Музѣ, при чемъ за образецъ организаціи ихъ приняты воскресныя объяснительные чтенія въ Московскомъ Политехническомъ Музѣ. Проектъ организаціи этихъ чтеній былъ разсмотрѣнъ въ засѣданіяхъ Распорядительного Комитета 4-го и 22-го апрѣля 1898 года; при этомъ было постановлено, что открытие Музея для объяснительныхъ чтеній съ демонстрированіемъ коллекцій его предоставляется (единолично) власти г. предсѣдателя Комитета по докладу секретаря. Цѣль этихъ чтеній заключается въ томъ, чтобы въ краткихъ популярныхъ очеркахъ давать публикѣ свѣдѣнія по разнымъ отраслямъ знанія, выясняя при этомъ значение и смыслъ соответствующихъ коллекцій Музея. Составленіе такого рода чтеній въ то же время есть разработка соответствующихъ коллекцій Музея, которая во время чтеній и демонстрируются публикѣ.

Въ объяснительныхъ чтеніяхъ до сихъ поръ принимали участіе два лица: консерваторъ Музея Н. Л. Скалозубовъ и дѣйствительный членъ Музея Н. С. Матіясевичъ. Первымъ составлено было четыре чтенія:

- 1) О томъ, какіе продукты могутъ быть получаемы изъ дерева¹⁾. Читано 10 апр. 1898 г.
- 2) Какіе продукты можно приготовить изъ кости?¹⁾ Читано 19 апр. 1898 г.
- 3) Сибирскія пшеницы²⁾. Читано 26 апр. 1898 г.

¹⁾ Эти чтенія напечатаны въ мѣстной газетѣ „Сиб. Лист.“ за 1898 г. (№№ 31 и 35) и отдельными оттисками въ колич. 300 экз. каждое.

²⁾ Напечат. въ „Отдѣлѣ Сельск. Хоз. и Куст. Промышл.“ 1899 г. (№ 11), првл. къ № 36 „Тоб. Губ. Вѣд.“.

4) Что такое торфъ, какъ онъ образуется и для чего употребляется¹⁾. Читано 22 окт. 1898 г.

Н. С. Матіясевичемъ быль составленъ краткій обзоръ быта сѣверныхъ инородцевъ, служацій въ то же время объясненіемъ имѣющихся въ Музѣѣ коллекцій. Эти объясненія давались публикѣ въ тѣ же дни, когда происходили чтенія консерватора Музѣя.

Упомянутыя чтенія пріурочивались къ воскреснымъ днамъ. Плата за входъ назначалась удешевленная—по 2 коп. за билетъ. О времени чтенія и темѣ его публика извѣщалась афишами. Въ дни этихъ чтеній входныхъ билетовъ продано: 10 апр.—358, 19—361, 26—196 и 22 окт.—72, всего—987 бил.

Такимъ образомъ, благодаря организаціи объяснительныхъ чтеній, является возможность удовлетворять назрѣвшей потребности въ просвѣщеніи жителей города средняго достатка путемъ изученія и ознакомленія съ тѣмъ, что находится въ Музѣѣ, въ обыкновенное время мало доступномъ для такого рода посѣтителей.

Дѣятельность Редакціонной Комиссіи въ отчетное время заключалась въ редактированіи и изданіи VII, VIII, IX и X выпускъ²⁾ „Ежегодника Тобольскаго Губернскаго Музѣя“. Въ этихъ выпускахъ помѣщены отчеты по Музѣю за 1895 и 1896 гг. и работы слѣдующихъ лицъ: А. Я. Гордягина, А. А. Дунинъ-Горкавича, проф. Н. Ф. Катанова, Л. Корикова, М. Н. Костюриной, В. М. Крутовскаго, Л. Е. Луговскаго, С. Н. Мамѣева, Н. Палопеженцева, М. Рузскаго, Н. Л. Скалоузубова, И. Я. Словцова, Е. Ф. Соколова. и А. А. Терновскаго.

Общія собранія членовъ Музѣя за отчетное время были посвящены главнымъ образомъ чтенію докладовъ. Вотъ эти доклады:

1) 10 января 1897 г. дѣйств. чл. Музѣя И. И. Сухановъ прочелъ на тему: „Обская водная система и Тобольская желѣзная дорога и важное ихъ значеніе для края“.

¹⁾ Напечат. въ „Отдѣлѣ Сельск. Хоз. и Куст. Промышл.“ 1899 г. (№№ 1 и 2), а также отдельными оттисками.

²⁾ Вып. VII и VIII вышли 18 іюля 1897 г., а IX вып.—16 окт. 1898 г.; печатаніе X выпуска еще не кончено.

Консерваторъ Музея Н. Л. Скалозубовъ сдѣлалъ сообщеніе „По поводу обвала берега р. Иртыша у дер. Чембакчиной (Вошкина-тожъ) 17 декабря 1896 года“. (Напеч. въ „Сиб. Листкѣ“ за 1897 г., № 4)¹⁾.

2) 26 сентября 1897 г. Н. Л. Скалозубовъ сообщилъ: „Какое значение имѣетъ съ точки зрењія интересовъ крестьянского хозяйства развитіе въ Тобольской губерніи маслодѣлія“. (Напеч. въ „Сиб. Листкѣ“ за 1897 г., № 77)²⁾.

3) 11 февраля 1898 г. дѣйств. чл. А. Е. Богдановскій сообщилъ на тему: „Сибирская община и ея роль въ политико-экономическомъ отношеніи“. (Напеч. въ „Сиб. Листкѣ“ за 1898 г., №№ 14 и 15).

4) 22 февраля 1898 г. дѣйств. чл. М. Н. Костюрина сдѣлала сообщеніе о „крестьянской свадьбѣ въ подгородныхъ деревняхъ г. Тобольска“. (Напеч. въ IX вып. „Ежегодника Тоб. Губ. Музея“).

Одною изъ главныхъ сторонъ дѣятельности Музея, какъ въ отчетное время Общества, являлись сношениія его съ другими подобными учрежденіями и учеными обществами. До сихъ поръ, однако, эти сношениія выражены весьма слабо и притомъ мало устойчивы. Такъ, въ 1897 г. Музей получалъ частью въ обмѣнѣ на свой „Ежегодникъ“, а частью въ видѣ пожертвованій, всего 31 периодическое изданіе, изъ которыхъ 22 изданія—сибирскія; а въ 1898 г. онъ получалъ тѣмъ же путемъ всего 40 периодическихъ изданій, изъ которыхъ сибирскихъ изданій—21. Въ общемъ за отчетное время библиотека Музея приобрѣла 936 названій печатныхъ и рукописныхъ произведеній. Заботясь о возобновленіи

1) Это сообщеніе вызвало въ печати слѣдующія замѣтки: *К., В.* По поводу засѣданія Музея 10 января. („Сиб. Лист.“ 1897 г., № 5).—*Словцовъ, И. Я.* По поводу сообщенія Н. Л. Скалозубова о Вошкинскомъ обвалѣ. („Сиб. Лист.“ 1897 г., № 7).—*Львовъ, И.* Еще по поводу доклада въ засѣданіи Музея 10 января. („Сиб. Лист.“ 1897 г., № 7).—*Словцовъ, И. Я.* По поводу замѣчанія г. Львова на докладъ Н. Л. Скалозубова 10 января о Вошкинскомъ обвалѣ. („Сиб. Лист.“ 1897 г., № 10).—*Скалозубовъ, Н.* Отвѣтъ И. Я. Словцову и И. П. Львову. („Сиб. Лист.“ 1897 г., № 11).

2) По поводу этого сообщенія появилась замѣтка г. Дардаева „Маленький вопросъ по большому дѣлу“. („Сиб. Лист.“ 1897 г., № 85).

обмѣна и пріобрѣтеніи вновь различныхъ періодическихъ изданій, Комитетъ Музея разсылалъ какъ въ 1897 г., такъ и, въ особенности, въ 1898 г. предложенія объ обмѣнѣ изданіями въ различные общества, учрежденія и редакціи. Лицамъ и учрежденіямъ, часто жертвующимъ въ библіотеку разныя печатныя и рукописные произведенія, Музей высылалъ свой „Ежегодникъ“ бесплатно.

Въ 1898 году нашъ Музей былъ приглашенъ г. Директоромъ Сѣвернаго Музея въ Стокгольмѣ Артуромъ Хацеліусомъ къ участію въ празднествѣ по случаю исполненія 12 (24) октября 1898 г. 25-лѣтія существованія этого Музея. Г. предсѣдателемъ Распорядительного Комитета Л. М. Князевымъ 10 (22) октября была отправлена въ Сѣверный Музей телеграмма слѣдующаго содержанія:

„Stockholm (Suède). Musée du Nord. Le Musée de Tobolsk envoie ses sincères felicitations et souhaits de succès. Le Gouverneur Kniazeff“.

22 октября 1898 г. исполнилось 10 лѣтъ со дня открытия первого сибирскаго университета и въ то же время совершиено открытие юридического факультета въ немъ. По этому случаю отъ нашего Музея была послана привѣтственная телеграмма такого содержанія:

«Томскъ. Ректору университета. Тобольскій Музей, присоединяясь къ торжеству открытия юридического факультета, совпадающему съ днемъ десятилѣтія существованія университета, шлетъ университету горячія пожеланія дальнѣйшаго процвѣтанія на пользу просвѣщенія Сибири. Предсѣдатель Комитета Музея Князевъ».

Затѣмъ остановлюсь нѣсколько на томъ, какъ велико число посѣтителей Музея, которое можетъ служить своего рода показателемъ интереса къ нему. За право посѣщенія Музея Распорядительнымъ Комитетомъ установлена плата въ 20 коп. со взрослыхъ и 10 коп. съ учащихся и малолѣтнихъ. Въ теченіе отчетнаго времени Музей былъ открытъ для публики ежедневно, кромѣ понедѣльника, на 6 час. въ лѣтнее (навигаціонное) время (съ 1-го мая до 15-го сентября) и на 3 часа въ остальное время года.

Число посѣтителей Музея распредѣляется по мѣсяцамъ года слѣдующимъ образомъ (для сравненія приводимъ данныя и за 1896 г.):

	1896	1897	1898	1896	1897	1898	
Январь	23	11	25	Іюль	222	259	159
Февраль	7	13	5	Августъ	196	155	162
Мартъ	18	30	37	Сентябрь	116	65	80
Апрѣль	17	27	16	Октябрь	18	20	20
Май	110	125	89	Ноябрь	3	36	36
Іюнь	194	207	107	Декабрь	28	23	23
Всего въ годъ							
				952	971	759	

Между прочимъ, нашъ Музей посѣтили за отчетное время слѣдующія лица: министръ путей сообщенія кн. М. И. Хилковъ (16 іюня 1898 г.), начальникъ Гл. Тюр. Управленія А. Н. Саломонъ, графъ Евгеній Зичи (3 іюля 1898 г.), д-ръ Бѣла-де-Пошта, Эрнестъ Чики, д-ръ Иванъ Янко (5 іюля 1898 г.), магистръ философіи Гельсингфорскаго унив. Густавъ Адольфовичъ Карьялайненъ и вице-инспекторъ корпуса лѣсничихъ О. В. Маркграфъ (20 сен. 1898 г.).

Въ заключеніе я долженъ указать на недостатокъ средствъ у Музея, какъ на одинъ изъ главныхъ факторовъ, задерживающихъ развитіе его дѣятельности. И въ самомъ дѣлѣ, какъ возникъ нашъ Музей на частныя пожертвованія, такъ и продолжаетъ существовать на тѣ же случайныя пожертвованія да скучные членскіе взносы и плату за входъ въ Музей. Было время, и не такъ давно, когда не доставало средствъ даже на отопленіе зданія Музея и особенно въ наши сибирскіе морозы, такъ что члены Музея нерѣдко засѣдали, не снимая съ себя верхняго платья. Въ настоящее время Музей не слишкомъ далекъ отъ такого положенія. Благодаря временному пособію отъ Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, вмѣстѣ съ указанными выше источниками средствъ, Музей поддерживаетъ свое существованіе; между тѣмъ потребности Музея ростутъ съ каждымъ годомъ: помѣщеніе становится тѣснымъ; является необходимость систематизировать собранныя богатства Музея, расши-

рить и оживить его единственный печатный органъ, который долженъ служить показателемъ дѣятельности этого учрежденія. На все это, разумѣется, кромѣ рукъ, требуются и средства,—безъ нихъ всякия пожеланія и начинанія останутся только ими. Съ другой стороны, необходима болѣе активная дѣятельность членовъ Музея и вообще всѣхъ лицъ, такъ или иначе заинтересованныхъ этимъ учрежденіемъ, ибо наша губернія, благодаря своему обширному пространству и разнообразію естественныхъ условій, сильно нуждается въ изученіи ея какъ въ естественно-историческомъ, такъ и физико-географическомъ отношеніяхъ.

він фізіон мур, ито аж іншими чинами що відомі відомі
життям та багатою обробкою які відомі відомі
життями членами, які відомі відомі відомі відомі
життями членами, які відомі відомі відомі відомі
життями членами, які відомі відомі відомі відомі
ОТЧЕТЪ

Консерватора Тобольского Губернского Музея за 1897 и 1898 годы.

Дѣятельность консерватора Музея заключалась: 1) въ соби-
раніи коллекцій и материаловъ для всесторонняго представлениія
естественныхъ условій губерніи, быта ея населенія и въ раз-
работкѣ этихъ коллекцій въ цѣляхъ ихъ описанія и системати-
зациіи и 2) въ приведеніи коллекцій въ удобообозрѣваемый видъ
и устройство ихъ для храненія.

1. Преслѣдуя выполненіе извѣстной программы, Музей при
посредствѣ своихъ членовъ завязывалъ сношенія съ различными
лицами и учрежденіями въ губерніи и въ ея, собирая коллек-
ціи частію безвозмезднымъ трудомъ сотрудниковъ, частію покупкою.

За отчетный періодъ въ инвентарь Музея записано вновь
около 1300 номеровъ предметовъ, поступившихъ въ разные отдѣ-
лы Музея. Въ это число не вошло около 200 номеровъ образцовъ
почвъ и такое же приблизительно количество образцовъ сѣмянъ и ко-
лосьевъ разнаго рода хлѣбовъ, которымъ ведутся особые каталоги.

По крупнымъ отдѣламъ поступившія коллекціи распредѣ-
ляются слѣдующимъ образомъ: по минералогіи, геологіи и пале-
онтологіи—66 номеровъ, или 4% общаго количества поступленій,
по почвовѣдѣнію—200, т.-е. 11%, по зоологіи—212, т.-е. 12%, по
ботаникѣ—19, т.-е. 1%, по этнографіи—326, т.-е. 20%, по архео-
логіи и нумизматикѣ—81, т.-е. 5%, по сельскому хозяйству (счи-
тая съ образцами хлѣбовъ)—369, т.-е. 22%, предметовъ фабрично-
 заводской и кустарной промышленности—384, т.-е. 23%, охоты и
 рыбной ловли—31, т.-е. 2%.

Первое мѣсто по количеству поступившихъ предметовъ за-

нимаетъ отдѣлъ промышленный: именно въ эти два послѣдніе года онъ получилъ въ Музѣѣ особое развитіе. Въ отдѣлѣ этомъ собираются коллекціи предметовъ, которыя должны характеризовать состояніе въ губерніи обрабатывающей промышленности, какъ крупной фабрично-заводской, такъ и мелкой ремесленной и кустарной. Вмѣстѣ съ коллекціями мѣстныхъ тобольскихъ издѣлій въ Музѣѣ собирались и коллекціи товаровъ, хотя и не изготавляемыхъ здѣсь, но по условіямъ обилія и дешевизны сырья могущіе сдѣлаться предметами подражанія. Изъ такихъ, имѣющихъ учебное значеніе, коллекцій можно упомянуть: о богатой коллекціи продуктовъ сухой перегонки дерева (изъ Томска, съ завода Крылова и К^о); о коллекціи продуктовъ обработки кости (отъ С.-Петербургскаго Товарищества костеобжигательныхъ заводовъ); о коллекціи продуктовъ обработки крови (съ московскихъ боенъ), продуктовъ, вырабатываемыхъ изъ куриныхъ лицъ (съ завода F. Luttringshauser изъ Острогожска, Воронежской губерніи) и проч. Изъ кустарныхъ издѣлій—точеная липовая посуда изъ Пепзенской губерніи; изящные плетеные изъ береста и каповыя издѣлія Вятскихъ кустарей; большая коллекція кустарныхъ издѣлій изъ желѣза, мѣди, жести, рога, а также кружева, тканье, вышивки и дѣтскія игрушки, высланныя по ходатайству Музея изъ Кустарного Музея Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

Изъ крупныхъ заводовъ губерніи на призывъ Музея откликнулись пока лишь немногіе: суконная фабрика Корякина и Андреева въ Туринскомъ уѣздѣ выслала фотографію завода и систематическую коллекцію товаровъ въ разныхъ стадіяхъ ихъ обработки; Успенская писчебумажная фабрика въ Тюменскомъ уѣздѣ выслала образцы вырабатываемой ею бумаги; кожевенный заводъ наслѣдн. Колмогоровыхъ въ Тюмени—бывшіе на Курганской выставкѣ образцы выдѣлываемыхъ имъ кожъ; крахмально-паточный заводъ Балакшина и Ванюкова въ Курганскомъ уѣздѣ—тоже бывшіе на выставкѣ образцы вырабатываемой патоки и крахмала. Остальные заводы губерніи: мукомольные, винокуренные, стекловаренные, колокольный, мыловаренные, пряничные и др., къ сожалѣнію, отсутствуютъ въ коллекціяхъ Музея.

Изъ кустарныхъ промысловъ мало представлены промыслы по обработкѣ шерсти и мѣховъ—пимокатный, шубный и проч., что объясняется не трудностью приобрѣтенія этихъ коллекцій, а трудностью сохраненія ихъ въ Музей отъ порчи молью.

Большинство предметовъ кустарного производства приобрѣтено покупкою. Услуги Музею въ дѣлѣ пополненія этого отдѣла, какъ мнѣ приходилось упоминать въ предыдущемъ отчетѣ, оказали Г. Я. Маляревскій и А. В. Арефьевъ.

Въ цѣляхъ пополненія имѣющагося въ литературѣ о Тобольской губерніи материала о кустарныхъ промыслахъ организованной при Музей Кустарной Комиссіей выработаны были и разосланы по губерніи программы вопросовъ о кустарныхъ промыслахъ, отвѣтовъ на которые получено отъ 330 лицъ.

Второе мѣсто по количеству доставленныхъ въ Музей за отчетный періодъ предметовъ занимаетъ отдѣлъ сельско-хозяйственный, хотя пополненіе его было нѣсколько односторонне, а именно: увеличивались главнымъ образомъ коллекціи сортовъ культивируемыхъ въ губерніи растеній въ сѣменахъ и колосьяхъ. Особый интересъ среди этихъ коллекцій имѣетъ коллекція сибирскихъ пшеницъ, вообще мало еще изученныхъ. Часть этихъ коллекцій выслана для описанія и опредѣленія академику С. И. Коржинскому, занимающемуся изученіемъ южно-сибирскихъ пшеницъ. Слабое развитіе отдѣла скотоводства побудило Музей обратиться къ губернскому ветеринару Н. И. Золотареву съ просьбою оказать содѣйствіе пополненію этого отдѣла черепами домашнихъ животныхъ и фотографіями, при чмъ для собиранія этихъ коллекцій выработана была особая программа.

Значительное приращеніе за отчетный періодъ получилъ этнографической отдѣлъ, пополненный главнымъ образомъ пожертвованіями лицъ, уже не разъ оказывавшихъ услуги Музею: А. А. Дунинъ-Горкавича и М. П. Сѣрыхъ изъ Сургута, А. Е. Мотошина изъ Карымкарскихъ юртъ (Березовскаго уѣзда), священ. В. Герасимова изъ села Щекуринскаго (Березовскаго уѣзда), П. Ф. Телѣжкина и И. А. Рочева изъ Обдорска.

По полнотѣ и богатству коллекцій предметовъ быта остыаковъ

этотъ отдѣлъ можетъ считаться однимъ изъ лучшихъ въ Музѣ. Правда, и онъ не безъ серьезныхъ пробѣловъ, но это относится главнымъ образомъ къ мѣховыемъ костюмамъ инородцевъ, которые въ Музѣ по недостатку прочныхъ, не пропускающихъ моли, шкафовъ трудно сохраняются. Къ недостаткамъ коллекцій этого отдѣла относится также еще то, что онъ, относясь вообще къ инородцамъ сѣвера, не достаточно характеризуютъ остыковъ различныхъ географическихъ районовъ сѣвера, на что обращено уже вниманіе, и пробѣлы пополняются. Кромѣ остыковъ и отчасти самоѣдовъ, другія народности губерніи—зыряне, татары, вогулы—представлены очень слабо.

Съ цѣлію составленія систематического каталога этихъ коллекцій въ концѣ 1898 года приступлено было къ подробному описанію и измѣренію каждого предмета коллекцій, при чёмъ наиболѣе характерные предметы фотографируются. Такимъ образомъ описано и даны главные размѣры 250 предметовъ. Къ 1 января с. г. было изготовлено 6 фотографическихъ негативовъ.

Отдѣлъ зоологическій продолжалъ пополняться главнымъ образомъ коллекціями въ чучелахъ и спиртовыхъ препаратахъ приватъ-доцента Императорскаго Казанскаго университета М. Д. Рузскаго, составленными изъ материала, собраннаго имъ во время экскурсій въ южной полосѣ Тобольской губерніи въ 1896 году. Въ отчетный періодъ въ Музей имъ высланы коллекціи птицъ и грызуновъ, коллекція рыбъ и пресмыкающихся, коллекція саранчевыхъ насѣкомыхъ (кобылки). А. И. Туполовымъ доставлена Музѣю шкура дикаго оленя съ полуострова Я-Мала, которую удалось набить, благодаря участію въ этомъ дѣлѣ П. С. Тарунина. Протоіереемъ Скосыревымъ подаренъ Музѣю рѣдкой экземпляръ шкурки чернаго зайца съ рѣки Тавды, а г. Бордзиловскимъ изъ Сургута—двѣ шкурки тоже очень рѣдкой бѣлой бѣлки. В. А. Розановымъ пожертвована Музѣю значительная коллекція птичьихъ яицъ и нѣсколько хорошо изготовленныхъ чучель птицъ.

Для учебныхъ цѣлей въ высшей степени желательны были бы чучела животныхъ, характерныхъ для разныхъ естественно-историческихъ полосъ губерніи, но, къ сожалѣнію, отсутствіе въ

Тобольскъ препараторовъ-чучельниковъ не позволяетъ осуществить это; поэтому проектируется замѣнить чучела стѣнными картинами.

Въ цѣляхъ ближайшаго изученія видового состава и географического распределенія кобылокъ въ губерніи, въ 1897 году консерваторомъ Музея были собраны коллекціи кобылокъ въ различныхъ полосахъ губерніи между гг. Петропавловскомъ и Курганомъ на югъ до Тобольска на сѣверъ. Матеріалъ этотъ переданъ для обработки специалисту по изученію кобылокъ И. В. Ингеницкому въ С.-Петербургъ.

Почвенная коллекція обогатилась образцами почвъ юга губерніи, собранными приват-доцентомъ Императорскаго Казанскаго университета А. Я. Гордягинымъ въ 1896 году. Образцы эти по вицѣальнымъ морфологическимъ признакамъ почвъ описаны и классифицированы имъ же. Ближайшее изслѣдованіе химического состава типичныхъ образцовъ почвъ, какъ уже упоминалось въ предыдущемъ отчетѣ, было произведено химикомъ г. Шешуковымъ въ Костромѣ и, благодаря содѣйствію, оказанному Ученымъ Комитетомъ Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, агрономической лабораторіей Министерства Земледѣлія въ Лѣсномъ Институтѣ подъ руководствомъ профессора П. С. Коссовича.

Всего было произведено г. Шешуковымъ 9 полныхъ анализовъ образцовъ изъ 6-ти мѣстонахожденій и г. Коссовичемъ—10 полныхъ анализовъ химическихъ и механическихъ образцовъ почвъ изъ 10 мѣстонахожденій, 4 полныхъ анализа образцовъ подпочвенного слоя тѣхъ же почвъ и 15 анализовъ неполныхъ (определение потери при прокаливаніи гумуса и химически связанной воды).

Результаты этой громадной и цѣнной работы представлены г. Коссовичемъ въ особомъ отчетѣ и сведены въ X подробныхъ таблицахъ съ выясненіемъ методовъ анализа.

Анализы эти переданы А. Я. Гордягину, который съ своей стороны продолжаетъ изслѣдованіе тобольскихъ почвъ, обращая особое вниманіе на изученіе свойствъ солонцовъ, имѣющихъ такое обширное распространеніе въ губерніи. Такимъ образомъ, благодаря главнымъ образомъ работамъ А. Я. Гордягина и П. С.

Коссовича, Музей въ настоящее время располагаетъ обширной коллекціей образцовъ почвъ губерніи и нѣкоторыми свѣдѣніями о химическомъ и механическомъ составѣ главныхъ ихъ типовъ.

Хотя по числу занимаемыхъ въ инвентарѣ №№ ботаническій отдѣлъ за отчетный періодъ пополнился и немнога, но зато въ это время сдѣланъ починъ организаціи гербарія Тобольской губерніи, а именно изъ собраній сухихъ растеній Музѣя выдѣлены и опредѣлены семейства лутиковыхъ, фіалковыхъ, нимфейныхъ, крестоцвѣтныхъ и мотыльковыхъ.

Коллекціи растеній, вновь собранныя консерваторомъ Музѣя лѣтомъ 1897 года, отправлены въ Казань къ А. Я. Гордягину, обрабатывающему флору Тобольской губерніи.

Обладая значительнымъ количествомъ дублетныхъ экземпляровъ, Музей вошелъ въ обмѣнъ растеніями съ ботаническимъ садомъ Юрьевскаго университета. Дублетные экземпляры могутъ быть желающимъ продаваемы за умѣренную плату—5 к. за листъ.

Нѣкоторые изъ сотрудниковъ Музѣя, по его просьбѣ, выслали небольшіе составленные ими гербаріи съ малоизвѣстнаго въ ботаническомъ отношеніи сѣвера губерніи, а именно: священ. В. Герасимовъ—изъ окрестностей Обдорска, Н. Ф. Телѣжкинъ—купленные имъ у оленнаго пастуха пучки травъ съ полуострова Я-Мала, А. А. Карловскій—изъ окрестностей Березова, И. А. Рочевъ и А. И. Туполевъ—изъ окрестностей Обдорска. Гербаріи эти тоже отправлены къ А. Я. Гордягину.

Но собранные названными лицами, новичками въ этомъ дѣлѣ, гербаріи только намекаютъ на богатство и оригинальность сѣверныхъ формъ на тобольскомъ сѣверѣ. Продолженіе изученія этой флоры собираниемъ растеній является задачей въ высшей степени благодарной.

Какъ известно, особая трудности въ систематикѣ растеній представляетъ изученіе ивъ, между тѣмъ опредѣленіе ихъ имѣть большое практическое значеніе, особенно въ виду проектируемыхъ въ губерніи работъ по искусственному лѣсоразведенію и укрѣплѣнію песковъ. Пополняя пробѣлъ въ нашихъ свѣдѣніяхъ объ этомъ интересномъ семействѣ растеній въ губерніи, Музей вошелъ въ

сношеније съ извѣстнымъ специалистомъ по ивамъ О. А. Теплоуховымъ въ с. Ильинскомъ, Пермскаго уѣзда, которому отосланы всѣ имѣвшіеся сборы ивъ; кромѣ того, Музей содѣйствовалъ установлению непосредственныхъ сношений О. А. Теплоухова съ В. В. Барышевцевымъ, доставившимъ ему, кромѣ коллекцій ивъ изъ Тарскаго уѣзда, еще и черенки для культуры въ питомникѣ ивъ г. Теплоухова.

За отчетный періодъ положено начало изученію флоры низшихъ растеній, а именно грибовъ. Сборы коллекцій низшихъ паразитныхъ грибовъ, сдѣланнны г. Круглымъ въ окрестностяхъ Тобольска и консерваторомъ Музея главнымъ образомъ на югѣ губерніи, отправлены были для опредѣленія профессору Московскаго сельско-хозяйственного института С. И. Ростовцеву, который, опредѣливъ ихъ, напечаталъ списокъ паразитическихъ грибовъ изъ окрестностей Тобольска. Гербарій опредѣленныхъ грибовъ возвращенъ въ Музей. Коллекція шляпочныхъ грибовъ, главнымъ образомъ изъ окрестностей Тобольска, отослана для опредѣленія черезъ С.-Петербургское Общество любителей естествознанія А. А. Ячевскому.

А. Н. Строгоновымъ, ассистентомъ профессора К. А. Тимирязева, пожертвованы Музею изящно изготовленные имъ для демонстрацій виды самыхъ распространенныхъ въ окрестностяхъ Тобольска лишайниковъ.

В. И. Чарыковъ доставилъ въ Музей интересную находку, сдѣланную имъ въ окрестностяхъ села Марайскаго, Курганскаго уѣзда, въ сосновомъ бору—грибъ, принятый имъ за съѣдобный трюфель, но, по опредѣленію лаборанта ботаническаго кабинета Варшавскаго университета В. Траншеля, оказавшійся несъѣдобнымъ грибомъ изъ гастромицетовъ (*Gautieria graveolens* Vitt.), который, по сообщенію г. Траншеля, въ Россіи еще нигдѣ находимъ не былъ.

Въ цѣляхъ ботанико-географического изученія губерніи, при любезномъ содѣйствіи г. помощника управляющаго Государственными Имуществами Тобольской губерніи, гг. лѣсничимъ губерніи были разосланы особыя программы для собиранія свѣдѣній о границахъ распространенія на сѣверъ и югъ иѣкоторыхъ древесныхъ

породъ. До 1 января 1899 года отвѣты на эту программу получены были отъ гг. лѣсничихъ: Колокольникова, Герасимова, Котлярова, Дунинъ-Горкавича, Лучанского, Пѣтухова, П. В. Арефьевъ, Жукова, Юдина и Церингера. Кромѣ того, П. В. Арефьевъ и бывшій лѣсной ревизоръ Тобольской губерніи, нынѣ управляющій Государственными Имуществами степныхъ областей, В. В. Барышевцевъ доставили А. Я. Гордягину, въ распоряженіе котораго предоставляетъесь весь матеріалъ, собираемый въ губерніи по ботанической географіи, свѣдѣнія и матеріалы для установленія южныхъ границъ распространепія въ губерніи ели и рѣмовой сосны.

Въ видахъ сбиранія матеріаловъ о народномъ употребленіи растеній мѣстной флоры съ медицинскою цѣлію, консерваторомъ Музея составлена и отпечатана особая программа для сбиранія этого рода свѣдѣній, разсылка которой началась съ 20 декабря 1898 года.

Сбираніе матеріаловъ по минералогіи, геологіи и палеонтологіи въ отчетный періодъ не было болѣе успѣшно, чѣмъ въ предыдущій; причина этого—бѣдность губерніи выходомъ древнихъ напластованій и, главное, отсутствіе въ средѣ лицъ, интересующихся задачами Музея, знаній этого отдѣла естествоznанія.

Интересныя палеонтологическія находки доставлены Музею свящ. В. Герасимовымъ изъ с. Щекуръи; изъ другихъ жертвователей слѣдуетъ отмѣтить С. И. Чуйкова, В. А. Розанова и кр. С. С. Усова, доставлявшаго преимущественно кости мамонта и носорога съ р. Ишима.

Въ цѣляхъ учебныхъ для этого отдѣла Музея заказаны были и изготовлены два щита съ изображеніемъ скелетовъ мамонта и мастодонта, а также картина растительности каменноугольного періода.

До сего времени, къ сожалѣнію, Музей не можетъ пріобрѣсти учебной руководящей коллекціи по минералогіи и, главнымъ образомъ, палеонтологіи, безъ которыхъ крайне затрудняется объясненіе коллекцій Музея по этому отдѣлу.

Отдѣлъ археологии пополнялся случайными поступленіями

отъ разныхъ лицъ: свящ. В. Герасимова и Н. М. Дмитріева изъ с. Щекурии, С. С. Усова изъ с. Каргалинского, Тарского уѣзда, Митинского изъ Усть-Ишима, Тарского уѣзда, и П. Ф. Телѣжкина изъ Обдорска. Отдѣль этотъ довольно богатъ числомъ предметовъ, но къ разработкѣ его пока еще не приступлено; точно также не вполнѣ приведена въ порядокъ и нумизматическая коллекція.

Съ разрѣшенія Императорской Археологической Комиссіи, въ 1897 г. свящ. Герасимовымъ съ псаломщикомъ Н. М. Дмитріевымъ произведены были раскопки такъ называемаго Ляпинского городища близъ с. Щекурии, и въ Музей доставлены были вещи, найденные при этихъ раскопкахъ вмѣстѣ съ описаніемъ городища.

Въ 1897 г., во время поѣздки на сѣверъ, консерваторъ Музея имѣлъ случай ознакомиться съ пѣкоторыми, имѣющими большой археологический интересъ, серебряными вещами, вывозимыми остатками съ р. Сынской. Объ этихъ вещахъ сообщено было Императорской Археологической Комиссіи, которая эти вещи при содѣйствіи Музея и пріобрѣла. Это—два серебряныхъ блюда: одно въ видѣ глубокаго четырехъугольной формы подноса грубой отдѣлки съ надписями по краямъ, другое круглое серебряное съ грубымъ изображеніемъ всадника. Археологическая Комиссія разъяснила, что четырехъугольное блюдо изготовлено, судя по арабской надписи на немъ, для одного изъ Харезмъ шаховъ и относится къ XIII столѣтію. Блюдо же второй формы представляетъ интересное довольно позднее, но, по всей вѣроятности, мѣстное подражаніе древнимъ сассанидскимъ блюдамъ. Въ концѣ 1898 г. еще одно маленькое серебряное блюдо доставлено въ Музей изъ Обдорска И. А. Рочевымъ.

Въ особомъ донесеніи Императорской Археологической Комиссіи консерваторъ Музея указывалъ на богатство археологическими древностями низовьевъ р. Оби и на желательность специального изслѣдованія пѣкоторыхъ мѣстностей, каковы, напримѣръ, окрестности Бѣлогорскихъ юртъ, Карымкарскихъ и др., а равно ближайшаго изслѣдованія мѣстностей по р. Сынской. Археологическая Комиссія, отнесясь съ интересомъ къ этому донесенію,

увѣдомила, что надѣется въ ближайшемъ будущемъ командиро-
вать въ Тобольскую губернію одного изъ своихъ членовъ, прося
вмѣстѣ съ тѣмъ выяснить, когда и какимъ путемъ можно про-
ѣхать на р. Сынскую. Наведенные Музеемъ справки показали
однако, что лѣтомъ попасть на эту рѣку трудно, и что все
населеніе ея въ это время перекочевываетъ на р. Обь.

2. Переходя къ отчету о дѣятельности консерватора по
приведенію коллекцій въ удобообозрѣваемый видъ и устройство
ихъ для храненія, считаю необходимымъ отмѣтить, что въ этомъ на-
правлениі сдѣлано меньше, чѣмъ нужно и должно было сдѣлать: по-
ступающія коллекціи удавалось лишь регистрировать и разобрать
по отдѣламъ. Часть коллекцій, требующихъ специальныхъ знаній,
какъ указано выше, отсылаема была специалистамъ; часть описы-
валась и опредѣлялась консерваторомъ; часть поступила уже съ
опредѣленіями и вполнѣ устроенная для храненія (отдѣлъ зо-
логіи) и, наконецъ, большое число предметовъ еще ждетъ опи-
санія, систематизаціи и устройства. Если первое, т. е. описание и
систематизація, является только вопросомъ времени, такъ какъ имѣ-
ющія научный интересъ коллекціи рано или поздно привлекутъ
вниманіе специалистовъ, то второе—устройство коллекцій для хра-
ненія въ значительной степени зависитъ отъ личныхъ силъ, ко-
торыми Музей располагаетъ, и отъ денежныхъ средствъ. И тѣмъ
и другимъ Музей, къ сожалѣнію, не богатъ. Благодаря отсут-
ствію достаточнаго количества плотныхъ шкафовъ и недоста-
точному надзору за вещами, многія шерстяныя и мѣховые веши,
а также чучела животныхъ, сильно побиваются молью; зло это
такъ велико, и борьба съ нимъ такъ трудна, что временно, впредь
до пополненія мебели, легко портящіеся молью предметы помѣ-
щать въ коллекціи Музея опасно.

Съ конца 1898 г. въ лицѣ А. О. Ушарова Музей пріобрѣлъ
дѣятельного и умѣлаго сотрудника, и при его содѣйствіи про-
изводится постепенный пересмотръ коллекцій съ цѣллю ихъ при-
веденія въ порядокъ.

Въ серединѣ декабря 1898 г. всѣ залы Музея, кромѣ цен-
тральной, были вычищены и выбѣлены, и коллекціи всѣ пере-

смотрѣны и распредѣлены вновь, при чмъ заново устроено помѣщеніе для портрета Высочайшаго покровителя Музея Его Императорскаго Величества Государя Императора, и драпирована комната, гдѣ собраны коллекціи кустарныхъ производствъ. Въ этнографическомъ отдѣлѣ сосредоточены всѣ, до сихъ поръ разбросанныя въ разныхъ мѣстахъ Музея, коллекціи вещей быта какъ тобольскихъ инородцевъ, такъ и якутовъ, китайцевъ и пр. Предметы и принадлежности рыболовства и охоты также перенесены въ одинъ залъ — восточный.

Нельзя не отмѣтить, что собранныя въ Музѣй коллекціи пріобрѣтутъ въ глазахъ публики соотвѣтствующее ихъ внутренней цѣнности значеніе лишь тогда, когда онѣ будутъ описаны, и будетъ въ доступной формѣ выяснено для публики ихъ значеніе. Опытъ такой обработки коллекцій за отчетный періодъ былъ сдѣланъ, а именно составлены описанія: 1) коллекцій сухой перегонки дерева, 2) коллекцій продуктовъ обработки кости, 3) коллекцій торфяного производства и 4) коллекцій западно-сибирскихъ пшеницъ. Первые три объясненія напечатаны въ видѣ брошюръ, которые могутъ служить краткимъ руководствомъ къ ознакомленію съ этими коллекціями.

Накопляющіеся въ Музѣй дубликаты нѣкоторыхъ предметовъ позволяютъ дѣлиться ими съ другими аналогичными учрежденіями. Такъ, нѣкоторое количество вещей, главнымъ образомъ, по сельскому хозяйству переслано было въ сельскій Заводоуковскій музей, нынѣ переведенный въ Ялуторовскъ. Въ февралѣ 1898 г. Музеемъ была составлена и выслана коллекція, главнымъ образомъ, фотографій и предметовъ быта остатковъ (всего 64 номера) музею при бесплатной народной читальнѣ уѣзднаго комитета попечительства о народной трезвости въ г. Бугурусланѣ, Самарской губ., по ея о томъ ходатайству.

За отчетный періодъ содѣйствовали пополненію коллекцій Музея присылкой вещей слѣдующія лица и учрежденія:

Андреевъ, П. Н. (Зайсанъ), Арефьевъ, А. В. (Тобольскъ), Артемьевъ, И. С. (с. Щекуръи, Березовскаго у.), Балакшинъ, А. Н. (Курганъ), Бажановъ, С. П. (Тара), Бузевичъ, Э. Э. (Саргатск.).

вол., Тюкал. у.), Бекневъ, А. Н. (Тобольскъ), Бохманъ, М. (Тобольскъ), Бордзиловскій, Б. А. (Сургутъ), Бакаловъ, М. К. (д. Климина, Колмаков. вол., Тюкал. у.), Благининъ, Ф. Як., (с. Чимѣвское, Курган. у.), Ветерин. Отдѣл. Губ. Управл. (Тобольскъ), Вардроперь, Эд. (Тюмень), Гордягинъ, А. Як. (Казань), Герасимовъ, В. Н., св. (с. Щекурыи, Берез. у.), Добровольскій, К. (Березовъ), Дунинъ-Горкавичъ, А. А. (Сургутъ), Духовичъ, А. (Туринскъ), Дмитріевъ, Н. М. (с. Щекурыи, Березов. у.), Департаментъ Земл. М. З. и Г. Им., Емельяновъ, П. И. (Тюкалинскъ), Емельяновъ, Н. М. (Тобольскъ), Заводоуковскій музей (Ялутор. у.), Знаменская, Л. Н. (Тобольскъ), Ивановъ, Н. В. (Заводоук. в., Ялутор. у.), Ингеницкій, И. В. (С.-Петербургъ), Истоминъ, Ф. Г. (с. Щекурыи, Березов. у.), Ивановъ, И. Н. (Пишикъ), Ивановъ, А. И. (Москва), Иринархъ, іеромонахъ (Обдорскъ), Королевъ, В. Ф. (Омскъ), Карновичъ, С. В. (Курганъ), Корякинъ и Андреевъ, торгов. домъ (Тюмень), Кориковъ, Л. А. (с. Щекурыи, Березов. у.), Кочешевъ, А. И. (Курганъ), Каффка, С. П. (Тобольскъ), Кустарный Музей Мин. Земл. и Г. Им., Кондратовичъ, В. К. (Березовъ), Карловскій, А. А. (Березовъ), Luttringshauser (Острогожскъ, Воронеж. губ.), Мотошинъ, А. Е. (Карымкарскія юрты, Берез. у.), Мастерская Дома Трудол. въ Тобольскѣ, Мельгунова, Юл. Ил. (Тобольскъ), Митинскій, В. П. (Усть-Ишимъ, Тарск. у.), Маляревскій, Г. Я. (Тобольскъ), Мамѣевъ, С. Н. (Тобольскъ), Матіясевичъ, Н. С. (Обдорскъ), Мицѣловскій (Тобольскъ), Оноре, Л. Л. (Тара), Окуневъ, С. Т. (Березовъ), Ортінъ, Г. Ф. (Вѣрный), Протопоповъ (Обдорскъ), Первовъ, А. (Березовъ), Плесовскихъ, М. А. (Адбажск. вол., Тобол. у.), Памериловъ, А. Ѳ. (Червишев. вол., Тюмен. у.), Первухинъ, А. Г. (с. Мокроусовское, Ялуторов. у.), Павлоновъ, П. И., св. (Тара), Парфяновичъ, Т. Н. (Тобольскъ), Палопеженцевъ, Е. В. (с. Абатское, Ишим. у.), Рочевъ, И. А. (Обдорскъ), Рузскій, М. Д. (Казань), Сѣрыхъ, М. П. (Сургутъ), Смолинъ, Д. И. (Курганъ), Сухановъ, И. И. (Тобольскъ), Серебренниковъ, П., св. (с. Землянское, Ражев. вол., Ишимск. у.), Силинъ (Туринскъ), Степановъ, К. В. (Тобольскъ), Скосыревъ, Н. Д., прот. (Тобольскъ), Сойнажовъ, П. А. (с. Щекурыи, Березовск. у.), Сытинъ, Л. А. (С.-Пе-

тербургъ), Строгановъ, А. Н. (Тобольскъ), Товарищество косте-
обжиг. заводовъ (С.-Петербургъ), Телѣжкинъ, П. О (Обдорскъ),
Типографія Епархіального Братства (Тобольскъ), Трусовъ, С. М.
(Тобольскъ), Тарунина, Е. П. (Тобольскъ), Туполевъ, А. И. (Об-
дорскъ), Терновскій, А. А. (Тобольскъ), Усовъ, С. С. (д. Сере-
брянка, Каргалинск. вол., Тарского у.), Успенская писчебумажная
фабрика (Тюменск. у.), Успенскій, П. П. (сл. Черная, Адбаж.
вол., Тоб. у.), Чарыковъ, В. И. (Туринскъ), Чукмалдинъ, Н. М.
(д. Калмакова, Троицкой вол., Тюмен. у.), Шанховскій, М. Н.
(Тобольскъ), Шилковъ, В. Е. (д. Турушева, Мостов. вол., Ялуто-
ровскаго. у.).

Всѣмъ означеннымъ здѣсь лицамъ нельзя не выразить глубочайшей признательности за сочувственное отношение къ цѣлямъ Музея.

Въ заключеніе упомяну о библіотекѣ сел.-хоз. отдѣла Музея. Въ отчетный періодъ она пополнялась частію на средства, предоставленныя въ распоряженіе Музея для означенной цѣли М-ствомъ З. и Г. И. изъ остатковъ отъ разъездныхъ денегъ губ. агронома, частію жертвованными книгами. Въ концѣ 1898 г. мною окончено печатаніемъ 2-е дополненіе къ систематическому каталогу этой библіотеки; изданными 2-мя каталогами зарегистрировано всего 840 названій книгъ. По отдѣламъ онѣ распредѣляются такъ:

1 выпускъ 2 выпускъ
каталога. каталога.

1) Химія, физика, механика, геодезія	15	2
2) Минералогія, геологія, горное дѣло	9	4
3) Зоологія (систематика, анатомія, фізіология и пр.).	26	19
4) Ботаника	14	11
5) Книги разнаго ест.-ист. содержанія	20	13
6) Метеорологія	1	15
7) Вредныя для сельско.-хоз. растеній животныя и растенія	21	13
8) Почвовѣдѣніе (почвы, ихъ обработка и удобреніе)	22	21

9) Сельско-хозяйств. растениеводство . . .	24	22
10) Лѣсоводство	4	4
11) Огородничество и садоводство . . .	16	7
12) Скотоводство	21	28
13) Ветеринарія	6	6
14) Пчеловодство, рыболовство и шелководство	5	11
15) Сельско-хоз. орудія, машины, постройки, инженерные сооруженія	19	40
16) Молочное хозяйство	8	11
17) Сельско-хоз. и лѣсо-хоз. производства; кустарный и ремесленный промыслы. . .	25	41
18) Сельско-хоз. экономія	4	6
19) Полит. экономія, статистика, географія	13	18
20) Сельско-хоз. журналы и отчеты сельско-хоз. обществъ	40	42
21) Профессиональное образование . . .	19	17
22) Книги разнаго сельско-хоз. содерж.	25	68
23) Справочные книги	16	48
Всего	373	467

Консерваторъ Музея *Н. Скалоузубовъ*.



— до отъезда А. Н. отъездомъ В. Я. А. отъездомъ Т. Т., отъездомъ
— Елиз. Н. П. (бывш. губернаторомъ) И. А. виноград. М. Я., анон.
отъездомъ А. И. отъездомъ С. И. поездомъ И. Е. фамилии
вагасей М. С. (бывш. губернаторомъ) Л. А. виноград. Ю. И. (бывш. губернаторомъ)
— Ю. И. Я. виноград. О. Ф. (бывш. губернаторомъ) И. М. виноград. М. А.
О. Н. виноград. Л. И. (бывш. губернаторомъ) А. Л. виноград. А. А. отъездомъ
И. Ильин. И. Г. (бывш. губернаторомъ) А. М. виноград. И. Л. виноград. И.
Янгель. О. И. виноград. И. И. виноград. О. А. виноград. А. И.
И. Ф. виноград. И. И. виноград. И. И. виноград. О. А. виноград. А. И.
А. И. виноград. А. И. виноград. А. И. виноград. А. И. виноград. А. И.
Т. И. виноград. Т. И. виноград. Т. И. виноград. Т. И. виноград. Т. И.
Л. виноград. Т. И. виноград. Т. И. виноград. Т. И. виноград. Т. И.

ОТЧЕТЪ

о состояніи библиотеки Тобольского Губернского Музея за 1897 и 1898 гг.

Въ теченіе двухъ истекшихъ лѣтъ библиотека Музея пополнилась почти исключительно путемъ пожертвованій отъ разныхъ лицъ, обществъ и учрежденій, а также путемъ обмѣна на „Ежегодникъ“. Не считая дублетовъ, въ 1897 году въ нее поступило 432 названія разныхъ печатныхъ и рукописныхъ произведеній, записанныхъ въ инвентарномъ каталогѣ подъ №№ 5320—5751, а въ 1898 году—504 названія, записанныхъ подъ №№ 5752—6255: всего, такимъ образомъ, за десятилѣтній періодъ существованія библиотеки въ нее поступило 6255 №№-ровъ въ 7036 томахъ.

Пожертвованія за два отчетныхъ года поступили отъ слѣдующихъ лицъ:

а) въ 1897 году: отъ В. Г. Бажаева, барона де-Бая, А. Богдановскаго, А. Ф. Бычкова, Н. А. Варнаховскаго, К. Б. Газенвinkelя, свящ. В. Н. Герасимова, П. С. Гиbedo, И. К. Голубева, А. А. Городкова, Н. А. Городкова, А. А. Дунина-Горкавича, проф. А. М. Зайцева, В. А. Ивановскаго, Л. Н. Карамышева, А. А. Кауфмана, В. Ф. Костюрина, А. А. Крылова, Е. В. Кузнецова, И. П. Кузнецова, В. Н. Лаврова, Л. Е. Луговскаго, С. Н. Мамѣева, прот. А. А. Мисюрова, П. И. Панова, М. А. Пановскаго, Н. Н. Пантусова, С. К. Патканова, Ф. П. Романова, М. Сіязова, Н. Л. Скалоузбова, А. А. Т., В. А. Тройницкаго, В. М. Флоринскаго и С. П. Якубовича;

б) въ 1898 году: отъ князя С. Абамелекъ-Лазарева, И. Ф. Александрова, А. И. Аѳонина, Н. М. Богдановича, Н. А. Варпа-

ховского, Г. Г. Вознесенского, А. К. Върниковского, Н. А. Городкова, К. М. Дерюгина, А. И. Дмитріева-Мамонова, П. И. Емельянова, проф. А. М. Зайцева, Н. С. Знаменского, В. А. Ивановского, А. Калачева, Н. Ф. Катанова, Г. Карьялайнена, С. М. Кевлича, Л. М. Князева, М. Н. Костюриной, В. Ф. Костюрина, В. М. Крутовского, А. А. Крылова, И. А. Кучинского, Н. К. Куша, И. Ф. Ловягина, Л. Е. Луговского, М. А. Луговской, Е. Н. Маджи, П. И. Макушина, С. Н. Мамъева, Н. Н. Оглобина, И. К. Окулича, И. А. Орнатова, Н. И. Палопеженцева, Н. Н. Пантусова, Ф. П. Романова, М. Сіязова, Н. Л. Скалоузбова, Е. Ф. Соколова, А. А. Станкевича, А. Н. Судницына, Ю. Талько-Грынцевича, А. А. Т., В. А. Тройницкаго, Н. М. Чукмалдина, Д. А. Чукмасова, А. Г. Шахова, А. С. Шерстобитова, К. К. Ширмахера, А. Штернберга и С. П. Якубовича. .

Въ число жертвователей и вообще лицъ, такъ или иначе способствовавшихъ пополненію библіотеки, мною не включено еще одно лицо—секретарь зоологического отдѣленія общества любителей естествознанія, антропологии и этнографіи, сост. при Имп. Московскомъ у—тѣ, Г. А. Кожевниковъ, благодаря любезному содѣйствію котораго Музей въ 1898 году получилъ 71 выпускъ изданій этого общества, что составляетъ и по количеству и, въ особенности, по качеству весьма цѣнныій даръ для нашей библіотеки. Здѣсь же необходимо упомянуть, что бывшій библіотекарь Музея С. Н. Мамъевъ въ ноябрѣ 1897 года пожертвовалъ въ библіотеку Музея весьма большое по количеству и цѣнное по своей библіографической рѣдкости собраніе газетныхъ статей о Сибири (за разные годы). Къ сожалѣнію, мнѣ до сихъ поръ не пришлось по недостатку свободного времени разобрать эти статьи и записать въ инвентарный каталогъ.

Жертвовали въ библіотеку Музея свои „Труды“, „Отчеты“ и др. изданія, какъ сказано выше, также и разныя общества и учрежденія, а именно:

а) въ 1897 году:

общества: вспомоществованія бѣднымъ студентамъ изъ Тобольской губерніи, вспомоществованія учащимся въ Тобольской

гимназіи, изученія Амурскаго края, Тобольское міссіонерское, Тобольское общество взаимнаго страхованія отъ огня имуществъ; Иркутская городская публичная библиотека, магнитная метеорологическая обсерваторія въ г. Екатеринбургѣ, Минусинскій музей, Святѣйшій Синодъ, Тобольское Губернское Управлениe, Тобольскій и Пермскій статистические комитеты;

б) въ 1898 году:

Ботаническій Садъ Имп. Юрьевскаго у—та, Ветеринар. Отдѣленіе Тоб. Губ. Управления, Горный Институтъ Императрицы Екатерины II, Императорская Археологич. Комиссія, Императорская Археографическая Комиссія Имп. Москов. Археол. общества, Иркутская городская обществ. библиотека, Нижегородская Земская Управа, Лѣсной департаментъ М—ства Земледѣлія и Госуд. Имущество; общества: вспомоществованія учащимся въ Тобольской гимназіи, содѣйствія учащимся въ С.-Петербургѣ сибирякамъ, Тобольское общество взаимнаго страхованія отъ огня имуществъ, Петровское общество изслѣдователей Астраханскаго края; музеи: Нерчинскій, Стокгольмскій Сѣверный и Національный въ Монтевидео; статистич. комитеты: Енисейскій, Якутскій, Пермскій, Семипалатинскій и Тобольскій; типографія Тоб. Еп. Братства, 1-ый Тобольскій Отдѣлъ Имп. Москов. Общ. сельского хозяйства и бывшій Томскій Отдѣлъ того же общества, преобразованный въ 1898 г. въ Зап.-Сиб. общество сельского хозяйства.

Изъ повременныхъ и periodическихъ изданій частію въ даръ, частію въ обмѣнъ на „Ежегодникъ“, разными редакціями и учеными обществами и учрежденіями высыпались въ библиотеку Музея слѣдующія:

а) въ 1897 году:

- 1) Записки Зап.-Сиб. Отдѣла И. Р. Г. О.
- 2) Записки Приамур. Отдѣла И. Р. Г. О.
- 3) Записки Уральского общества любителей естествознанія.
- 4) Вѣстникъ золотопромышленности и горнаго дѣла вообще.
- 5) Извѣстія Имп. Том. Университета.
- 6) Извѣстія В.-С. Отдѣла И. Р. Г. О.
- 7) Извѣстія Имп. Акад. Наукъ.

- 8) Извѣстія Ирк. Город. Думы.
- 9) Извѣстія Геолог. Комитета.
- 10) Извѣстія Общ. Археологии, Истории и Этнографии при Имп. Казанскомъ университѣтѣ.
- 11) Иркутскія Епархіальные Вѣдомости.
- 12) Камчатскія Епархіальные Вѣдомости.
- 13) Киргизская Степная Газета.
- 14) Новь.
- 15) Отдѣлъ сельского хозяйства и кустар. промышленности. (Прилож. къ неоф. ч. „Тоб. Губ. Вѣд.“).
- 16) Приамурскія Вѣдомости.
- 17) Протоколы Троицкосавско-Кяхтинского Отдѣленія Приамур. Отдѣла И. Р. Г. О.
- 18) Протоколы Омскаго Медиц. Общества.
- 19) Протоколы и Труды Общества врачей Енисейской губ.
- 20) Сибирская Торговая Газета (съ № 101-го).
- 21) Сибирскій Листокъ.
- 22) Сѣверное Пчеловодство.
- 23) Тобольскія Губернскія Вѣдомости.
- 24) Тобольскія Епархіальные Вѣдомости.
- 25) Томскія Губернскія Вѣдомости.
- 26) Труды Геологического Комитета.
- 27) Труды Приамур. Отдѣла И. Р. Г. О.
- 28) Этнографическое Обозрѣніе.
- 29) *Annotationes Zoologicae Japonenses auspiciis Societatis Zoologicae Tokyonensis.*

б) въ 1898 году:

- 1) Акмолинскія Областныя Вѣдомости.
- 2) Алтайскій Сборникъ.
- 3) Вѣстникъ золотопромышленности и горнаго дѣла вообще.
- 4) Дѣловой Корреспондентъ.
- 5) Ежегодникъ по геологии и минералогии Россіи.
- 6) Енисей.
- 7) Записки Имп. Харьков. университета.

- 8) Записки Общ. изученія Амурскаго края (філіального
отдѣленія Приамур. Отдѣла И. Р. Г. О.).
- 9) Записки Приамурскаго Отдѣла И. Р. Г. О.
- 10) Записки Уральскаго Общества любителей естествознанія.
- 11) Землевѣдѣніе.
- 12) Извѣстія В.-С. Отдѣла И. Р. Г. О.
- 13) Извѣстія Имп. Акад. Наукъ.
- 14) Извѣстія Геологич. Комитета.
- 15) Извѣстія Иркут. Город. Думы.
- 16) Извѣстія Общ. Арх., Ист. и Этногр. при Казан. у—тѣ.
- 17) Камчатскія Епархіальные Вѣдомости.
- 18) Киргизская Степная Газета.
- 19) Отдѣль сельскаго хозяйства и кустарной промышл.
(Прилож. къ неоф. ч. „Тоб. Губ. Вѣд.“).
- 20) Протоколы и Труды Общества врачей Енисейской губ.
- 21) Протоколы Троицкосавско-Кяхтин. Отдѣленія Приамур.
Отдѣла И. Р. Г. О.
- 22) Протоколы Омскаго Медиц. Общества.
- 23) Протоколы Том. Общ. естествоиспытателей и врачей.
- 24) Сборникъ Пермскаго Земства.
- 25) Сибирская Торговая Газета.
- 26) Сибирскій Вѣстникъ.
- 27) Сибирскій Листокъ.
- 28) Справочный Листокъ.
- 29) Тобольскія Губернскія Вѣдомости.
- 30) Тобольскія Епархіальные Вѣдомости.
- 31) Томскія Губернскія Вѣдомости.
- 32) Труды Геологическаго Комитета.
- 33) Труды Имп. Спб. Общества естествоиспытателей.
- 34) Труды Общества естествоиспыт. при Имп. Казан. у—тѣ.
- 35) Ученые Записки Имп. Казанскаго университета.
- 36) Хозяинъ.
- 37) Anales del Museo Nacional de Montevideo.
- 38) Annotationes Zoologicae Japonenses auspiciis Socie-
tatis Tokyonensis.

39) Bulletin de la Société Imperiale des Naturalistes de Moscou.

Сношения съ разными лицами, редакциями периодическихъ и повременныхъ изданій, обществами и учрежденіями, русскими и иностранными, могущими быть полезными библіотекѣ Музея, поддерживались въ отчетное время какъ Комитетомъ, такъ и лично библіотекаремъ (мною—съ 12 октября 1897 г.) и консерваторомъ (Н. Л. Скалезубовымъ). Впрочемъ, каковы были эти сношения въ первую половину 1897 г., послѣ оставленія должности библіотекаря (съ 1 января этого года) почетнымъ членомъ Музея С. Н. Мамъевымъ (по случаю продолжительной командировкы его въ С.-Петербургъ), трудно сказать, такъ какъ въ дѣлахъ Музея нѣть никакихъ указаній, касающихся этого вопроса. Только во вторую половину этого года, и именно со времени сформированія нового Комитета (12 окт.), начались, повидимому, болѣе дѣятельныя сношения по вопросамъ, касавшимся библіотеки, благодаря чему въ концѣ этого года и въ 1898 году библіотека Музея обогатилась многими весьма цѣнными печатными и рукописными произведеніями. Списки этихъ поступленій, съ именами жертвователей, были публикованы мною въ „Сибирскомъ Листкѣ“ (въ №№ 91, 97 и 99 за 1897 г. и №№ 4, 5, 20, 23, 26, 27, 34, 37 и 58 за 1898 г.), и оттиски „списковъ“ разсылались жертвователямъ¹⁾.

Всѣ поступавшія въ Музей (за исключеніемъ дублетовъ) книги, брошюры, рукописи, газеты по мѣрѣ накопленія ихъ отдавались мною въ переплетъ, при чемъ, съ согласія Комитета, выраженного еще въ 1897 году, приходилось въ одинъ переплетъ соединять нерѣдко по нѣскольку брошюръ и книгъ болѣе или менѣе однороднаго содержанія; этимъ достигалась отчасти экономія, а отчасти, и, пожалуй, главнымъ образомъ удобство: маленькия, тонкія брошюры, будучи переплетены каждая отдельно, занимаютъ на полкѣ гораздо больше мѣста, чѣмъ когда нѣсколь-

1) Къ сожалѣнію, списокъ поступленій съ 22 апрѣля 1898 г. по 1 января 1899 года не могъ быть мною напечатанъ (за недостаткомъ свободнаго времени).

ко такихъ брошюре заключены въ одинъ переплетъ, да и отыскывать на полкахъ тонкія брошюры въ отдѣльныхъ переплетахъ не легко; переплетъ каждой такой брошюры, стоявшій прежде 5—7 коп., при теперешнемъ способѣ переплета обходится почти вдвое дешевле.

Размѣщены книги въ пяти большихъ и двухъ малыхъ шкафахъ по форматамъ (съ 12 окт. 1897 г.), чѣмъ значительно достигнута экономія мѣста. Несмотря, однако, на это, уже теперь, при прогрессивно-увеличивающемся ростѣ библіотеки, приходится серьезно задумываться надъ вопросомъ о расширеніи помѣщенія библіотеки и прибавленіи шкафовъ. Одинъ шкафъ (№ 47) занятъ исключительно книгами, принадлежавшими прежде К. Б. Газенвinkelю и пожертвованными отчасти имъ самимъ, отчасти его вдовою; при чѣмъ шкафъ этотъ, согласно волѣ вдовы К. Б. Газенвinkеля, много потрудившагося на пользу Музея, носитъ осоное название—„Библіотека К. Б. Газенвinkеля“.

Какъ рукописными, такъ и печатными произведеніями, хранящимися въ библіотекѣ Музея, пользовались въ отчетное время немногія лица: въ 1897 году—только 17 лицъ брали на домъ разныя изданія, въ количествѣ 69 томовъ, а въ 1898 г.—32 человѣка взяли 303 тома, а всего за два отчетныхъ года было взято изъ библіотеки на домъ 372 тома—число, незначительное для Тобольска. Явленіе это отчасти можно объяснить тѣмъ обстоятельствомъ, что до второй половины 1898 года не существовало у насъ новаго печатнаго систематического каталога библіотеки.

Первый систематический каталогъ библіотеки, составленный бывшимъ библіотекаремъ Музея С. Н. Мамѣевымъ, былъ изданъ въ апрѣлѣ 1890 г.; въ него вошли 489 №№-ровъ печатныхъ и рукописныхъ произведеній, поступившихъ въ библіоеку Музея съ 1888 г. Затѣмъ, въ виду значительного роста библіотеки, въ 1892 году явилась потребность составить новый, болѣе полный систематический каталогъ, который и начать былъ составленіемъ; но напечатано было всего 364 названія (на 24 стр.), дальнѣйшее же печатаніе его, какъ о томъ заявлено С. Н. Мамѣевымъ въ предисловіи къ корректурному изданію этого каталога и въ отчетѣ

за 1893 годъ, было пріостановлено „по независящимъ отъ библіотекаря обстоятельствамъ“. Между тѣмъ, благодаря особеннымъ заботамъ бывшаго въ то время библіотекаремъ С. Н. Мамѣева, сумѣвшаго привлечь къ содѣйствію библіотекѣ много отдельныхъ лицъ, обществъ и учрежденій, библіотека продолжала пополняться такимъ количествомъ разныхъ печатныхъ и рукописныхъ произведеній, что для отыскыванія въ ней необходимыхъ изданій пользоваться однимъ „инвентарнымъ каталогомъ“ и названными выше неполными систематическими каталогами становилось весьма затруднительно: поэтому въ 1893 году (въ августѣ и сентябрѣ), въ бытность мою помощникомъ библіотекаря Музея, мною былъ составленъ карточный алфавитный указатель именъ, лицъ и предметовъ къ „инвентарному каталогу“. Пока было у меня свободное время, я поддерживалъ этотъ „указатель“, постоянно дѣлая въ немъ добавленія, но затѣмъ (въ маѣ 1895 г.) былъ отвлеченъ отъ этого занятія другими — прямыми обязанностями по службѣ (вслѣдствіе чего долженъ былъ на время отказаться даже отъ должности помощника библіотекаря), и продолженіе (дополненіе) указателя было мною оставлено. Нѣкоторыя лица дѣлали попытки дополнить его, но неудачно, при чёмъ эти попытки скоро и совсѣмъ прекратились. Снова былъ поднятъ вопросъ о составленіи новаго полнаго систематического каталога, и Распорядительный Комитетъ въ засѣданіи своемъ 25 января 1897 г. поручилъ мнѣ заняться этимъ дѣломъ. Каталогъ вчернѣ мною былъ составленъ къ сентябрю того же года, но такъ какъ при названіи каждой книги необходимо было сдѣлать указаніе на шкафъ и мѣсто нахожденія ея въ шкафу, а при тогдашнемъ размѣщеніи книгъ въ шкафахъ указанія эти дѣлать было безцѣльно, то мною былъ возбужденъ вопросъ о болѣе рациональной постановкѣ книгъ. До того времени книги располагались въ шкафахъ въ хронологическомъ порядкѣ поступленія ихъ въ библіотеку (по „инвентарному каталогу“); но отъ этого происходило одно весьма важное неудобство: рядомъ съ книгой большого формата очень часто стояла книга малаго формата, затѣмъ — опять большого и т. д.; это вело къ тому, что въ библіотечныхъ шкафахъ непроизводительно те-

рялось много мѣста, вслѣдствіе чего иногда для экономіи послѣдняго нѣкоторыя книги помѣщались въ два ряда, другія—надъ книгами меньшаго формата и проч. Н. Л. Скалозубовъ и я находили болѣе цѣлесообразной постановку книгъ не по отдѣламъ систематического каталога, а по форматамъ, какъ это дѣлается въ настоящее время въ большихъ библіотекахъ всѣхъ ученыхъ обществъ и учрежденій, каковы: Императорская Публичная Библіотека, Академія Наукъ, Университеты, Институты и проч. Вопроſъ этотъ обсуждался въ засѣданіи Комитета 20 сентября 1897 г., при чёмъ было постановлено предоставить мнѣ сдѣлать размѣщеніе книгъ по ихъ форматамъ. Дѣло это, въ которомъ самое горячее и дѣятельное участіе принималъ Н. Л. Скалозубовъ, было приведено къ концу ко времени общаго собранія членовъ Музея—12 октября 1897 года, когда помощница библіотекаря М. Н. Костюрина, исправлявшая должность библіотекаря съ 1 января 1897 г. до дня общаго собранія вмѣсто выбывшаго библіотекаря С. Н. Мамѣева, снова подняла вопросъ о желательности или нежелательности предпринятой мною и Н. Л. Скалозубовымъ указанной выше реформы въ дѣлѣ размѣщенія книгъ въ библіотекѣ Музея. Послѣ сдѣланныхъ Н. Л. Скалозубовымъ, А. С. Сухановымъ, мною и другими лицами разъясненій новый порядокъ устройства библіотеки былъ одобренъ. Тогда только явилась возможность сдѣлать въ составленномъ мною каталогѣ указанныя выше отмѣтки¹⁾). Это заняло довольно много времени, и каталогъ вполнѣ былъ оконченъ только къ марта прошлаго года, когда можно было приступить къ его печатанію. Къ сожалѣнію, быстро это дѣло не могло и не можетъ итти—отчасти по недостатку у меня свободнаго времени для его корректированія, отчасти и по другимъ причинамъ: лѣтомъ, напр., прошлаго года, когда мнѣ пришлось уѣхать въ С.-Петербургъ, продолжать печа-

¹⁾) Цѣлые числа съ дробью—въ строчкѣ, слѣдующей за названіемъ каждого произведенія, при чёмъ цѣлое число означаетъ № шкафа, числитель дроби—№ полки, а знаменатель—№ мѣста книги на полкѣ. Кроме того, за каждымъ цѣлымъ числомъ съ дробью поставлено въ скобкахъ цѣлое число, указывающее №, подъ которымъ данное произведеніе записано въ инвентарномъ каталогѣ.

таніе взялся покойный Л. Е. Луговскій, не успѣвшій прокорректировать и одного листа, и печатаніе возобновлено было только въ сентябрѣ; въ декабрѣ же типографія Епархіального Братства отказалась печатать его приблизительно до марта т. г., ссылаясь на массу срочной работы. Всего напечатано въ настоящее время 176 страницъ, куда вошли слѣдующіе отдѣлы:

I. 1) Богословіе, 2) Философія, психологія и этика, 3) Языковѣданіе, 4) Правовѣданіе и тюремовѣданіе, 5) Исторія, 6) Археологія, Палеографія и Нумизматика, 7) Естествовѣданіе и Математика, 8) Медицина, 9) Сельское хозяйство, 10) Географія и этнографія, 11) Статистика.

II. 1) Гражданское управление, городское и сельское самоуправление, 2) Военное и морское дѣло, 3) Поземельное устройство и переселенческое дѣло, 4) Врачебно-санитарное и ветеринарное дѣло.

Теперь начать печатаніемъ новый отдѣлъ, подъ названіемъ „Народное образование. Печать. Ученые и просвѣтительныя общества и учрежденія“.

Остается напечатать еще столько же, а одновременно съ этимъ и „Первое дополненіе“ къ этому каталогу, которое мною постепенно составляется. Окончанія печатанія каталога нужно ожидать не ранѣе декабря т. г. (1899); но и та часть, которая напечатана, теперь значительно облегчаетъ пользованіе нашей библіотекой: главные отдѣлы уже напечатаны, какъ видно изъ вышесказанного, и освободившимися карточками можно теперь пользоваться для отыскиванія книгъ.

Библіотекарь Музея *A. Терновскій.*



ОТЧЕТЪ

по продажѣ изданій, принадлежащихъ Музею, и отданныхъ ему на
комиссію, за 1897 и 1898 гг.

ОТЪ КОГО И КАКІЯ ИЗДАНІЯ
ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ.

	Количество экз., остав- шихся къ 1-му января 1897 г.	Стоймость од- ного экземпляра		Продано въ течение 1897 и 1898 гг.		Удержано въ пол- зу Музея комис- сионныхъ %-въ.		Собираеть уплатить за проданные из- данія.		Количество экз., остав- шихся къ 1-му января 1899 г.
		Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	
<i>C. H. Мамьевъ.</i>										
1—Матеріалы для бібліографії Сибири. Г. I. 1892 .	6 1 —			1 1 —		— 20 —	80	—		
2—To же. Г. II. 1893. . .	4 — 75			4 3 —		— 60 —	2 40	—		
3—To же. Г. III. 1894 .	10 — 75			4 3 —		— 60 —	2 40	1		
4—To же. Г. IV. 1895. .	10 — 75			3 2 25 —		— 45 —	1 80	2		
5—Періодическая печать Си- бири. 1892.	16 — 15			3 — 45 —		— 9 —	36	13		
6—To же. 1893.	15 — 15			3 — 45 —		— 9 —	36	12		
7—To же. 1896.	10 — 20			2 — 40 —		— 8 —	32	8		
8—Бібліографія жел.-дорож. вопроса Сибири. 1895. .	18 — 50			3 1 50 —		— 30 —	1 20	15		
9—Рукописи бібліотеки То- больского Музея. Вып. I. 1894.	6 — 50			2 1 —		— 20 —	80	4		
10—To же. Вып. II. 1896. .	— — 50			2 1 —		— 20 —	80	18		
	— — —			— 14 5		2 81 11 24	—			
<i>E. B. Кузнецова.</i>										
1—Сказанія и догадки объ имени Ермака	93 — 25			2 — 50 —		— 10 —	40	91		
2—Бібліографія Ермака. 1891.	86 — 25			3 — 75 —		— 15 —	60	83		
3—Изъ Сибирской старины.	5 — 25			4 1 —		— 20 —	80	1		
4—Сибирскій лѣтописецъ .	5 — 60			4 2 40 —		— 48 —	1 92	1		
	— — —			4 65 — 93		3 72 —	—			

ОТЪ КОГО И КАКІЯ ИЗДАНІЯ
ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ.

Количество экз., оставшихся къ 1-му января 1897 г.	Стоимость одного экземпляра		Продано въ теченіе 1897 и 1898 гг.		Удержано въ пользу Музея комиссіонныхъ о-въ.		Слѣдуетъ уплатить за проданный изданій.		Количество экз., остав. къ 1-му января 1899 г.	
	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.		
<i>A. A. Крыловъ.</i>										
1—Наслѣдникъ Цесаревичъ въ Тобольскѣ	1	—	25	1	—	25	—	5	—	20
2—Навстрѣчу Нансена. 1893.	3	—	35	3	1	5	—	21	—	84
3—Празднованіе юбилея Тоб. духов. семинаріи	8	—	30	2	—	60	—	12	—	48
4—Освященіе зданія Тоб. гимназіи	9	—	15	1	—	15	—	3	—	12
5—Проѣздъ Наслѣдника по Тобольской губерніи	—	—	25	2	—	50	—	10	—	40
	—	—	—	—	—	255	—	51	2	4
<i>П. И. Пановъ.</i>										
1—Историч. записка о сост. Тоб. гимназіи	10	—	75	—	—	—	—	—	—	10
2—100-лѣтній юбилей Тоб. гимназіи	13	—	25	—	—	—	—	—	—	13
<i>К. М. Голодниковъ.</i>										
1—Тобольскъ и его окрест.	31	1	—	3	3	—	—	45	255	28
2—Празднованіе Тобольскомъ 300-лѣтней годовщины .	1	—	20	—	—	—	—	—	—	1
<i>О. П. Рудакова</i>										
Ф. В. Рудаковъ, педаг.-дѣят. Сибири	10	1	—	1	1	—	—	20	—	80
<i>С. И. Гашинскій.</i>										
Система бар. Н. И. Вревскаго.	5	2	—	—	—	—	—	—	—	5
<i>Н. С. Знаменскій.</i>										
Искерь	6	—	50	1	—	50	—	10	—	40
<i>М. Тимофеевъ.</i>										
О мѣрѣ пресѣченія при до- знаніи.	2	—	30	—	—	—	—	—	—	2

	Количество экз., оставшихся к 1-му января 1897 г.	Стоймость одного экземпляра	Продано въ теченіе 1897 и 1898 гг.		Удержано въ пользу Музея комиссіонныхъ о-въ.	Слѣдуетъ уплатить за проданныя издания.	Количество экз., остав. къ 1-му января 1899 г.
			Р.	К.			
<i>Бар. О. В. Фредериксъ.</i>							
Помощь переселенцамъ . . .	35	1 —	1	1 —	— 20 — 80	34	
<i>М. А. Рыловъ</i>							
Какъ поднять мелкое и куст. кожевенное производство.	—	— 10	—	—	—	—	17
<i>Д. Чукмасовъ.</i>							
Практ. руков. по мыловаренію.	—	— 40	—	—	—	—	38
<i>Вост.-Сиб. Отд. И. Р. Г. О.</i>							
Гр. Н. Н. Муравьевъ-Амурскій. Кн. I и II . . .	9	6 50	—	—	—	—	9
<i>Тип. Тоб. Губ. Упр.</i>							
1—Календарь Тоб. губ. на 1890 г.	6	1 —	—	—	—	—	6
2—То же на 1892 г. . .	3	1 —	—	—	—	—	3
3—То же на 1893 г. . .	9	1 —	—	—	—	—	9
4—То же на 1894 г. . .	4	— 80	—	—	—	—	4
5—То же на 1895 г. . .	12	1 —	2	2 —	— 40 — 1 60	10	
<i>Канцел. Тоб. Губ. Управл.</i>							
Карты уѣздовъ: Тюменскаго.	2 —	35	2 —	70	— 14 — 56	—	
Курганскаго	4 —	35	3	1 5	— 21 — 84	1	
Ишимскаго .	2 —	35	2 —	70	— 14 — 56	—	
Тарскаго. .	2 —	35	2 —	70	— 14 — 56	—	
Карты южныхъ округовъ (уѣздовъ) Тоб. губерніи.	16 —	35	1 —	35	— 7 — 28	15	
<i>I. Шустерь.</i>			—	—	— 3 50 — 70 2 80	—	
Фотограф. виды	20	— 60	7	4 20	— 42 3 78	13	
<i>Кочешевъ.</i>							
Фотографіи	50	— 50	15	7 50	1 50 6 —	35	
Всего	557	— --	—	43 95	8 22 35 73	—	

Изъ состоявшихъ къ 1-му января 1897 г. на комиссії 557 различныхъ изданій на сумму 335 руб. 5 коп. въ теченіе отчетнаго времени было возвращено С. Н. Мам'еву 15 экз. его „Матеріаловъ для библіографії Сибири“ (гг. I, III и IV—по 5 экз. каждого) на сумму 12 р. 50 к.

Вновь за то же время поступило на комиссию: отъ С. Н. Мамъева—20 экз. „Рукописей библиотеки Тоб. Губ. Музея“ (вып. II) на сумму 10 руб., отъ А. А. Крылова—11 экз. брошюры „Прѣздѣ Наслѣдника по Тобольской губерніи“ на сумму 2 руб. 75 коп., отъ М. А. Рылова—17 экз. брошюры „Какъ поднять мелкое и кустарное кожевенное производство“ на сумму 1 руб. 70 коп. и отъ Д. Чукмасова—38 экз. „Практическаго руководства по мыло-варенію“ на сумму 15 руб. 20 коп.; всего—на 29 руб. 65 коп.

За проданныя изданий отдано Н. С. Знаменскому 2 руб. (за 1896, 97 и 98 гг.) за 5 экз. брошюры „Искръ“ и И. Шустеру 3 руб. 24 коп. за 6 экз. фотографий: всего — 5 руб. 24 коп.

Остается уплатить за все проданные въ 1897 и 1898 гг. изданія 32 руб. 9 коп.

ІЗДАНІЯ, ПРИНАДЛЕЖАЩІЯ МУЗЕЮ.	Кількість экз., оставшихся к 1-му січня 1897 р.	Стоимость одногого экземпляра	Продано въ теченіе 1897 и 1898 гг.		Удержано въ пользу Музея комиссіоннихъ 0-вв.	Слѣдуетъ уплатить за проданныя изданія.	Кількість экз., остав. к 1-му січня 1899 г.
			Количества экземпляровъ.	На сумму			
	Р. К.	Р. К.	Р. К.	Р. К.	Р. К.	Р. К.	Р. К.
1 — <i>Луговскій. Списокъ растеній, встрѣчающихся въ Тобольске и его окрест.</i>	12 — 15	2 — 30	— —	— —	— —	— —	10
2 — <i>Словцовъ. Какъ сохранять перо и мѣха</i>	196 — 10	1 — 10	— —	— —	— —	— —	195
3 — <i>Бартеневъ. Понятія обдор. остыковъ о грѣхѣ. .</i>	208 — 5	3 — 15	— —	— —	— —	— —	205
4 — <i>Катановъ. Преданія Тоб. татаръ о Кучумѣ. . . .</i>	— — 5	6 — 30	— —	— —	— —	— —	422

5— <i>Терновский. Библиографія и иконографія Тоб. Губ. Музея</i>	9 — 25	1 — 25 — — — —	8
6— <i>Газенвінкель. Государево жалованье</i>	— — 60	2 1 20 — — — —	2
7— <i>Гурскій. Поѣздка на Сѣв. Ураль.</i>	— — 25	5 1 25 — — — —	11
8— <i>Скалозубовъ. Какіе продукты пригот. изъ кости.</i>	— — 2	2 — 4 — — — —	83
9— <i>Его же. Какіе продукты получаются изъ дерева .</i>	— — 2	3 — 6 — — — —	153
10— <i>„Ежегодникъ“. Вып. I</i>	*) *)	4 2 70 — — — —	184
“ “ II		4 2 70 — — — —	197
“ “ III		4 2 70 — — — —	242
“ “ IV		4 2 70 — — — —	266
“ “ V		4 2 70 — — — —	169
“ “ VI		4 2 70 — — — —	62
“ “ VII		4 2 70 — — — —	215
“ “ VIII		5 1 50 — — — —	179
“ “ IX		1 — 30 — — — —	201
11— <i>Фотограф. виды Музея .</i>	8 — 50	3 1 50 — — — —	5
12— <i>Каталоги Музея . . .</i>	— — 20	4 — 80 — — — —	—
13— <i>Уставъ Музея (1890 г.) .</i>	13 — 10	1 — 10 — — — —	12
Всего продано на .	— — — —	26 75 — — — —	—

Членъ Комитета *A. Ушаровъ.*

*) Для членовъ Музея цѣна каждого выпуска „Ежегодника“ (I—IX)—30 коп., для постороннихъ лицъ—1 руб. безъ пересылки, а для книжныхъ магазиновъ—скидка въ 20%.

ОТЧЕТЪ

по продажѣ издѣлій и коллекцій изъ Уральскихъ камней
за 1897 и 1898 гг.

	РУБ. К.
Продано въ 1897 году:	
1—Яйца изъ разл. камней (135 экз.) на сумму	11 33
2—Шкатулки (11 экз.)	15 59
3—Прессы (18 экз.)	25 63
4—Горки изъ разл. камней (9 экз.).	9 35
5—Букетницы (4 экз.)	2 —
6—Запонки (17 экз.) и брелоки (23 экз.)	21 98
7—Боченокъ мраморный и домики (3 экз.)	5 46
8—Непельницы (65 экз.), спичечницы (4 экз.) и мундштуки (5 экз.).	19 29
9—Чернильные приборы (5 экз.) и ручки малахи- товая (3 экз.)	6 05
10—Нить изъ топазовыхъ бусъ и топазовый крестикъ	5 50
11—Печать и хризол. камни для вставокъ (5 экз.) .	1 30
12—Коллекція камней (6 экз.)	15 40
 Всего продано въ 1897 г. на сумму	138 88
Продано въ 1898 году:	
1—Прессы (2 экз.)	7 20
2—Яйца изъ различныхъ камней (16 экз.).	1 60
3—Непельницы (4 экз.)	1 80
4—Горки изъ различныхъ камней (5 экз.).	4 70
5—Запонки яшмовыя (2 экз.) и брелоки (14 экз.) .	7 25
6—Камни яшмовые для печати и вставки	1 12
7—Коллекція камней	1 10
 Всего продано въ 1898 году на сумму	24 77
 Итого за два года	163 65
Удержано въ пользу Музея	32 73
 Слѣдуетъ уплатить Екатеринбургской Зем- ской Управѣ	130 92
 Къ 1-му января 1899 г. осталось непроданныхъ издѣлій и коллекцій на 156 руб. 8 коп.	

Членъ Комитета *A. Ушаровъ*.

Составлено в Тобольске в 1898 г. в один день с изданием № 7081.

Издательство М. С. Глебова, Тобольск. Печатано в типографии А. И. Степанова, Тобольск. Допущено к продаже в Тобольске А. И. Степановом.

Стоимость книги 50 копеек. Книга эта не имеет ценности в качестве памятника истории и искусства.

Составлено в Тобольске в 1898 г. в один день с изданием № 7081.

ДЕНЕЖНЫЕ ОТЧЕТЫ

по

ТОБОЛЬСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ МУЗЕЮ

за 1897 и 1898 гг.

Приходъ.

1897.

	РУБ.	К.	РУБ.	К.
Къ 1-му января 1897 года состояло:				
I. Основного капитала	1164	64		
II. Издательского фонда	197	22		
III. Оборотнаго капитала	1314	9	2675	95
Въ 1897 году поступило:				
I. Входной платы за посѣщеніе Музея . . .	164	90	164	90
II. Членскихъ взносовъ:				
1) городскихъ	95	—		
2) иногородныхъ	6	—	101	—
III. %-товъ за комиссионную продажу:				
1) печатныхъ произведеній и фотографій .	2	75		
2) издѣлій изъ мамонтовой кости . . .	20	63		
3) каменныхъ издѣлій Екат. Зем. Управы .	27	78	51	16
IV. %-товъ на				
1) основной и оборотный капиталы . . .	90	61		
2) издательскій фондъ	7	50	98	11
V. Пожертвованій:				
1) отъ М-ства Земледѣлія и Гос. Имущ. .	500	—		
2) „ Л. М. Князева	15	—		
3) „ лица, пожелавшаго остаться неизв.	110	68		
4) на изд. „Ежегодника Тоб. Губ. Музея“:				
а) отъ А. А. Дунинъ-Горкевича . . .	136	92		
б) „ Н. Л. Скалозубова	94	20	856	80
VI. Кружечнаго сбора	7	35	7	35
VII. Отъ продажи „Ежегодника“ и др. изд. .	19	80	19	80
VIII. Случайныхъ поступленій:				
1) отъ продажи съ аукціона негод. вещей .	65	96	65	96
Всего въ приходѣ	—	—	1365	8
IX. Переходящія суммы:				
1) на покупку коллек. для Бугурсл. библ.	10	—		
2) подлежащія отсылкѣ въ Екатеринбургъ за проданныя каменные издѣлія . . .	111	10	121	10
Всего съ перех. суммами	—	—	1486	18
Итого съ остатками	—	—	4162	13

1897.

Расходъ.

Въ 1897 году израсходовано:	РУБ.	К.	РУБ.	К.
I. Жалованье:				
1) смотрительницѣ Музея	163	90		
2) служителю при Музеѣ	60	—	223	90
II. Канцелярские расходы:				
1) на покупку бумаги, конвертовъ, марокъ и проч.	11	72		
2) на печатаніе бланковъ, объявленій и пр.	6	93		
3) почтовые расходы	8	48	27	13
III. Хозяйственные расходы:				
1) на отопленіе зданія Музея	110	68		
2) „ уплату за водоснабженіе, чистку трубъ мытье половъ и проч. мелкие расходы	37	6		
3) на ремонтъ зданія	26	5		
4) на храненіе процентныхъ бумагъ	140	175	19	
IV. Обстановка Музея, коллекціи и учебно-вспомогательные принадлежности:				
1) на устройство витринъ и шкафовъ	102	65		
2) „ коллекцій и ихъ храненіе	19	86		
3) на приобрѣтеніе волшебного фонаря	140	35	262	86
V. На издание „Ежегодника Тоб. Губ. Музея“:				
1) за печатаніе, бумагу и брошюровку VII и VIII вып.: а) въ Губернскую Типографію	129	61		
б) въ Типографію Епарх. Братства	80	51		
2) библиотекарю на расходы по составл. и печат. „Каталога“ (Х в. „Ежегодника“)	50	—	260	12
VI. Расходы по библиотекѣ:				
1) на переплетъ книгъ	74	29	74	29
VII. Уплачено за проданныя комиссіон. изданія			2	—
Всего въ расходѣ	—	—	1025	49
Въ остаткѣ къ 1-му января 1898 года:				
I. Основного капитала вмѣстѣ съ отчисленными 10% съ поступленій (+79 р 66 к.)	1244	30		
II. Издательск. фонда вмѣстѣ съ % (+7 р. 50 к.)	204	72		
III. Оборотного капитала	1566	52		
IV. Переходящихъ суммъ	121	10	3136	64
Всего въ остаткѣ	—	—	3136	64
Балансъ	—	—	4162	13

Приходъ.

1898.

	РУБ.	К.	РУБ.	К.
Къ 1-му января 1898 года состояло:				
I. Основного капитала	1244	30		
II. Издательского фонда	204	72		
III. Оборотного капитала	1566	52		
IV. Переходящихъ суммъ	121	10	3136	64
Въ 1898 году поступило:				
I. Входной платы за посѣщеніе Музея	152	43	152	43
II. Членскихъ взносовъ:				
1) городскихъ	114	—		
2) иногородныхъ	30	—	144	—
III. %-товъ за комиссионную продажу:				
1) печатныхъ произведеній и фотографій	1	80		
2) издѣлій изъ мамонтовой кости	4	08		
3) каменныхъ издѣлій изъ Екатеринбурга	4	95	10	83
IV. %-товъ на				
1) на основной и оборотный капиталы	77	55		
2) издательскій фондъ	7	75	85	30
V. Пожертвованій:				
1) отъ Н. Л. Скалезубова (изъ оставшихся разъезд., съ разрѣш. М-ства З. и Г. И.).	375	45		
2) отъ Л. М. Князева	8	11		
3) отъ лица, пожелав. остаться неизвѣст.	114	8	497	64
VI. Случайныхъ поступленій:				
1) отъ продажи негодныхъ вещей	14	73	14	73
Всего въ приходѣ	—	—	904	93
VII. Переходящія суммы:				
1) подлежащія отсылкѣ Екатеринбургской Земской Управѣ за каменные издѣлія	19	82	19	82
Всего съ переход. суммами	—	—	924	75
Итого съ остатками	—	—	4061	39

Расходъ.**1898.**

Въ 1898 году израсходовано:	РУБ.	К.	РУБ.	К.
I. Жалованье:				
1) смотрительнице Музея	200	—		
2) служителю при Музеѣ	60	—	260	
II. Канцелярские расходы:				
1) на покупку бумаги, конверт., мар. и пр.	26	50		
2) " печатаніе бланковъ, объявлений и пр.	14	23		
3) " почтовые расходы	14	63	55	36
III. Хозяйственные расходы:				
1) на отопленіе зданія Музея	114	8		
2) " уплату за водоснабженіе, чистку трубъ, мытье половъ и другіе мелкие расходы	32	34		
3) на ремонтъ зданія	19	—		
4) " храненіе процентныхъ бумагъ	—	55	165	97
IV. На обстановку Музея, коллекціи и учебно-вспомогательные принадлежности:				
1) устройство витринъ, шкафовъ и проч.	145	10		
2) приобрѣтеніе и храненіе коллекцій	44	68		
3) приведен. въ поряд. коллекц. и декор. раб.	82	99		
4) принадлежности для фотографированія	13	50	286	27
V. На изданіе „Ежегодника Тоб. Губ. Музея“:				
1) за бумагу, печатаніе и брошюры. IX вып.:				
а) въ Губернскую Типографію	62	26		
б) въ Типографію Епарх. Братства	145	87		
2) библиотекарю на расходы по составл. и печ. „Каталога“ (X вып. „Ежегод.“).	70	—	278	13
VI. Расходы по библиотекѣ:				
1) на покупку книгъ	212	9		
2) " переплетъ книгъ	109	1	321	10
Всего въ расходѣ	—	—	1366	83
Въ остаткѣ къ 1-му января 1899 года:				
I. Основного капитала вмѣстѣ съ отчисленными 10% съ поступлений (+ 79 р. 27 к.)	1323	57		
II. Издательск. фонда вмѣстѣ съ 0% (+ 7 р. 75 к.)	212	47		
III. Оборотного капитала	1017	60		
IV. Переходящихъ суммъ	140	92	2694	56
Всего въ остаткѣ.	—	—	2694	56
Балансъ	—	—	4061	39

1891

С М Ф

оборота суммъ Тобольского Гу

Приходъ.

	Среднее за по- следние три года.	Въ дѣйствитель- ности.	
		Сумма.	Итого.
		Руб.	К.
Въ остаткѣ къ I-му января 1899 года.			
Основного капитала	—	—	1323 57
Издательского фонда	—	—	212 47
Оборотного капитала	—	—	1017 60
Переходящихъ суммъ	—	—	140 92 2694 56
Ожидаемыя поступленія.			
1—Входной платы за посѣщеніе Музея . . .	164	39	150 —
2—Членскихъ взносовъ	132	—	130 —
3—% въ за комиссионную продажу	34	76	35 —
4—% въ на капиталы	77	86	80 —
5—Пожертвованій и случайныхъ поступленій .	544	99	550 —
6—Отъ продажи „Ежегодника“ и др. изданій .	16	3	15 — 960 —
Итого съ остатками	—	—	3654 56

3) Окончательный

ТАМПОВСКОГО МУЗЕЯ

бернскаго Музея на 1899 годъ.

Расходъ.

расхода и тѣхъ определеній 4) Жалованіе домъ „Благодати“ жной въ Адмініономъ Понно По предположенію	Среднее за по- следніе три года		Въ дѣйствитель- ности.	
			Сумма.	Итого.
	Руб.	К.	Руб.	К.
Предполагаемые расходы.				
1—Жалованье смотрительницѣ и сторожу Музея	229	63	—	265
2—Канцелярские расходы	33	65	—	30
3—Хозяйственные расходы	132	14	—	
а) отопленіе зданія Музея	—	—	112	
б) ремонтъ зданія и печей	—	—	150	
в) мелочные расходы	—	—	35	297
4—Обстановка Музея, храненіе и устройство коллекцій	192	58	—	200
5—Издание „Ежегодника“	304	42	—	300
6—Расходы по библіотекѣ	177	52	—	200
Всего въ расходѣ	—	—	—	1292
Предполагаемый остатокъ на 1-му января 1900 года.				
Основного капитала	—	—	1419	57
Издательского фонда	—	—	220	54
Оборотнаго капитала	—	—	581	53
Переходящихъ суммъ	—	—	140	92
			2362	56
Итого съ остаткомъ	—	—	3654	56

АКТЬ Ревизіонной Комиссіи.

Ревизіонная Комиссія, провѣривъ приходо-расходную книгу и кассовые отчеты Тобольскаго Губернскаго Музея за 1897 и 1898 гг., нашла, что таковыя согласны съ указанными въ нихъ документами.

1) Къ началу 1897 состояло основнаго капитала 1164 руб. 64 к. и неприкосновеннааго фонда на изданія 197 р. 22 к. и расходнаго 1314 р. 9 к., а всего 2675 р. 95 коп. Въ 1897 году поступило на приходъ 1486 р. 18 коп., а въ 1898 году поступило 924 р. 75 коп., всего за два года съ остаточными должно быть на приходъ къ началу 1899 года 5086 р. 88 к.; израсходовано же за два года (1025 р. 49 к. + 1366 р. 83 к.)—2392 р. 32 коп. Остается къ 1-му января 1899 года 2694 р. 56 коп., каковая сумма въ дѣйствительности и записана съ слѣдующимъ распределениемъ: основного капитала—1323 р. 57 коп., переходящихъ суммъ—140 р. 92 к., неприкосновеннааго фонда на изданія—212 р. 47 к. и расходнаго—1017 р. 60 к.; но послѣдняя сумма—1017 р. 60 к.—вся ли принадлежитъ Музею или только часть ея, въ отчетѣ не указано, а между тѣмъ по отчету за 1896 годъ значатся неуплаченными С. Н. Мамѣеву по библіотекѣ 20 р. 56 к. и авторамъ за проданныя комиссіонныя изданія 107 руб.

2) Приходо-расходную книгу слѣдуетъ завести новую и показывать въ отдѣльныхъ графахъ записи билетовъ и записи наличныхъ денегъ, чтобы избѣжать возможныхъ недоразумѣній и неточностей, что и случалось при покупкѣ 3-хъ свидѣтельствъ 4% ренты вслѣдствіе записи ихъ по курсу, а не по номинальной стоимости.

3) Относительно денежныхъ расходовъ нужно замѣтить, что они производятся единолично, безъ постановлений Комитета Музея, за исключениемъ незначительныхъ расходовъ; необходимо расходы производить по уполномочию на то Комитета Музея. Въ ст. 4 расхода 1897 г. въ суммѣ 2 р. 90 к. не указаны предметы расхода и нѣтъ оправдательныхъ документовъ.

4) Желательно, чтобы составлялся подробный счетъ по продажѣ „Ежегодника“, продажѣ книгъ комиссионныхъ, Уральскихъ вещей и др., а также желательно имѣть опись имущества Музея.

По повѣркѣ (контрольной) коллекцій Музея и библіотеки по инвентарю и каталогамъ все оказалось въ наличии согласно съ записями.

О всемъ изложенномъ и составленъ настоящій актъ.

Члены Ревизіонной Комиссіи:

Вл. Васильевскій.	А. Городковъ.	Н. Знаменскій.
-------------------	---------------	----------------

1899 года
Февраля 18 дня.



СОСТАВЪ
Тобольского Губернского Музея,
состоящаго подъ АВГУСТЪЙШИМЪ
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМЪ.

(Къ 1 января 1899 г.)

(Оъ 31 августа 1891 г.)

Благодаря
Академии, которой принадлежит Губернаторский музей
и г. Рейнеке в звании действительного членов Академии

Бордановичъ атотимъ нынѣ этиడионъ

Благодаря

АВГУСТЪЙШІЙ ПОКРОВИТЕЛЬ
ТОВОЛЬСКАГО ГУВЕРНСКАГО МУЗЕЯ

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ

НИКОЛАЙ II АЛЕКСАНДРОВИЧЪ.

(Съ 31 августа 1891 г.)

Любезнейший Государь Альфонсъ Николаевичъ Бордановичъ

Губернаторъ Тобольской губернии и Тобольской губернаторъ

Сибирской губернии и Тобольской губернаторъ

Сибирской губернаторъ

Распорядительный Комитет.

(Съ 1 января 1897 г.—по 1 января 1900 г.).

Предсѣдатель—Леонидъ Михайловичъ **Князевъ**.

Товарищъ Предсѣдателя—Мих. Фед. **Фроловъ-Багровъ**.

Консерваторъ Музея—Николай Лукичъ **Скалозубовъ**.

Библіотекарь—Анатолій Александровичъ **Терновскій**.

Казначей—Степанъ Макаровичъ **Трусовъ**.

Секретарь—Александръ Никаноровичъ **Судницынъ**.

Члены Комитета:

Марія Николаевна **Костюрина**.

Викторъ Александровичъ **Энгельфельдъ**.

Николай Петровичъ **Бутенко**.

Александръ Федоровичъ **Ушаровъ**.

Ревизіонная Комиссія.

(1899 г.)

Александръ Александровичъ **Смолевъ**.

Владимиръ Петровичъ **Васильевскій**.

Алексѣй Александровичъ **Городковъ**.

Елпидифоръ Федоровичъ **Соколовъ**.

Редакціонная Комиссія.

Предсѣдатель и Секретарь Комитета.

Члены: Анатолій Александровичъ **Терновскій** (съ 31 янв.
1893 г.).

Николай Лукичъ **Скалозубовъ** (съ 26 іюня 1894 г.).

Александръ Федоровичъ **Ушаровъ** (съ 1899 г.).



I. Почетные члены*).

а) по избранию:

Агаангель, бывший епископъ Тобольскій и Сибирскій, нынѣ—
Рижскій и Митавскій (избр. 24 апр. 1895 г.). Рига.

Богдановичъ, Николай Модестовичъ, бывшій Тобольскій губерна-
торъ, нынѣ—Уфимскій (24 апр. 1895 г.). Уфа.

Вычковъ, Аѳанасій Федоровичъ, членъ Государ. Совѣта, ордин.
академикъ и директоръ Императорской Публичной
Библіотеки (31 мая 1891 г.). С.-Петербургъ.

Ермоловъ, Александръ Сергеевичъ, министръ Земледѣлія и Го-
сударственныхъ Имуществъ (26 іюня 1894 г.). Спб.

Лыткинъ, Николай Александровичъ, уѣздный ветеринарный врачъ
(14 окт. 1890 г.). Курганъ.

Мамѣевъ, Степанъ Николаевичъ, капитанъ Тобольского резервного
пѣхотного баталіона (14 окт. 1890 г.). Тобольскъ.

Островскій, Михаилъ Николаевичъ, статсь-секретарь, предсѣда-
тель департамента законовъ Государственного Совѣта
(14 окт. 1890 г.).

Скалоузубовъ, Николай Лукичъ, Тобольский правительственный
агрономъ (29 апр. 1896 г.). Тобольскъ.

Тройницкій, Владимиръ Александровичъ, бывшій Тобольскій гу-
бернаторъ (15 дек. 1890 г.). Спб.

б) по званію:

Тобольскій и Сибирскій архипастырь **Антоній**.

Тобольскій губернаторъ Леонидъ Михайловичъ **Князевъ**.

Почечитель Западно-Сибирского учеб. окр. Василій Марковичъ
Флоринскій (14 дек. 1890 г. † 3 янв. 1899 г.). Томскъ.

II. Непремѣнныe члены.

Тобольскій вице-губернаторъ Николай Васильевичъ **Протасьевъ**.

*) § 15 Устава Музея. Въ почетные члены избираются лица, оказавшия
особыя услуги Музею или сдѣлавшія единовременное пожертвованіе въ размѣрѣ
не менѣе 500 руб., деньгами или имуществомъ.

Управляющій Государственными Имуществами Тобольской губ.

Михаилъ Феодоровичъ **Фроловъ-Багровъ**. Тобольскъ.
Директоръ училищъ Тобольской губ. Петръ Ивановичъ **Пановъ**.
Тобольскъ.

Ректоръ Тобольской духовной семинаріи протоіерей Петръ Дмитріевичъ **Головинъ**. Тобольскъ.

Директоръ Тюменского реального училища Иванъ Яковлевичъ **Словцовъ**. Тюмень.

Президентъ Тобольского физико-медицинского общества Николай Александровичъ **Строгановъ**. Тобольскъ.

Членъ-секретарь Тобольского Губернского Статистического Комитета Левъ Евграфовичъ **Луговскій** († 21 іюня 1898 г.).

Тобольский городской голова Владимиръ Васильевичъ **Жарниковъ**.

III. Члены-соревнователи*).

Аплечеевъ, Петръ Шагловичъ, архитекторъ (21 окт. 1890 г.).

Баженовъ, Григорій Григорьевичъ (19 іюня 1896 г.).

Голубевъ, Иванъ Каллиниковичъ, членъ „Общества распространенія книгъ Св. Писанія въ Россії“ (12 янв. 1892 г.).
Москва.

Дунинъ-Горкавичъ, Александръ Александровичъ, лѣсничій Самаровскаго лѣсничества Тобольской губ. (12 окт. 1897 г.).
Сургутъ.

Кузнецовъ, Евгений Васильевичъ, и. д. секретаря Тобольского Губернского Стат. Комитета (12 янв. 1892 г.). Тобольскъ.

Меньшиковъ, Иванъ Ивановичъ, Курганскій купецъ (14 окт. 1890 г.).

Игнатовъ, Иванъ Ивановичъ, коммерці-совѣтникъ (14 окт. 1890 г.). Тюмень.

Луговскій, Левъ Евграфовичъ, дѣлопроизводитель Тобольского Губернского Управлія и секретарь Статистич. Комитета (12 янв. 1892 г. † 21 іюня 1898 г.). Тобольскъ.

*) § 17 Устава Музея. Въ члены-соревнователи избираются лица, оказывающие содѣйствіе задачамъ Музея научными трудами или личной работой, или же сдѣлавшія единовременное пожертвованіе на сумму не менѣе 200 рублей.

Нахтымовъ, Иванъ Титычъ, инородецъ (остякъ) Чагинскихъ юртъ, Самаров. вол., Тоб. уѣзда и губ. (12 янв. 1892 г.).

Палопеженцевъ, Николай Ивановичъ, крестьянскій начальникъ (29 апр. 1896 г.). Село Голышмановское, Ишимского уѣзда, Тоб. губ.

Плотниковъ, Михаилъ Даниловичъ, 1-й гильдіи купецъ (14 окт. 1890 г.). Тобольскъ.

Сыромятниковъ, Александръ Адріановичъ, 2-й гильдіи купецъ (14 окт. 1890 г.). Тобольскъ.

Смолинъ, Дмитрій Ивановичъ, 1-й гильдіи купецъ (14 окт. 1890 г.). † 3 окт. 1898 г.). Курганъ.

Терновскій, Анатолій Александровичъ, преподаватель гимназии (28 февраля 1894 г.). Тобольскъ.

Трусовъ, Степанъ Макаровичъ, 2-й гильдіи купецъ (14 окт. 1890 г.). Тобольскъ.

Усовъ, Самуилъ Степановичъ, крестьянинъ (29 апр. 1896 г.). Д. Серебрянка, Карпалинской вол., Тарского уѣзда, Тобольской губерніи.

IV. Дѣйствительные члены*).

1) Съ единовременными взносами:

Андреевъ, Прохоръ Алексѣевичъ, 1-й гильдіи купецъ (14 окт. 1890 г.). Тюмень.

Бронниковъ, Семенъ Ивановичъ, 2-й гильдіи купецъ (14 окт. 1890 г.). Тобольскъ.

Вардропперъ, Эдуардъ Робертовичъ, купецъ (1892 г.). Тюмень.

Волчихинъ, Василій Алексѣевичъ, 2-й гильдіи купецъ (9 мая 1892 г.). Шадринскъ.

Гадаловъ, А. И., Красноярскій купецъ (1891 г.).

Земцовъ, Василій Трофимовичъ, торгующій крестьянинъ (5 янв. 1891 г.). С. Самаровское, Тобольского уѣзда и губ.

*) § 18 Устава Музея. Въ дѣйствительные члены принимаются лица, внесшія единовременно не менѣе пятидесяти рублей, или уплачивающія ежегодно не менѣе трехъ рублей.

- Иваницкій, Христофоръ, свящ.-благочинный единовѣрч. церквей**
(8 янв. 1891 г.). Тюмень.
- Корниловъ, Иванъ Ивановичъ, почетный гражданинъ** (16 апр.
1891 г.). Тобольскъ.
- Никифоровъ, Тимоѳеи Степановичъ, отст. колл. секр.** (14 окт.
1890 г.). Тобольскъ.
- Поклевскій-Козелль, Викентій Альфонсовичъ, дворянинъ** Витеб-
ской губ. (1891 г.). Тюмень.
- Смолинъ, А. Д., потом.** почетный гражд. (1891 г.). Курганъ.
- Смолинъ, Петръ Дмитріевичъ, губ. секр., членъ Тоб. попечит.**
дѣтскихъ пріютовъ (30 янв. 1891 г.). Курганъ.
- Смородиниковъ, Василій Яковлевичъ, 2-й гильдіи купецъ** (1892 г.)
Тобольскъ.
- Таубе, Максимъ Антоновичъ, баронъ, Степной генералъ-губерна-**
торъ (31 іюля 1892 г.). Омскъ.
- Текутьевъ, Андрей Ивановичъ, 2-й гильдіи купецъ** (13 янв.
1891 г.). Тюмень.
- Тройницкій, Григорій Александровичъ, членъ Совѣта Министер-**
ства Земледѣлія и Госуд. Имущ. (8 авг. 1891 г.). Спб.
- Эрберъ, Ольга Карловна, вдова бывшаго Тобольского инженера**
(17 янв. 1891 г.). С.-Петербургъ.

2) Съ ежегодными взносами:

а) въ Тобольскѣ.

- Арефьевъ, Александръ Васильевичъ, лѣсничій** (1895 г.).
- Аенскій, Николай Васильевичъ, врачъ** (14 окт. 1890 г.).
- Беренсъ, Леопольдъ Густавовичъ, штабсъ-капитанъ** (11 мая 1891 г.).
- Богдановскій, Александръ Евстаѳевичъ, производитель работъ**
партии по заготовл. пересел. и запас. участковъ
(9 ноября 1896 г.).
- Бреховъ, Александръ Ивановичъ, директоръ ветеринарно-фельд-**
шерской школы (5 дек. 1890 г.).
- Бутенко, Николай Петровичъ, топографъ** (1896 г.).
- Васильевскій, Владимиръ Петровичъ, преподаватель мужскаго ду-**
ховнаго училища (1 янв. 1892 г.).

- Вѣрниковскій, Антонъ Константиновичъ, топографъ (1898 г.).
Городковъ, Алексѣй Александровичъ, смотритель мужского духовнаго училища (22 мая 1891 г.).
Городковъ, Николай Александровичъ, преподаватель духовной семинарии, редакторъ „Тоб. Епарх. Вѣд.“ (1 янв. 1892 г.).
Дѣ-Карлино, Николай Николаевичъ, помощникъ врачебнаго инспектора (14 окт. 1890 г.).
Жарниковъ, Владимиръ Васильевичъ, городской голова (14 окт. 1890 г.).
Жарниковъ, Василій Дмитріевичъ, потомственный почетный гражданинъ (14 окт. 1890 г.).
Золотаревъ, Александръ Васильевичъ, старшій производ. работъ въ позем.-устроит. отрядѣ въ Тоб. губ. (25 мая 1898 г.).
Иваницкій, Иванъ Яковлевичъ, помощникъ дѣлопроизводителя Тоб. Губ. Управл. и завѣд. казеннымъ аптекарскимъ складомъ (22 іюля 1891 г.).
Камышанскій, Николай Николаевичъ, бывшій прокуроръ Тобольскаго окружнаго суда (17 февр. 1898 г.).
Каффка, Сергѣй Петровичъ, завѣдывающій партіею по заготовл. пересел. и запас. участковъ (1898 г.).
Климашевскій, Игнатій Флоріановичъ, военный слѣдователь по 2-му уч. Омскаго воен. окр. (22 іюня 1896 г.).
Козловъ, Ниль Георгіевичъ, управляющій конторою торговаго дома Плотниковыхъ.
Кондратьевъ Петръ Георгіевичъ, топографъ (15 нояб. 1898 г.).
Костюрина, Марія Николаевна (28 февр. 1893 г.).
Кожлевскій, Станиславъ Владиславовичъ (5 мая 1898 г.).
Кучинскій, Іосифъ Августовичъ, чиновникъ особыхъ порученій по суд. дѣламъ въ Упр. Госуд. Имущ. Тоб. губ. (1897 г.).
Львовъ, Иванъ Павловичъ, преподаватель гимназіи (6 ноября 1890 г.).
Маляревскій, Григорій Яковлевичъ, епарх. наблюдатель церков.-приход. школъ (4 іюня 1893 г.).
Масловскій, Владимиръ Степановичъ, мировой судья 1-го участка Тоб. уѣзда (1898 г.).

- Матвеевъ**, Дмитрій Антоновичъ, священикъ, преподаватель духовной семинаріи (9 мая 1898 г.).
- Москалевичъ**, Сергѣй Ивановичъ, секретарь духовной консисторіи (17 мая 1898 г.).
- Новомбергскій**, Николай Яковлевичъ, крестьянскій начальникъ (1897 г.).
- Павлиновъ**, Александръ Алексѣевичъ, исправникъ (14 октября 1890 г.).
- Пальмова**, Ольга Михайловна, учительница (27 июня 1894 г.).
- Пашковъ**, Александръ Ильичъ, губернскій землемѣръ (21 января 1895 г.).
- Преображенскій**, Феодоръ Александровичъ, преподаватель мужского духовного училища (20 апреля 1896 г.).
- Рождественскій**, Иванъ Васильевичъ, непремѣнныи членъ губерн. управл. по крестьян. дѣламъ (29 апр. 1896 г.).
- Рошковскій**, Фаддей Николаевичъ, старшій таксаторъ партіи по заготовленію переселенч. и запас. участковъ (1897 г.).
- Русановъ**, Николай Александровичъ, членъ окружн. суда (1898 г.).
- Скворцовъ**, Николай Ивановичъ, топографъ (20 июня 1898 г.).
- Скосыревъ**, Николай Дмитріевичъ, протоіерей, ключарь каѳедральнаго собора (14 окт. 1890 г.).
- Смолевъ**, Александръ Александровичъ, инспекторъ гимназіи (11 марта 1891 г.).
- Соколовъ**, Елпидифоръ Феодоровичъ, помощникъ дѣлопроизводителя Губерн. Управленія (20 июня 1896 г.).
- Судницынъ**, Александръ Никаноровичъ, преподаватель духовной семинаріи (1 янв. 1893 г.).
- Сухановъ**, Алексѣй Степановичъ, редакторъ газ. „Сиб. Листокъ“ (17 марта 1891 г.).
- Сухановъ**, Иванъ Ивановичъ (1896 г.).
- Ушаровъ**, Александръ Феодоровичъ (1 сент. 1898 г.).
- Энгельфельдъ**, Викторъ Александровичъ, помощникъ управляющаго Государ. Имущ. Тоб. губ. (1897 г.).
- Юденичъ**, Аѳанасій Евстихьевичъ, нотаріусъ (20 мая 1898 г.).
- Фоминъ**, Петръ Аѳиногеновичъ, топографъ (22 февр. 1898 г.).

б) иногородные.

Вѣла-де-Пошта, проф. археологіи (23 іюня 1898 г.). Будапештъ.

Звѣревъ, Павелъ Николаевичъ, податной инспекторъ (1 января 1898 г.). Тюмень.

Иринархъ, іеромонахъ, настоятель Обдорской миссіи (3 марта 1898 г.).

Карьялайненъ, Густавъ Адольфовичъ, магистръ философіи (26 мая 1898 г.). Гельсингфорсъ.

Колокольниковъ, Владимиръ Васильевичъ, лѣсничій (1897 г.).
Д. Іевлева, Тюменского уѣзда.

Матіясевичъ, Николай Степановичъ, становой приставъ (7 апр.
1898 г.). С. Обдорскъ, Березовского уѣзда.

Папай, Іосифъ Іосифовичъ, проф.-лингвистъ (5 іюня 1898 г.).
Будапештъ.


Пудовиковъ, Петръ, свящ. (1897 г.). Тюкалинскъ.

Филипповъ, Михаилъ Васильевичъ, дѣйств. студ. духовной академіи (30 іюня 1898 г.). Казань.

Чекушинъ, Михаилъ Алексѣевичъ.

Штернбергъ, Ааронъ Яковлевичъ, городовой врачъ (12 марта 1898 г.). Березовъ.

Янко, Иванъ, хранитель этнogr. отд. венгерского націон. музея и секретарь Географич. Общества (19 іюня 1898 г.).
Будапештъ.



ХРОНИКА МУЗЕЯ.

Одну изъ интересныхъ сторонъ дѣятельности Музея представляеть постоянное сношеніе его съ разными лицами и учрежденіями внутри губерніи и виѣ ея. Одни доставляютъ въ Музей коллекціи и сообщаютъ интересныя о нихъ подробности, другія считаютъ долгомъ довести до свѣдѣнія Музея о чёмъ либо съ ихъ точки зреінія интересномъ, выдающемся, третыи даютъ Музею разъясненія и указанія на разные вопросы. Бѣ этой перепискѣ отражается внутренняя жизнь Музея, а въ отрывочныхъ фактахъ, сообщеніяхъ, свѣдѣніяхъ заключается много интереснаго материала. Периодическое опубликованіе выдержекъ изъ этихъ писемъ должно представить не мало интереса для всѣхъ тѣхъ, кто интересуется изученіемъ губерніи. Знакомясь съ этой перепиской, лица, начинаящія работы, увидятъ, на что важно обратить вниманіе, другія же найдутъ здѣсь и пѣкоторый материалъ по тѣмъ или инымъ вопросамъ.

Въ этихъ видахъ Распорядительный Комитетъ Музея и рѣшаестя возобновить тдѣлъ хроники Музея, начало которому было положено публикаціями бывшаго, нынѣ покойнаго, секретаря Комитета Л. Е. Луговскаго въ 1893 году.

Ниже помѣщаются важнѣйшія выдержки изъ писемъ и сообщеній, извлеченныхъ изъ дѣлъ консерватора Музея за 1894—1897 годы. Разнообразіе затрагиваемыхъ этими письмами вопросовъ, нестрота этихъ замѣтокъ дѣлаетъ труднымъ изложеніе ихъ въ систематическомъ порядкѣ: поэтому для опубликованія ихъ припять хронологическій порядокъ, въ какомъ письма или сообщенія поступали въ Музей.

Консерваторъ Музея Н. Скалозубовъ.

1894 г.

1.—Въ инвентарномъ каталогѣ Тобольского Губернского Музея подъ № 268 записаны два отрубка изъ вяза (*Ulmus effusa Willd*), произрастающаго по берегу озера Санкинскаго въ крестьянской дачѣ Жуковской волости, Туринскаго уѣзда, въ районѣ Туринскаго лѣсничества. Образцы доставлены въ 1891 году бывшимъ туринскимъ лѣсничимъ В. В. Барышевцевымъ, нашедшимъ вязъ въ Туринскомъ уѣздѣ въ 1888 г. и сообщившимъ о немъ слѣдующее.

«Вязъ по озеру Санкинскому встрѣчается единично въ смѣшениіи съ тополемъ (*Populus nigra L.*) и ветлой (*Salix alba L.*), произрастая по песчанистымъ заливнымъ мѣстамъ; здѣсь онъ достигаетъ размѣровъ деревъ первой величины. Кромѣ береговъ озера Санкинскаго, составлявшаго нѣкогда русло р. Туры и расположеннаго въ 6-ти приблизительно верстахъ отъ границы Верхотурскаго уѣзда, вязъ въ Туринскомъ уѣздѣ единично встрѣчается по нижнему течению сплавныхъ притоковъ Туры—рѣчекъ Санкинной, Енсаевки и очень рѣдко по среднему течению рѣки Багышевки въ границахъ казенныхъ лѣсныхъ дачъ Санкинской, Енсаевской и Верхне-Багышевской и смежныхъ съ ними крестьянскихъ дачъ Жуковской и Усенновской волостей (въ послѣдней было найдено не болѣе 2—3 экземпляровъ). Несомнѣнно, что въ прежніе годы лѣсонасажденія съ примѣсью вяза въ Туринскомъ уѣздѣ, если не всегда, то и не рѣдко, являлись продолженіями таковыхъ же по уѣздамъ Верхотурскому и Ирбитскому (Пермской губерніи), гдѣ вязъ встрѣчается гораздо чаще, и если теперь многія насажденія съ примѣсью вяза получили по Туринскому уѣзду островной характеръ, то произошло это отъ хищническаго отношенія населенія къ этой породѣ; что вязъ занималъ большую, чѣмъ теперь, площадь, подтверждается названіями нѣкоторыхъ рѣчекъ Вязовками, по течению которыхъ вязъ въ настоящее время уже не находятъ; одна изъ рѣчекъ съ такимъ названіемъ протекаетъ по Дымковской, другая по Туринской волостямъ, соединимъ съ Пермскою губерніею.

Исчезновеніе по многимъ мѣстамъ вяза слѣдуетъ объяснить нерациональной вырубкой его крестьянами на упряженныя дуги, такъ какъ вязовые дуги за ихъ хорошія качества очень цѣняются населеніемъ.

Если вязъ по уѣзду не успѣлъ быть истребленнымъ совсѣмъ, то произошло это какъ отъ значительной побѣго-производительной способности вязовыхъ пней, такъ, за послѣдніе годы, отчасти отъ запрещенія мѣстной лѣсной администраціи, со времени открытия вяза въ лѣсничествѣ (въ 1888 г.), вырубать его и вообще отъ принятія строгихъ мѣръ къ сохраненію въ уѣздѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и во всей Западной Сибири (кромѣ Туринскаго уѣзда, вяза нигдѣ въ Западной Сибири нѣтъ),—этой рѣдкой и въ силу многихъ цѣнныхъ ея достоинствъ очень важной

для Сибири въ будущемъ древесной породы.

Вслѣдствіе склонности населенія Туинскаго уѣзда къ занятіямъ кустарными промыслами вязъ можетъ впослѣдствіи играть очень солидную роль въ мѣстномъ мебельномъ производствѣ. Такого рода соображенія и побудили мѣстную администрацію, пока не имѣющую возможности заняться искусственнымъ разведеніемъ вяза, обратить вниманіе на повсемѣстное охраненіе по уѣзду этой породы».

Къ сказанному добавимъ, что въ Тюменскомъ уѣздѣ вязомъ иногда называютъ нѣкоторыя ивы, идущія для плетенія коробовъ.

2.—Въ томъ же инвентарномъ каталогѣ подъ №№ 910 и 911 записаны образцы киргизского мыла «сабунъ» и золы лебеды, служащей для его приготовленія, добытые консерваторомъ Музея у киргизъ въ Ильинской в., Ишимскаго уѣзда. О приготовленіи мыла со словъ киргизъ записано слѣдующее.

Изъ обыкновенной лебеды (*Chenopodium album L.*—алá-ботá) приготавливаютъ обжиганіемъ золу (куллъ). Надъ какимънибудь большимъ сосудомъ настилается рѣшетка, на нее—солома, сверху насыпается зола и промывается кипящею водою,—внизу собирается щелокъ. Затѣмъ щелокъ досуха выпаривается на огнѣ (чтобы выпарить 40 ведеръ щелоку, нужно 4 дня); со щелочью мѣшаютъ сало и получается мыло—сабунъ. Операциія смѣшиванія производится тщательно и очень продолжительное время. Почему-то иногда не удается приготовить мыло, и приходится все бросать. занимаются приготовленіемъ мыла старухи. Гребутъ, чтобы не подходила близко къ кибиткѣ потная лошадь и не входила беременная женщина или дурной человѣкъ: мыло не дѣлается, и материалъ приходится бросать.

3.—Рихтеръ Лайосъ въ Будапештѣ (Richter Lajos, Budapest, Andrassy Strasse, 3) письмомъ отъ 18 мая 1894 г. обратился къ консерватору Музея съ просьбою объ обмѣнѣ растеніями. Если растенія не опредѣлены или опредѣлены неточно, то г. Лайосъ обѣщалъ сдѣлать опредѣленія или провѣрить ихъ, при чёмъ просилъ, чтобы нуждающіяся въ опредѣлевшемъ растенія были высланы, по возможности, въ нѣсколькихъ экземплярахъ. Ему былъ высланъ гербарій Уральской флоры, привезенный консерваторомъ Музея изъ Красноуфимскаго уѣзда (Перм. г.); въ обмѣнъ на него г. Лайосъ прислалъ гербарій Венгерской флоры, сохраняющейся въ Музѣѣ.

4.—П. Н. Крыловъ въ Томскѣ (завѣдывающій Ботаническимъ садомъ при Томскомъ университѣтѣ) сообщилъ списокъ инструментовъ, необходимыхъ путешественнику для барометрической нивелировки и употребляемыхъ имъ въ его путешествіяхъ.

1. Два пружинныхъ барометра (анероида) работы Герляха въ Варшавѣ (Варшава, Чистая ул., д. № 40). Анероиды должны быть компен-

сированные, обязательно съ выставленной на нихъ фирмой «Герляха» и вывѣренные Главной Физической Обсерваторіей: одинъ—карманный, другой —немного побольше (послѣдній около 7 ст. въ диаметрѣ). Цѣна обоимъ около 100 р.

2. Гипсотермометръ работы Füss'a въ Берлинѣ (№ 57 каталога Фюсса 1891 г.), со всѣми принадлежностями и 1 запаснымъ термометромъ. Цѣна около 60 р. Выписать его лучше отъ Франца Мюллера (Спб. Столярный пер., д. № 18—69, кв. 31—32).

3. Два термометра-праща—отъ Фр. Мюллера, по 7 р. за штуку. (Письмо отъ 27 мая 1894 г.).

5.—Любитель-собиратель животныхъ Эдуардъ Касперовичъ Бузевичъ (Тюкалин. уѣзда, Саргат. в., хуторъ Марфушинъ) изъявилъ согласіе путемъ сбиранія коллекцій содѣйствовать цѣлямъ Музея (письмо отъ 2 окт. 1894 г.). Умеръ, кажется, въ 1899 году. Изъ ссыльныхъ поляковъ повстанцевъ, бывшій слушатель Варшавскаго университета; служилъ въ Дмитревской конторѣ виннаго завода Хаймовича (на р. Иртышѣ, близъ Омска), усердно занимался сбираніемъ коллекцій растеній и животныхъ. Награжденъ за эти коллекціи комитетомъ Курганской выставки 1895 г. Въ Музей имъ переданы гербаріи и вѣсколько чучелъ животныхъ.

6.—П. Н. Соковнинъ (нынѣ, 1901 г., уполномоч. минист. земл. въ Курской губ.) сообщилъ литературу по классификаціи русскихъ хлѣбовъ (письмо отъ 1 окт. 1894 г.):

1. Сортировка образцовъ русскихъ пшеницъ, доставленныхъ д—ту окладныхъ сборовъ м—ва финансовъ изъ разныхъ мѣстностей Европ. Россіи (произведена ассист. Козловскимъ).

2. Протоколъ совѣщанія членовъ комитета по надзору за сортированіемъ хлѣба 6 июля 1890 г.

3. Проектъ торговой классификаціи русскихъ хлѣбовъ.

4. Донесеніе чиновника особыхъ порученій м—ва фин. Козловскаго по вопросу о классификаціи хлѣбовъ, а также о мѣрахъ для упорядоченія вашей внутренней торговли.

5. Таблицы классификаціи оз. пшеницъ, яровыхъ, кормового ячменя, сущеной и несущеной ржи, овсовъ.

7.—Ключъ для опредѣленія семействъ мховъ, составленный проф. Горожанкінымъ и доставленный Музею К. Космовскимъ (городской судья г. Кирсанова). К. Космовскій служилъ въ Тобольской губ. въ г. Ялуторовскѣ и затѣмъ въ Тобольскѣ. Уѣхалъ въ 1894 году. Собиралъ материалы по флорѣ губерніи; по этому вопросу дѣлалъ 17 ноября 1894 г. докладъ въ Московскомъ общ. любит. естеств., антропол. и этнографіи. Въ даръ Музею оставилъ коллекцію мховъ, собранную Цингеромъ и др. въ разныхъ мѣстахъ Москов. губ. (въ инвентарѣ—подъ № 803):

Подклассъ Musci propriae (Bryinae).

- 1) Коробочка помѣщается на верхушкѣ стебля—отрядъ Acrocari. 2.
Коробочка въ пазухѣ листьевъ—отрядъ Pleurocarpi . 13.
2) Листья въ два ряда—подотрядъ Distichophylla . 3.
Листья многорядные—подотрядъ Polystichophylla : 5.
3) Листья прикреплены на бесплодныхъ стебляхъ вертикально
— сем. Schistostegaceae.
Листья прикреплены горизонтально 4.
4) Листья при основаніи расширены и обхватываютъ стебель, а
затѣмъ суживаются въ нитевидную пластинку—сем. Distichiaceae.
Листья не обхватываютъ стебля, почти ланцетовидные—сем. Fis-
sidentaceae.
5) Перистомъ тканевой изъ 4 зубцовъ—сем. Tetraphidaceae.
Перистомъ тканевой изъ 16, 32, 64 зубцовъ—сем. Polytrichaceae.
Перистомъ изъ вещества клѣточной оболочки 6.
6) Листья изъ клѣтокъ двоякаго рода, какъ у Sphagnum—сем.
Leucobryaceae.
Листья обыкновенного строенія 7.
7) Внутренній перистомъ представляется кожистымъ съ 16
складками и имѣеть видъ конуса—сем. Buxbaumiacae.
Внутренній перистомъ образованъ волосками, зубцами или его
совсѣмъ нѣтъ. 8.
8) Клѣтки вершины и основанія листа почти одинаковы. 9.
Клѣтки основанія шире и иѣсколько иначе организованы, чѣмъ
клѣтки вершины листа. 10.
9) Апофизы нѣтъ, или она едва замѣтна—сем. Funariaceae.
Апофиза сильно развита—сем. Splachnaceae.
10) Перистомъ большою частью двойной; листья широкіе—сем.
Bryaceae (Webera, Bryum, Mnium, Meesea).
Перистомъ большою частью одиночный; листья узкие . 11.
11) Ножка коробочки очень короткая; колпачекъ часто въ видѣ
купола—сем. Grimmiaceae (Grimmia, Orthotrichum).
Ножка большою частью сильно развита; колпачекъ чаще въ про-
рѣзахъ сбоку 12.
12) Перистомъ простой изъ 16 простыхъ зубцовъ—сем. Wei-
siaceae (Weisia, Dicranum).
Перистомъ также простой, но изъ 32 зубцовъ или только изъ
16, по двухраздѣльныхъ (почти до основанія)—сем. Pottiaceae (Pottia,
Barbula).
13) Ключевые мхи—сем. Fontinalaceae.
Паземные (на деревьяхъ, сырой землѣ, на торфяникахъ и т. п.) 14.
14) Листья двурядные—сем. Neckeraceae.

Листья многорядные 15.

15) Листья покрыты папиллами и отростками—сем. Leskeaceae.
Листья голые—сем. Нурасеае.

Подклассъ Musci anomali.

1) Phascaceae отличается отъ Bryinae лишь тѣмъ, что коробочка ихъ не разверзается.

2) *Andreaeaceae* имѣютъ коробочку безъ крышки, и она разверзается 4-мя створками.

3) Sphagnaceae имѣютъ коробочку съ крышкой, но споровой мѣшокъ у нихъ не отдѣленъ полостью отъ стѣнокъ коробки.

(Изъ письма 31 окт. 1894 г.).

8.—Станція оцѣнки съмянъ при Варшавскомъ музѣ промышленности для определенія достоинства съмянъ хлѣбныхъ растеній употребляетъ слѣдующіе аппараты:

1) Для определения всхожести—колокольные глиняные аппараты системы Steiner'a (оть фирмы Lenoir et Fosster. Wien IV Waaggasse №5).

2) Жестяная решета съ отверстіями 0,5, 1, 1.25, 1,50 и 2 мм. при діаметрѣ решетъ 20 ст. по Nobbe для опредѣленія количества и качества засоренія.

3) Пурка для определения объемного въса по Haberlandt'у.

4. Farinatom по Printz'у для определения мукиности зеренъ.
(Письмо ассистента станції агронома З. Зелинского 29 ноября 1894 г.).

1895 г.

1.—А. С. Уваровъ (инспекторъ Горнаго училища въ Екатеринбургѣ) сообщаетъ приблизительный составъ синей земли, присланной ему изъ Музея для опредѣленія. Образцы эти присланы въ Музей съ устьевъ Оби. По мнѣнію г. Уварова, это есть видоизмѣненіе вивіанита (синяя желѣзная руда), называющееся синей желѣзной землей, составъ коей по Раммельсбергу: воды 25,7%, закиси желѣза 33, окиси желѣза 12,2, фосфорной кислоты 29,1%. (Изъ письма 18 марта 1895 г.).

2.—Списокъ изъ Тобольской губ., собранныхъ Н. Л. Скалов-зубовымъ въ 1894 г. и опредѣленныхъ Ѹ. А. Теплоуховымъ (с. Ильин-ское, Пермскаго уѣзда).

1. *Salix pentandra* L. Тобол. у. Бакшеева—Куларова, 17/vi ♂.
 2. *Salix alba* L. ♂.
 3. *S. triandra* L. Тобол. у. Филатова на Иртышъ, 1/vi ♀ и ♂.
 4. *S. Gmelini* Ledeb. (подвидъ *S. Viminalis*). Тобол. у. Филатова на Иртышъ, 1/vi ♂. Тобольскъ, Ремесл. школа, ♀.
 5. *S. rosmarinifolia* L. (подвидъ *S. repens* L.) Тобол. уѣзда д. Копотилова, 19/vi.

6. Помъсь S. Gmelini съ S. rosmarinifolia (?) Тюкалин. уѣзда, Сыропятское, 22/ vii. Весьма интересная ива попадалась мнѣ въ Сибири. Было бы весьма интересно познакомиться съ ея сережками, въ особенности ♀, безъ чего опредѣлить ее едва ли возможно.

7. Помъсь S. rosmarinifolia съ X (?) Тобол. уѣзда. Филатова, 1/vi; Ишимск. у. Кусерякъ—Чистяки, 21/vi; Тюкалинск. у. с. Серебрянское 2/vii (Замѣчаніе то же, что при № 6).

8. S. Lapponum L. Тобол. у. Куларова, 17/vi; Копотилова 19/vi; Ишимск. у. Локтинское, 3/viii.

9. S. vogans Anderson. Тобольскъ, 12/ix ♂ и ♀, Курганск. у. Сычевское, 5/ix; Тюкалин. у. Серебрянское, 2/vii; Тарского у. Форпостъ, 23/vi. Подъ этимъ названіемъ Андерсонъ соединилъ вѣсколько видовъ или подвидовъ, встрѣчающихся въ сѣверной Европѣ, Азіи и Америкѣ. Наша европейская представительница S. depressa встрѣчается очень часто въ центральныхъ губерніяхъ, но до Камы не доходитъ. Зато въ Ирбитскомъ уѣздѣ начинается опять распространеніе сибирскихъ формъ S. vogans. Судя по присланнымъ экземплярамъ, она встрѣчается въ губерніи въ видѣ мелкаго кустарника и въ видѣ маленькаго деревца. Послѣдняя форма особенно интересна, т. к. она—чисто сибирская: я наблюдалъ ее при моемъ проѣздѣ черезъ Барабинскую степь въ 1868 году.

10. S. nigricans S. Тобольскъ, Ремесл. школа, 15/v ♂ и ♀.

11. S. myrtilloides L. Тобольскъ, болото Ивановскаго монастыря 12/v ♂.

12. Populus nigra L. Тюкалин. у. Любинское, 8/vii.

Въ письмѣ, сопровождающемъ гербарій опредѣленныхъ ивъ, Ѳ. А. Теплоуховъ отмѣчаетъ, что очень интересны серебристыя ивы, родственныя S. rosmarinifolia (№ 5 и 7), которые отличаются въ Сибири крупными серебристыми листьями; проситъ обратить вниманіе на S. vogans (№ 9-й) и отмѣтить при собираніи, растетъ ли дикая ива деревцемъ, большимъ или малымъ кустомъ, и выражаетъ особое желаніе имѣть образцы Тобольскихъ acuminatae, т.-е. помѣси S. viminalis и ся формъ (S. Gmelini) съ S. caprea и пр., которые встречаются до Алтая и вѣроятно не рѣдки около текучей воды и у Тобольска. Интересны также и разные формы S. viminalis. (Изъ письма отъ 1 апрѣля 1895 г.).

3.—Полученъ слѣдующій списокъ образцовъ спъмъ хлѣбныхъ, стручковыхъ, масличныхъ, прядильныхъ и кормовыхъ растеній полевой культуры Самаркандской области отъ Самарканда. Областн. Стат. Комит. (№№ 861—885 инвентарного каталога).

1. Зерновые: пшеница озимая. Почвы ирригационныя: лессъ, суглиники, перегнойная, хрящевая и солонцеватая. Обработка одинакова съ существующей въ Европ. Россіи, съ прибавленіемъ планировки пашни для равномѣрнаго напуска воды. Высѣвается зерна 8 пуд. на деся-

твну, съ половины августа до конца сентября. Попиваеться 2—3 раза въ лѣто, смотря по влажности почвы. Созрѣваетъ въ половинѣ июня. Урожай до 150 п.—Въ четверти (по пуркѣ) отъ 9 п. до 10 п. 26 ф.

2. *Пшеница* озимая «Тюя-тышъ» (Верблюжій зубъ). Почвы не-ирригационныя. Обработка: двухкратная вспашка, безъ бороньбы. Высѣвается зерна 8 п., въ октябрѣ—ноябрѣ. Орошаются исключительно атмосферною влагою. Созрѣваетъ въ половинѣ июня. Урожай до 160 п. Въ четверти 9 п. 13 ф.

3. *Пшеница* яровая (богары). Почвы неирригационныя. Обработка: двухкратная вспашка на глубину до 4 вершк., безъ бороньбы. Высѣвается 2—4 п., смотря по силѣ почвы и высотѣ мѣстоположенія (урожай-нѣе на высотѣ отъ 2500 до 4000 фут. на ур. м.), съ февраля по апрѣль. Орошаются исключит. атмосферною влагою. Созрѣваетъ въ теченіе июня. Урожай отъ 16 до 40 п. Въ четверти отъ 9 п. 6 ф. до 10 п. 23 ф.

4. *Ячмень* озимый. Почва, обработка, посѣвъ и орошеніе одинаковы съ № 1-мъ. Созрѣваетъ къ 10 мая. Урожай до 165 п. Въ четверти отъ 6 п. 30 ф. до 8 п. 28 ф.

5. *Ячмень* яровой. Условія одинаковы съ № 3-мъ. Созрѣваетъ въ концѣ мая. Урожай отъ 16 до 40 п. Въ четверти отъ 7 п. 8 ф. до 8 п. 20 ф.

6 и 7. *Рисъ* яровой, бѣлый и *Рисъ* яровой, красный. Почвы болотныя, сырья, ирригационныя. Обработка пашни: при сильно увлажненной почвѣ, 4—8 кратная вспашка съ планировкой. Зерно въ количествѣ 8 п. высѣвается на залитое водою поле въ теченіе мая. Посѣвъ находится подъ медленно-проточной водою до 90 дней, съ нѣсколькими интервалами, по 4 дня, въ теченіе растительнаго периода. Полотьба производится 1—2 раза. Созрѣваетъ въ концѣ сентября и началѣ октября (въ послѣднемъ случаѣ не рѣдко подвергается заморозкамъ и невызрѣваетъ). Урожай до 240 пуд. Въ четверти отъ 4 п. 39 ф. до 6 п. 21 ф.

8. *Джугара* яровая (*Sorghum cernuum*). Почвы ирригационныя, одинаковыя съ № 1-мъ; требуютъ хорошаго удобренія. Обработка: вспашка до 6 разъ, бороньба и планировка до полнаго разрыхленія комьевъ на пашнѣ. Высѣвается зерна 2 пуда, въ маѣ. Всходы разрѣживаются на разстояніи 8 вершк.; когда они достаточно окрѣпнутъ и поднимутся, производится два раза окучивание и мотыженіе съ промежуткомъ 1— $1\frac{1}{2}$ мѣсяца. Попиваеться 3—4 раза въ лѣто. Созрѣваетъ въ первыхъ числахъ октября (случается, что отъ заморозковъ редозрѣваетъ). Ростъ стеблей до $3\frac{1}{2}$ арш.; на каждомъ стеблѣ по одному початку вѣсомъ до $1\frac{1}{4}$ ф. Зерно идетъ отчасти въ пищу людямъ, преимущественно же въ кормъ домашнимъ животнымъ, равно и сочные, сладкіе стебли, на которыхъ въ 2—3 зимнихъ мѣсяца хорошо откармливается рабочій скотъ. Корни идутъ на топливо. Урожай зерна до 360 п., стеблей до 1600 п. Въ четверти отъ 8 п. 25 ф. до 9 п. 34 ф.

9. *Кукуруза яровая*. Почва, условия обработки и ухода, время посева и количество сеяний одинаковы с № 8-мъ. Созревает въ началѣ сентября.

10, 11 и 12. *Чечевица яровая* (адасъ). *Прoso яровое* (тарыкъ). *Прoso яровое* (кунакъ). Почвы тощія; посѣвъ дѣлается взамѣнъ пара, чаще повторнымъ по ячменю или пшеницѣ. Обработка пашни одинакова съ № 1-мъ. Высѣвается зерна 1 п. 20 ф., въ половинѣ іюня. Полявается 3—5 разъ въ лѣто. Созреваетъ въ половинѣ сентября. Урожай до 80 п.

Стручковые: 13, 14 и 15. *Машъ*, горошекъ яровой (*Soja hispida* Moench). *Нагутъ*, овечій горохъ яровой (*Cicer arietinum*). *Фасоль яровая* (Турецкіе бобы, любія). Почвы обыкновенныя; посѣвы производятся послѣ зерновыхъ хлѣбовъ. Обработка пашни одинакова съ № 1 мъ. Высѣвается гороха и фасоли до 2 п., съ половины мая до половины іюня. Полявается до 3 разъ въ лѣто. Начинаютъ созревать съ половины сентября. Урожай до 85 п.

Масличные: 16, 17, 18, 19 и 20. *Кунджутъ яровой*. (*Sesamum indicum*) *Ленъ яровой*. *Сурепица, индау*. (*Eruca*). *Махсоръ яровой* (сафаоръ) (*Carthamus tinctorius*). *Макъ* озимый. Воздѣлываются на различныхъ ирригационныхъ почвахъ. Входить въ мѣстный сѣвооборотъ; высѣваются послѣ зерновыхъ хлѣбовъ. Обработка пашни одинакова съ № 1-мъ. Посѣвъ производится—льна до 2 п., махсора до 2 хъ п. и сурепицы до 2 п., въ теченіе апрѣля, кунджута 1 п. въ первой половинѣ іюня, мака 20 ф.—въ августѣ—сентябрѣ. Поляваются 3—4 раза въ лѣто. Созреваютъ первые пять продуктовъ въ сентябрѣ, а шестой—въ іюнѣ. Урожай льна и сурепицы до 40 п., кунджута до 35 п., мака до 60 п. и махсора до 50 п.

Прядильные: 21 и 22. *Хлопчатникъ* туземный, яровой. *Хлопчатникъ* американскій, яровой (*Upland*). Воздѣлываются на различныхъ ирригационныхъ почвахъ, преимущественно на лессѣ и суглинкахъ, достаточно удобренныхъ. Обработка почвы такая же тщательная, какъ и подъ джугару (№ 8). Высѣвается сѣмени того и другаго вида до 2 п., начиная съ половины апрѣля до половины мая. Уходъ за растеніями тотъ же, что и по культурѣ джугары. Созреваніе начинается съ сентября и оканчивается въ концѣ октября. Урожай средній до 60 п. сырца.

23. *Конопля яровая*. Воздѣлывается въ весьма ограниченномъ количествѣ на усадебныхъ участкахъ, хорошо удобренныхъ. Обработка почвы одинакова съ № 1-мъ. Высѣвается до 2-хъ п., въ апрѣль. Уходъ общеизвѣстный. Полявается 3—4 раза въ лѣто. Созреваетъ въ концѣ августа. Урожай до 60 п.

Кормовые: 24. *Люцерна* (*Medicago sativa*). Воздѣлывается на всякихъ ирригационныхъ почвахъ, хорошо удобренныхъ. Обработка почвы

одинакова съ № 1 мѣ. Высѣвается сѣмени до 2 п., въ два срока: или въ теченіе февраля — на обыкновенную влажную почву, или въ августѣ — на залитое водою поле. Поливается до 6 разъ, послѣ каждого ужина. Урожай сѣна до 600 п., травы до 2000 п. Жатва производится періодически съ апрѣля по октябрь, въ теченіе до 10 лѣтъ, при ежегодной поддержкѣ поля поверхностнымъ удобреніемъ. (Сообщено предѣд. Самарканского областного стат. комит. отъ 14 мая 1895 г.).

4.—Проф. Д. Н. Анучинъ въ Москвѣ обратился въ Музей съ просьбою (письмо отъ 3 ноября 1895 г.) обѣ оказаніи содѣйствія въ разрѣшеніи нѣкоторыхъ вопросовъ, касающихся археологіи Тобольской губерніи. Вопросы эти изложены въ такомъ видѣ:

1) Имѣются ли въ Музѣѣ мѣдныя (и бронзовыя) орудія, какъ-то: цельты (т.-е. топоры или клинья съ втулкой), топоры, кирки, долота, ножи, серпы, наконечники копій, наконечники стрѣлъ, кинжалы? Если имѣются, то по сколько каждого вида, т.-е. сколько цельтовъ, сколько топоровъ, сколько серповъ и т. д. При этомъ желательно указать весь мѣста, въ которыхъ было найдено по нѣсколько мѣдныхъ орудій вмѣстѣ, напр.: 3 цельта, 2 цельта и 5 топоровъ и т. д. Относительно мѣдныхъ серповъ (которыхъ, вѣроятно, немногого) желательно было бы знать въ точности, откуда они. Серпы иногда смишиваются съ кривыми ножами, но они большей частью отличаются отъ ножей, хотя и выказываютъ иногда переходы къ нимъ. Въ атласѣ Клеменца*) къ Минусинскимъ древностямъ о серпахъ не упоминается, но они изображены на таблицѣ Ш, рис. 1 и 2, а въ атласѣ тѣхъ же древностей Martin'a**) имѣется уже цѣлая таблица мѣдныхъ серповъ. О цельтахъ желательно бы знать, есть ли съ ушкомъ или съ 2 ушками или безъ ушковъ, относительно серповъ — какой они формы, относительно копій — съ прорѣзами или безъ нихъ.

2) Имѣются ли чудскія изображенія парящихъ птицъ: какія именно, сколько, откуда? Такія мѣдныя птицы съ распущенными крыльями имѣютъ иногда сходство съ ястребомъ, иногда съ совой или съ неопределеннымъ видомъ птицъ; у иныхъ есть на груди человѣческое лицо; у другихъ — двѣ или даже три головы. Указаніе этихъ формъ было бы очень желательно, а если можно достать рисунки или фотографіи ихъ, то было бы еще лучше.—Также, имѣются ли изображенія другихъ животныхъ и какихъ именно: медвѣдя, оленя, лошади, или всадника на лошади, или человѣка (чудскіе образки?)

3) Если Музеемъ былъ составленъ каталогъ и издавались отчеты, то очень желательно было бы ихъ получить. А равно, нельзя ли получить также другія изданія, вышедшия за послѣдніе годы въ Тобольскѣ,

*) По каталогу Музея № 782.

**) По каталогу Музея № 1398.

въ родѣ Ежегодниковъ, Памятныхъ книжекъ, календарей, брошюре, въ которыхъ есть свѣдѣнія по краю, инородцамъ, древностямъ и т. д. Нельзя ли исходатайствовать присылку таковыхъ изданій отъ кого слѣдуетъ для состоящаго въ моеи вѣдѣніи университетскаго Музея. Здѣсь, въ Москвѣ очень трудно доставать тобольскія изданія, а между тѣмъ желательно ознакомиться съ ними.

Съ своей стороны я уже распорядился посыплю въ Тобольскій Музей изданія «Землевѣдѣніе» и готовъ выслать другія изданія общества люб. ест. Но если Музей съ своей стороны не найдеть возможнымъ выслать мнѣ просимыхъ мною изданій, то я вынужденъ буду прекратить и высылку въ Музей издавшій общества.

Покорѣйше прошу не отказать въ возможномъ содѣйствіи по предмету моей просьбы. Съ своей стороны, я готовъ также, по мѣрѣ возможности, содѣйствовать Музею. Не можетъ ли Тобольскій Музей оказать намъ содѣйствіе и по доставкѣ предметовъ для изученія инородцевъ, напр.: ихъ скелетовъ или череповъ, ихъ портретовъ и пр.

1896 г.

1.— Отъ мѣщанина Петрова изъ Тюмени получены образцы породы, которую онъ считалъ фосфоритомъ. Для анализа она отправлена М. М. Шешукову въ Кострому.

Результаты анализа (17 февраля 1896 г.): изъ 3-хъ образцовъ было взято по 5 гр. и хорошо перемѣшано. Такимъ образомъ полученная средняя проба была обработана крѣпкой азотной кислотой и съ нею выпарена. Въ образцахъ углекислыхъ солей нѣтъ.

Въ 100 вѣсовыхъ частяхъ средней пробы содержится: нерастворимыхъ при выпариваніи въ крѣпкой азотной кислотѣ веществъ (глины и песку) 85,65%, фосфорной кислоты (P_2O_5) 0,291%.

2.— Собиратель монетъ любитель И. А. Сахаровъ (начальникъ ст. Поклевская Уральск. ж. д.) въ письме отъ 15 апреля 1896 г. сообщаетъ, что хорошимъ руководствомъ для собирателей монетъ можетъ служить брошюра Гиля «Таблицы русскихъ монетъ двухъ послѣднихъ столѣтій. Практическое руководство для собирателей. 1883». Въ книжкѣ перечислено все, что чеканено съ Петра 1-го до 1881 г., съ отмѣтками степени рѣдкости монетъ.

3.— Изъ письма Н. М. Сибирцева, (†) проф. Ново-Александровскаго института, 28 июля 1896 г. «Въ Тобольской губерніи отчетливо развиты солонцы, описанные вами (образцы ихъ я видѣлъ на московской и нижегородской выставкахъ) и соляные озера. Помимо всего прочаго, эти образования представляютъ большой интересъ со стороны ихъ химического состава и бактериального населения. Въ нашей лабораторіи (Ново-Ал-

ксандрийского института) возможно было бы подвергнуть ихъ изслѣдованию съ той и другой стороны. Бактериологическое изслѣдование соленыхъ и тухлыхъ грязей охотно возьметъ па себя ассистентъ при каѳедрѣ бактериологии М. А. Егуновъ, письмо котораго при семъ прилагаю.

Не найдете-ли вы возможнымъ посодѣйствовать намъ въ доставкѣ образцовъ а) соленца и б) соленої и тухлой грязи?

4. — Въ Сибири существуютъ соляные озера съ почвой чернаго цвѣта и вонючей (отъ сѣроводорода). Эта почва представляетъ громадный интересъ со стороны бактериального состава. Изслѣдованиемъ бактериального населенія этихъ почвъ занять ассистентъ каѳедры ботаники Ново-Александрийского института сел. хоз. М. Егуновъ, по указанію проф. Сибирцева обратившійся въ Тобольскій Музей съ просьбою собрать ему образцы этихъ почвъ и приславшій инструкцію для ихъ сбиранія.

Организмы, населяющіе эту почву, погибаютъ отъ высыханія, поэтому:

Инструкція для набиранія почвы и соли — а) почва (или грязь) должна быть безъ ракушекъ, черная, влажная и не содержать много водорослей (зеленыхъ); б) брать ее слѣдуетъ у самой воды озера; в) набирать ее надо съ самой поверхности съ верхнимъ спрымъ слоемъ, который ни въ какомъ случаѣ нельзя удалять. Слѣдуетъ сдѣлать такъ: вырѣзать на почвѣ четырехугольникъ и потомъ подрѣзать его снизу, получится пластинка грязи не толще 1 сантиметра (при накладываніи въ сосудъ его слѣдуетъ поломать на части), г) затѣмъ слѣдуетъ набрать самосадочной (не промытой ни разу) соли съ подобнаго же озера или съ этого самого; дать водѣ стечь. Соль должна быть грязная и самосадочная. Рысушивать ни почву ни соль нельзя.

Способъ пересылки: главное условіе — почва и соль должны прибывать на место назначенія во влажномъ состояніи. Слѣдующій способъ обеспечиваетъ это въ теченіе даже несколькиихъ мѣсяцевъ. Въ жестянку около $\frac{1}{4}$ или $\frac{1}{2}$ ф. положите набранную почву, покройте ее или кусочкомъ ваты или листкомъ бумаги (не слѣдуетъ уплотнять кусочки почвы; они должны лежать рыхло) и дополните сверху набранной солью всю жестянку до верху (и почва и соль должны быть влажными). Закройте крышкой, зашейте тряпкой. Слѣдуетъ отмѣтить: мѣсто и время выемки образца. Адресовать посылки: «Новая Александрия, Люблинск. губ., инстит. сел. хоз. и лѣс., ботаническій кабинетъ, ассистенту Михаилу Андрееву. Егунову».

5.— При письмѣ, помѣченномъ апрѣлемъ 1896 г., М. Суворцевъ изъ Семипалатинска выслалъ въ Музей коллекцію, заключающую чешуекрылыхъ Семипалатинской области. Въ посылку вошли почти всѣ дневныя области со входящимъ въ нее Алтаемъ и часть сумерочныхъ. Для храненія насѣкомыхъ въ Музѣй г. Суворцевъ совѣтуется ящики, дно ко-

торыхъ оклеено не пробковыми, а торфяными пластинками; пробка отъ времени, такъ сказать, выпираетъ булавку, и та отваливается вмѣстѣ съ насѣкомымъ. Съ торфомъ же этого не бываетъ. По возвращеніи коробокъ г. Суворцевъ (нынѣ покойный) собирался выслать вторую партію бабочекъ. Коллекціи записаны подъ № 1441.

6.—Дубынскій (Ишимского уѣзда) волостной старшина Захваткинъ выслалъ въ Музей образчикъ шерсти длиннохвостыхъ овецъ, распространенныхъ у крестьянъ с. Ново-Александровскаго этой волости. Онъ сообщаетъ: шерсть эта снята весною, стрижка овецъ большею частію производится два раза въ годъ—весною и осенью, каждый разъ снимаются шерсти до 5 фунтовъ, слѣдовательно въ годъ отъ 9 до 10 фунтовъ; пудъ этой шерсти продается отъ 5 до 6 рублей; тушка овцы вѣситъ отъ 35 ф. до 1 п. 5 ф., и пара этихъ овецъ на племя продается отъ 8 до 9 р. (11 июля 1896 г.). Въ инвентарѣ записаны подъ № 892.

7.—Исаломщикъ с. Усть-Ишима, Тарск. уѣзда, В. П. Митинскій выслалъ въ Музей старинную мѣдную черпильницу, изображеніе дракона и двѣ мѣдныя бляхи. Черпильница найдена въ пашни д. Заленки, Викулов. в., Тарск. у., а драконъ и бляхи найдены въ курганѣ на берегу Иртыша у Усть-Ишима (письмо 7 авг. 1896 г.). Вещи записаны въ инвентарѣ подъ №№ 856—860.

8.—О. И. Гинзбургъ. Одесса. Главный агентъ акціонернаго общества механическо-ткацкой фабрики сѣтей выслалъ въ Музей по просьбѣ Н. А. Варнаховскаго образцы рыболовныхъ сѣтей. Въ особенности просить рекомендовать бумажные сѣти. (25 окт. 1896 г.). Сѣти эти находятъ большой сбытъ въ моряхъ Черномъ, Азовскомъ, Балтійскомъ, Каспійскомъ, а также на Уралѣ. Коллекціи сѣтей хранятся въ Музѣи подъ №№ 1392—1420.

9.—Послѣ хлѣбовъ въ Березовѣ. Назадъ тому три или четыре года мною для испытанія былъ сдѣланъ посѣвъ въ Березовѣ яровой ржи, которая уродилась доброкачественная, почему въ зернѣ была представлена въ Музей; въ прошломъ 1895 г. вторично была посѣяна яровая рожь, которая родилась тоже удовлетворительно,—снопъ ея представляю въ Музей для обозрѣнія публики (Берез. купецъ Степанъ Трифоновичъ Окуневъ, 1 декабря 1896 г.).

1897 г.

1.—Списокъ предметовъ бухарскаго быта, желательныхъ для Музея.

Одежда мужчины. 1) Длинная нижняя рубашка; 2) широкіе шаровары; 3) бешметъ изъ легкой матеріи; 4) камсуль; 5) чапакъ, или халатъ; 6) полушубокъ изъ овечьяго или козьяго мѣха (тупъ) съ су-

коңнымъ верхомъ; 7) кушакъ; 8) яга—тулупъ изъ козьихъ шкурокъ; 9) азямъ изъ киргизской щерсти; 10) рукавицы изъ кожи; 11) рукавицы изъ шерсти; 12) шапка суконная на мѣху; 13) аракчинъ (капацъ); 14) чалма; 15) ичиги; 16) башмаки; 17) бродни (царыкъ).

Одежда женщины. 1) Длинная рубашка; 2) куртка (широкая рубаха); 3) бешметъ; 4) шапка; 5) платокъ; 6) ичиги; 7) головные украшения; 8) браслеты и кольца; 9) украшения, надѣваемыя на грудь.

Убранство комнаты. 1) Низкий столикъ; 2) посуда чайная; 3) тазаякъ; 4) кумганъ; 5) полотенца; 6) кухонная посуда; 7) музыкальные инструменты (кубызъ и др.); 8) детские игрушки; 9) станки для тканья и веретена.

Пища. 1) Хлѣбы и др. издѣлія изъ тѣста (въ засушенномъ видѣ); 2) приготовленія изъ молока (сыръ); 3) образцы крупъ, изготавляемыхъ въ хозяйствѣ.

Земледѣльческія орудія. 1) Рогалюха; 2) борона; 3) коса; 4) серпъ; 5) молотило.

2.—Самоѣдскій календарь. Сообщен. П. О. Телѣжкинымъ изъ Обдорска.

Январь. Начинается Новый годъ—Арка-певъ-дай.

Февраль. Лимби-ири. Ставить ловушки на птицу филина.

Мартъ. Яре-ири.

Апрѣль. Сie-ничъ. Олени начинаютъ телиться.

Май. Неный-ничъ. Этимъ выражается, что всѣ олени телятся и наступаетъ полное лѣто.

Июнь. Нявды ири. Названъ въ честь молодыхъ одногодовалыхъ олений-важенокъ, которая приходятъ съ телятами или телятся въ началѣ 2 го года, что бываетъ рѣдко.

Іюль. Неняигъ-ири. Начало жизни комаровъ.

Августъ. Пили-ири. Конецъ комара. Полная жизнь мошекъ.

Сентябрь. Небыры-ири. Конецъ мошекъ.

Октябрь. Хоро-сей лопчи. Обходъ важенокъ (оленей-самокъ).

Ноябрь. Хоро-ты-толопчи. Полный обходъ матокъ важенокъ хорами (оленями-самцами).

Декабрь. Ниude левдей. Маленький.

3.—Коллекціи по обработкѣ сырыхъ продуктовъ. Высочайше утвержденное общество костеобжигательныхъ заводовъ и выдѣлки изъ кости другихъ продуктовъ (Большой Рѣзвый Остр., собст. домъ. Спб.), высылая коллекцію обработки кости, въ бумагѣ отъ 23 янв. 1897 года пишеть: «Путемъ многократныхъ справокъ намъ удалось исхлопотать особо льготную ставку для отправки ящика съ образцами товаровъ въ стеклянной посудѣ. Ящикъ застрахованъ въ суммѣ 20 р., а деньги за провозъ

5 р. 25 к. упложены здѣсь». Записаны въ инвентарь подъ №№ 2144—2160.

4.—*Предохраненіе коллекцій*. Время отъ времени чучела итицъ нужно пересматривать внимательно со всѣхъ сторонъ и, если окажутся мѣста съ замѣтной порчей отъ моли, то эти мѣста при помощи кисточки смазывать мышьяковистымъ мыломъ или прошитьвать мышьяковистымъ натромъ. Составъ мышьяковистаго мыла: 5 вѣс. частей *sal tartari*, распущеныхъ въ водѣ, смѣшать съ 16 част. бѣлаго мыла, подогрѣть до расpusканія мыла, затѣмъ прибавить 16 частей по вѣсу бѣлаго порошистаго мышьяку (можно и нѣсколько больше), по охлажденіи влить 2 части камфоры, растворенной въ алкоголѣ. Сохранять въ плотно закрытой стклянкѣ (изъ письма М. Д. Рузскаго. Казань, 25 февр. 1897 г.).

5.—Геологическій комитетъ, препровождая въ Музей небольшую палеонтологическую коллекцію, собранную консерваторомъ Музея, сопровождаетъ посылку слѣдующими разъясненіями, сдѣланными геологомъ А. Краснопольскимъ (письмо отъ 4 марта 1897 г.).

1. Остатки (въ видѣ ядеръ) прѣноводныхъ моллюсковъ изъ рода *Unio*. Найденъ въ конкреціяхъ глинистаго желѣзистаго песчаника, залегающихъ среди сѣрыхъ песковъ неогенового возраста въ Тюкалинскомъ уѣздѣ близъ с. Серебрянскаго.

2. Остатки костистыхъ рыбъ изъ родовъ *Percsa* и *Leuciscus* изъ неогеновыхъ прѣноводныхъ отложенийъ с. Серебрянскаго.

3. Зубъ рыбы изъ рода *Myliobatis*.

4. Часть шипа или такъ наз.—ихтіодоруить хрящевой рыбы.

5. Зубы акуловой рыбы *Odontaspis macrota*.

6. Зубы акуловой рыбы *Lamna elegans*.

7. Позвонки хрящевыхъ рыбъ (селахій). №№ 3—7 происходятъ изъ третичныхъ отложенийъ с. Уятскаго на р. Тоболѣ. Курганск. уѣзда.

Кромѣ того, высланы переданные геологомъ Высоцкимъ, полученные имъ изъ Тобольскаго Музея, экземпляры *Cyprina islandica* изъ валуна раковинного конгломерата, найденного на правомъ берегу Обской губы между мысомъ Ярнель и р. Варкутой. Въ инвентарь записаны подъ №№ 2167—2175.

6.—*Отъ ботаническаго сада Императорскаго Юрьевскаго университета*. Каждому систематику извѣстно то важное научное значеніе, какое имѣютъ гербаріи; гербаріи при опредѣленіи растеній зачастую гораздо важнѣе, чѣмъ опредѣлители. Но пріобрѣтеніе гербаріевъ покупкой является обыкновенно весьма затруднительнымъ вслѣдствіе дороговизны ихъ: гораздо доступнѣе для каждого, даже любителя, пріобрѣтеніе гербаріевъ путемъ обмѣна.

Ботаническій садъ Императорскаго Юрьевскаго университета задался цѣлью споспѣшствовать таковому обмѣну гербаріями на слѣдующихъ основаніяхъ:

1. Каждое казенное учреждение (Ботанические сады и ботанические кабинеты университетовъ, естественно-исторические кабинеты средне-учебныхъ заведеній, школы садоводства и т. п.) и каждое частное лицо (преподаватели, садоводы, лѣсничіе, медики, аптекари, любители и т. д.) могутъ вступать въ обмѣнъ гербаріями съ ботаническимъ садомъ Юрьевского университета.

2. Для этого каждое учреждение или лицо, желающее вступить въ таковой обмѣнъ, присыпаетъ осенью каждого года въ ботаническій садъ Юрьевского университета одинъ или нѣсколько видовъ растеній русской флоры, но по возможности въ большемъ количествѣ экземпляровъ.

3. Каждый видъ снабжается этикеткой, на которой пишется латинское название растенія*), мѣстонахождение, мѣстообитаніе, фамилія собирателя, фамилія того, кто опредѣлилъ растеніе, число, мѣсяцъ и годъ сбора. Этикетки могутъ быть написаны на языкахъ: латинскомъ, русскомъ, нѣмецкомъ или французскомъ, но самыми разборчивыми почеркомъ.

4. Число экземпляровъ одного и того же вида, собранного на одномъ и томъ же мѣстѣ, можетъ быть отъ 1 до 100; желательно однако побольше экземпляровъ одного и того же вида. Къ каждому экземпляру непремѣнно прилагается особая этикетка. Этикетки могутъ быть рукописныя (четко), гектографированныя, литографированныя или печатныя.

5. За экземпляръ считается—для деревьевъ и кустарниковъ вѣтка, для растеній травянистыхъ крупныхъ важнѣйшая части, среднихъ—одноцѣлое растеніе (съ корнями) и для мелкихъ—отъ 3-15 растеній. Растенія, конечно, должны быть съ цветами и плодами. Листъ долженъ быть заполненъ растеніями. Гербарный листъ по размѣру больше полулиста писчей бумаги и меньше цѣлаго листа.

6. Непремѣнно прилагается въ двухъ экземплярахъ четко написанный списокъ присланныхъ растеній съ указаніемъ числа экземпляровъ и съ именемъ и адресомъ учрежденія или лица, приславшаго растенія. Безъ такого списка (въ двухъ экземплярахъ) обмѣнъ состояться не можетъ.

7. Пересылка растеній въ ту и другую сторону производится на счетъ участниковъ.

8. По полученіи всѣхъ посылокъ съ такими гербаріями, ботаническій садъ Юрьевского университета оставляетъ по 1 экземпляру въ свою пользу, для остальныхъ же въ теченіе зимы составляетъ и печатаетъ каталогъ дублетовъ и каталогъ этотъ разсыпается участникамъ обмѣна въ двухъ экземплярахъ.

*) Неопределенные или невѣро определенные растенія принимаются также, но тогда участникъ можетъ разсчитывать лишь на половинное количество обмѣнныхъ единицъ (ср. § 11).

9. Каждый участникъ отмѣчаетъ карандашомъ тѣ растенія, которыя онъ желаетъ получить изъ этого каталога, и отмѣченный такимъ образомъ экземпляръ каталога возвращается ботаническому саду.

10. Ботаническій садъ распредѣляетъ дублеты между участниками согласно ихъ желаніямъ, принимая однако при этомъ въ соображеніе качество (научное достоинство и тщательность препаратки и этикетокъ) присланного ранѣе участниками материала.

11. За каждые 20 экземпляровъ, хотя бы одного и того же вида, участникъ можетъ разсчитывать на получение отъ 1 до 266 экземпляровъ разныхъ видовъ, въ зависимости отъ качества присланного имъ материала. Качество же это опредѣляется 50-балльной системой, по которой и оцѣниваются растенія въ печатномъ каталогѣ; при этомъ вычитается 20% въ пользу ботаническаго сада Юрьевскаго университета. (Такъ, напримѣръ, если кто-либо прислалъ 20 экземпляровъ какогонибудь рѣдкаго вида, оцѣненнаго ботаническимъ садомъ въ 50 балловъ, то онъ имѣть право на $20 \times 50 (- 20\%) = 1000 - 200 = 800$ обмѣнныхъ единицъ. Если онъ при этомъ въ каталогѣ отмѣтилъ виды обыкновенные, оцѣненные, напр., въ 3 балла, то таковыхъ видовъ онъ можетъ получить 266 и, такимъ образомъ, вместо 20 экземпляровъ одного рѣдкаго вида приобрѣсти сразу коллекцію въ 266 видовъ болѣе обыкновенныхъ растеній).

Образецъ этикетки:

GENTIANA PYRENAICA L.

Caucasus. Kuban prov., fontes fluv. Selenczuk;

in pratis alpinis.

5. VII. 96.

leg.: N. Busch.

teste: N. Kusnezow.

Пушкаревской вол. и села П. Т. Чусовитинъ представилъ въ Пушкаревское вол. правленіе девять штукъ древнихъ серебряныхъ монетъ и объяснилъ, что ихъ онъ нашелъ 12 мая 1896 года на своей собственной усадьбѣ, въ огородѣ, выкачивая пень старого столба, чтобы произвести распашку этого мѣста для овощей на глубинѣ отъ поверхности земли $\frac{3}{4}$ арш.

Опись. 1) Серебряная монета 1 р. императрицы Анны 1733 г. 2) То же 1739 г. 3) То же имп. Елизаветы 1746 г. 4) То же имп. Екатерины II 1762 г. 5) То же 1764 г. 6) То же 1765 г. 7) То же 1768 г. 8) То же 1773 г. 9) То же 1781 г. Всѣ въсомъ 21 ф. 12 зол.

Находка эта представлена была въ Археологическую комиссию, которая «въ видахъ поощренія вообще находчиковъ къ представленію мѣстному начальству случайно открываемыхъ монетныхъ кладовъ и другихъ древностей, назначила Софонову за неутайку находки вознагражденіе въ размѣрѣ 20 р. съ объявлениемъ ему мотивовъ къ столь щедрому вознагражденію».

(Свѣдѣнія сообщены крестьянскимъ чиновн. 1 участка Туинского уѣзда г. Прѣзжевымъ).

8.— Высочайше учрежденный комитетъ для устройства въ Москвѣ музея прикладныхъ знаній и завѣдыванія имъ при отношеніи отъ 17 апрѣля 1897 г. препроводилъ въ Музей коллекцію «воскресныхъ объясненій» коллекцій музея.

9.— Императорской археол. комиссіи консерваторомъ Музея послано было серебряное четырехугольной формы въ видѣ глубокаго подноса блюдо, приобрѣтенное въ Мужахъ и вывезенное въ обмѣнъ на хлѣбъ остыками р. Сынской. Археол. комиссія отъ 31 мая 1897 г. увѣдомила, что блюдо изготовлено, судя по арабской надписи на немъ, для одного изъ Харезмшаховъ и относится, слѣдовательно, къ XIII столѣтію. Имеется фотографія блюда и копія съ надписи.

10.— *Тобольская флора.* Въ гербаріи растеній, высланныхъ Музею свящ. о. В. Герасимовымъ изъ Обдорска, А. Я. Гордигинъ, между прочимъ, нашелъ *Rugethrum bipinnatum*, *Rugethrum ambig.* (*Chamaemelum amb.*), *Arctostaphylos alpina*.

11.— *Водоросль Nostok.* 9 іюля 1897 г. М. Гусановскій сообщилъ слѣдующее. Въ одномъ озерѣ, принадлежащемъ Туинскому монастырю, въ 6-ти верстахъ отъ города по ту сторону р. Туры крестьяне вмѣстѣ съ небольшими карасиками добываютъ бродниками какіе-то шарики, совершенно похожіе на капсюли съ кастроровымъ масломъ, но только грязнаго цвѣта, различной величины: есть немногій больше голубинаго яйца и менѣе воробынаго—круглой формы. Шарики эти лежать на днѣ озера и лишь въ жаркіе дни подымаются на поверхность воды. Внутри шариковъ содержится маслянистая жидкость которою крестьяне лѣчатся

отъ ревматизма, употребляя внутрь и намазывая больныя мѣста. Крестьяне называют содергимое шариковъ «водянымъ масломъ» и продаютъ ихъ какъ цѣлебное средство по 5 к. за 3 штуки.

12.—Объ обмѣнѣ коллекціями—письмо директора Линнеевскаго естеств.-истор. института въ Берлинѣ.

Препровождая свои каталоги, директоръ пишетъ: «Мы надѣемся, что вы найдете въ нашихъ каталогахъ все, что желаете, а мы прибавляемъ, что эти каталоги содержать не весь еще предметы, находящіеся въ нашихъ магазинахъ. У насъ есть также значительное количество шкуръ млекопитающихъ, птицъ, яицъ, палеарктическихъ и экзотическихъ птицъ, пресмыкающихся и рыбъ въ спирту, писанные каталоги коихъ мы готовы вамъ прислать; мы имѣемъ также интересные типы рыбъ, напр. *Lepidosteus*, *Amia*, *Polypterus*, *Protopterus* etc.

Рекомендуемъ также наше собраніе живущихъ раковинъ земныхъ, морскихъ и рѣчныхъ, каталоги коихъ тоже дополнены.

Что касается насѣкомыхъ, то мы главнымъ образомъ занимаемся составленіемъ коллекцій для школъ; но мы покупаемъ сть собирателей и цѣлые коллекціи въ разныхъ частяхъ свѣта и продаемъ ихъ по умѣреннымъ цѣнамъ.

Еще имѣемъ мы ископаемыхъ Майнцкаго бассейна (делювіальные и третичные), литографскій известникъ изъ Соленгофена, изъ Швабской Юры и силурійскій изъ Богеміи.

Съ удовольствіемъ пришлемъ вамъ таблицы этихъ ископаемыхъ, равно какъ и писанныя таблицы нашихъ запасовъ беспозвоночныхъ.

Для насъ очень важно установить съ вами постоянныя сошенія для пріобрѣтенія отъ васъ путемъ обмѣна шкуръ млекопитающихъ съ черенами для чучелъ,—птичихъ шкуръ, птичихъ яицъ въ гнѣздахъ, гнѣздъ интересныхъ птицъ, пресмыкающихся и рыбъ въ спирту—безъ сомнѣнія весь эти предметы должны быть сибирской фауны—раковинъ земныхъ и рѣчныхъ, бабочекъ, жуковъ, большихъ или странныхъ представителей другихъ отдельловъ насѣкомыхъ.

Въ случаѣ, если вы согласитесь доставлять намъ эти предметы, съ благоволите начать присылкой намъ подробнаго списка всѣхъ млекопитающихъ и птицъ вашей фауны, которыхъ вы можете достать. Мы съ удовольствіемъ снабдимъ васъ инструментами и химическими препаратами. Директоръ Мюллеръ. 26 іюля 1897 г. Berlin № 4. Invalidenstrasse 105.

Печатный циркуляръ, приложенный къ письму г. Мюллера:

«Институтъ былъ основанъ извѣстными зоологами во Франкфуртѣ на Майнѣ въ 1879 г. Это учрежденіе, выдѣлившееся изъ Société d'échanges de l'Association macozoologique должно было особенно заняться въ интересахъ ученыхъ путешественниковъ какъ можно выгоднѣе

утилизировать ихъ коллекціи. Расширеніе коммерческой дѣятельности института было причиной его перевода въ столицу имперіи. Почти всѣ великие путешественники довѣрили свои коллекціи Линнеевскому институту. Мы назовемъ здѣсь лишь д-ра Р. Бемъ, Фишера, барона Мальцана, брат. Краузе, Гартерта, Штолля Клеменса Денгардта. Институтъ поддерживаетъ непрерывныя сношенія не только съ музеями и учебными заведеніями Германіи, но и почти со всѣми значительными институтами материка.

Онъ также посыаетъ болѣе или менѣе значительныя коллекціи въ многочисленныя заокеанскія учрежденія, особенно Сѣв. Америки, Канады, Юж. Америки, Индіи, Австраліи и пр. Ограничимся названіемъ слѣдующихъ музеевъ и институтовъ: Берлинскія королевскія учрежденія естеств. наукъ, національные музеи Вѣны, Лондона, Лейдена, Брюсселя, Пешта, С.-Петербургъ и др. Между нашими корреспондентами изъ Сѣв. Америки мы упоминаемъ музей Вашингтона, Филадельфіи, Мадизана, Итаки, Кембриджа и пр. Матеріалы получаются нами и изъ многочисленныхъ заокеанскихъ владѣній, откуда намъ ихъ доставляютъ коллекціонеры. Институтъ посыаетъ также на свой счетъ путешественниковъ въ страны, заслуживающія изслѣдованія.

Мы съ удовольствіемъ покупаемъ или вымѣниваемъ предметы, которые могутъ намъгодиться. А потому мы покорѣйше просимъ господъ директоровъ музеевъ, учебныхъ заведеній, а также и частныхъ коллекціонеровъ, ученыхъ путешественниковъ и др. обращаться по вопросу объ обмѣнѣ къ Линнеевскому институту».

(Циркуляръ и письмо—на французскомъ языке).

13.—Причина черной окраски соленой грязи на соленныхъ озерахъ. «Черный цвѣтъ соленыхъ грязей и солонцовъ зависитъ, я думаю, отъ присутствія въ нихъ какъ органическихъ, такъ и нѣкоторыхъ неорганическихъ веществъ. Разложеніе органическихъ веществъ идетъ вообще медленно и несовершенно въ средахъ избыточно увлажненныхъ и щелочныхъ (солоноватыхъ); микроорганизмы, переводящіе сложные органические соединенія въ минерализованные продукты, т. е. въ CO_2 , H_2 , NH_3 H_2O и проч. испытываютъ въ такихъ средахъ стѣсненіе своей жизнедѣятельности. Вмѣстѣ съ тѣмъ присутствіе щелочей, въ особенности натра, способствуетъ образованію растворимыхъ въ водѣ темноцвѣтныхъ перегнойныхъ солей, пронизывающихъ и стягивающихъ глину. Получаются черные, вязкія массы, сильно плотнѣющія при высыханіи. Кроме того, черную окраску грязей должны усиливать примѣси сѣрнистаго желѣза и закись—окиси желѣза при высыханіи и провѣтриваніи подобныя грязи нѣсколько свѣтлѣютъ. Желательно было бы, конечно, произвести специальная изслѣдованія надъ грязями и солонцами, въ натурѣ которыхъ

остается не мало темного». (Н. М. Сибирцевъ*). Новая Александрия. 28 августа 1897 г.).

14.—Письмо свящ. Василія Николаевича Герасимова**), отъ 23 октября 1897 г.,—о произведенныхъ имъ раскопкахъ на Ляпинскомъ городище:

«Въ іюнѣ 1897 года по моему прошенію полученъ мною открытый листъ Императорской археологической комиссіи за № 780 на право производства раскопокъ, при немъ дневникъ и листы для перечневой описи могущихъ быть найденными древностей и уведомленіе (№ 271) Тобольского статистического комитета, въ которомъ изложены были правила, установленные археологическою комиссіею. Приняться тогда же за производство раскопокъ было немыслимо вслѣдствіе появленія такой массы комаровъ, что въ лѣсь или поле положительно нельзя было показаться: поэтому раскопки отложены были мною до августа мѣсяца т.-е. до времени прекращенія „гнуса“. 27 іюля мною въ сообществѣ псаломщика мѣстной церкви, Н. М. Дмитріева, дѣятельно помогавшаго мнѣ и во время дальнѣйшаго производства раскопокъ, осмотрѣно было Ляпинское городище и паняты 2 поденщика. Для болѣе правильнаго и успѣшнаго веденія раскопокъ мною выписана была брошюра члена-сотрудника археологического общества Ев. Гаршина: «Курганы, ихъ раскопки, изслѣдованіе и нахожденіе кладовъ. Подборъ необходимыхъ свѣдѣній» (Спб. 1888 г.), съ которой мы ознакомились и выяснили вкратцѣ поденщикамъ ихъ обязанности. Самыя раскопки производились нами 2, 4, 5, 7 и 8 августа и дали совсѣмъ неутѣшительные результаты. Зависѣтъ ли это отъ неумѣнія вести раскопки или отъ чего другого—рѣшить не берусь.

Ляпинское городище представляетъ собою деревянную крѣпость съ частію крѣпостной стѣны и вѣсколько (10—15) разрушенныхъ домиковъ, по устройству своему принадлежащихъ преимущественно инородцамъ. Крѣпость эта—сложенная изъ бревенчатаго лѣса высокая (до 3-хъ сажень) башня, съ аркою подъ ней для проѣзда, вверху ея видны слѣды оконъ—по одному въ каждой сторонѣ. Внутри башни пола вѣтъ; здѣсь стоять иструхшая лѣстница, состоящая изъ бревна, съ высѣченными на немъ ступенями и ведущая въ верхнее отдѣленіе башни, съ поломъ и окнами (полъ уже провалился). Стѣны башни испещрены разными надписями, свидѣтельствующими о посѣщеніи башни любопытными, напр.: «1838 г. Ген. 6 былъ казакъ Забелинъ», «1885 г. Зиновій Баженовъ» и т. д. На дверяхъ, или воротахъ—грубое изображеніе птицы. Башня эта, очевидно, служила караульнымъ постомъ; въ верхнемъ отдѣленіи ея ка-

*) † 20 іюля 1900 года въ Андреевской санаторіи, Белебеевского уѣзда, Уфимской губерніи.

**) Умеръ въ началѣ 1901 г.

заки могли слѣдить за приближеніемъ враждебныхъ имъ людей и отражать или отстрѣливаться отъ нихъ изъ небольшихъ верхнихъ оконечекъ. Къ башнѣ примыкаетъ часть деревянной стѣны, высотою до 4 аршинъ и состоящая изъ круглыхъ кольевъ, соединенныхъ между собою попечерными тѣсницами. Самая стѣна эта давно уже обрушилась и поверхъ ея нарось толстый слой земли.

Раскопки начаты были съ этой именно башни. Внутри ея прорыты были двѣ канавы—одна вдоль, отъ воротъ къ воротамъ, по аркѣ, другая, пересѣкающая ее—поперекъ, и затѣмъ въ каждомъ углу вырыто было по ямѣ; ни въ тѣхъ, ни въ другихъ не найдено было ничего, что бы указывало на то, что башня была обита: слѣдовъ печи или чуvalа нѣтъ; мусоръ былъ только отъ обвалившагося потолка; встрѣчались олены и собачьи кости. Глубина вырытыхъ канавъ до 3-хъ четвертей (иногда до 4-хъ), далѣе идетъ уже промерзлая почва, не уступающая застupу (вѣчная мерзлота) и состоящая изъ чистаго песчанаго слоя. Ни въ башнѣ ни во всѣхъ другихъ строеніяхъ мы не встрѣтили никакихъ желѣзныхъ скрѣпъ или гвоздей. Башню эту съ наружной стороны мы окопали съ трехъ сторонъ широкими канавами; здѣсь часто намъ попадались глиняные черепки, безъ всякихъ узоровъ.

Невдалекѣ отъ башни—остовъ небольшой избы, напоминающей русское жилище, почему мы шутя называли эту избу «домомъ Ляпинскаго воеводы». Изба сложена также изъ бревенчатаго лѣса; дверь выходитъ на сѣверъ; на всѣхъ сторонахъ, кромѣ сѣверной, по три окна,—по одному вверху и по два внизу. Въ переднемъ углу вбиты 2 деревянные гвоздика по одной линіи, заставляющіе предполагать, что здѣсь висѣла икона. Направо отъ входа—слѣды печи или чуvalа. По углубленіямъ въ стѣнахъ видно, что изба раздѣлена была на 4 части или комнаты. Потолокъ избы паль и иструхъ. Здѣсь мы внутри избы перерыли всю почву, насколько позволяла рыхлость земли. Въ мусорѣ встрѣчали берестяныя пластинки съ слѣдами прошивки: вѣроятно—отъ берестяныхъ ведеръ или туясовъ; встрѣчались здѣсь также частицы выдѣланной кожи, по виду—отъ подошвъ, но довольно иструхшія. На мѣстѣ чуvalа—холмъ слежавшейся глины. Трудность въ разрытии почвы здѣсь, кромѣ мерзлоты земли, осложнялась еще павшимъ потолкомъ и проросшими сквозь весь домъ корнями деревьевъ и другихъ растеній. Эта же трудность встрѣчалась и потомъ, при разрытии юртъ остяцкихъ, гдѣ даже въ самыхъ домикахъ выросли уже деревья. Вообще мѣсто, гдѣ находится Ляпинскій городокъ, густо заросло лѣсомъ: кедръ, береза, ель, лиственница, черемуха, рябина и др. Изъ костей, кромѣ оленыхъ, здѣсь встрѣчались тетерви.

Къ этому «воеводскому дому» примыкаетъ такое же деревянное строеніе, по отсутствію оконъ и пола и по особенному устройству заставляющее предполагать амбаръ или кладовую русскихъ жителей. Дверь

амбара выходить къ двери осмотрѣннаго уже вами русскаго жилища. Для развѣшиванія одежды, а можетъ быть и другого какого имущества по длини амбара отъ стѣны къ стѣнѣ придѣлано горизонтальпо нѣсколько жердей. Потолокъ палъ и иструхъ; полъ земляной. Здѣсь мы изрыли весь полъ, отыскали нѣсколько черепковъ, совершенно иструхшихъ кожанныхъ лоскутковъ отъ броденъ, частички бересты и желѣзный пруть, загнутый съ обоихъ концовъ, съ клеймомъ МПА 734. Гвоздей или связей и скрѣпъ желѣзныхъ и здѣсь мы никакихъ не встрѣтили. Благодаря тѣмъ, уже объясневнымъ мною препятствіямъ при раскопкахъ отъ павшаго и полуслгнившаго потолка, отъ множества корпей, проросшихъ все строеніе и переплетшихся между собою, раскопку этого амбара пришлось производить 2 дня (5 и 7 авг.). Къ тому же, хотя и наступилъ августъ, однако комары и особенно мошка замѣтно давали чувствовать свое присутствіе.

Отъ русскихъ жилщъ мы перешли къ строеніямъ, которыя по ихъ особенному устройству мы отнесли къ остыцкимъ юртамъ. Таковыхъ юртъ можно насчитать до 10-ти, но вѣсъ онъ давно уже развалились и засыпаны землею и только иногда 2—3 торчащія изъ земли бревна свидѣтельствуютъ, что на такомъ-то мѣстѣ существовала юрта. Мы разрыли только три юрты. Всѣ онъ были со слѣдами чуvalовъ; здѣсь никакихъ остатковъ домашняго обихода не находили; не встрѣчалось даже и черепковъ; зато въ каждой юртѣ попадалось много костей—оленыхъ, собачьихъ, лошадиныхъ, заячьихъ, тетервихъ и др. Въ одной юртѣ найдены 2 биссеринки, не особенно мелкихъ—блѣлая и красная (мною при перекладкѣ вешей утеряны) и полуиструхшая кость, часть оленьей упряжи».

15.—Академикъ С. И. Коржинскій прося (26 окт. 1897 г.), о сотрудничествѣ при изданіи гербарія русской флоры, предлагаетъ посыпать материалъ на имя академіи наукъ; такія посылки по ст. 64 почтовыхъ правиль (ст. 374 т. XII св. зак. изд. 1857 г. устав. почтов.) принимаются почтою бесплатно.

16.—*Альбуминное дѣло.* Письмо владѣльца альбуминной фабрики въ Острогожскѣ, Воронеж. губ. (F. Luttringschau ser. 1 ноября 1897 г.)

«Яйца скапаутся здѣсь въ окрестностяхъ въ разстояніи до 200 верстъ отъ города и привозятся сюда на повозкахъ крестьянами сборщиками до 10 тыс. на одной повозкѣ и лошади. Цѣна яицъ здѣсь въ лѣтнее время отъ 8 до 10 р. за тысячу, весною и осенюю значительно дороже.

Вырабатывается на заводѣ яичный альбуминъ (сушеный блокъ), который употребляется на мануфактурныхъ фабрикахъ для отдѣлки ситцевъ, и яичный желтокъ, который отправляется въ жидкомъ видѣ и употребляется на кожевенныхъ заводахъ для отдѣлки мягкихъ кожъ (сафьяна, перчаточныхъ кожъ и др.). Можно также приготовлять блокъ и желтокъ для пищи (консервы). Цѣны подвержены большимъ колеба-

віямъ: за послѣдніе 8 лѣтъ цѣны были: за альбуминъ—отъ 15 руб. до 33 руб. за пудъ на мѣстѣ, за желтокъ—отъ 7 р. 75 к. до 3 р. 20 к.

Образцы альбумина и желтка записаны въ инвентарь подъ №№ 2378 и 2379.

17.—При письмѣ отъ 21 ноября 1897 года хранитель зоологического музея Казанского университета препроводилъ въ Музей первую партію коллекцій позвоночныхъ, собранныхъ имъ въ 1896 году въ Тобольской губ. Коллекція состоитъ изъ муміекъ птицъ и грызуновъ и 30 банокъ со спиртовыми препаратами.

18.—*O храненіи коллекцій.* «При храненіи шкурокъ (какъ птицъ, такъ и звѣрей) пожалуйста не жалѣйте нафталина и черезъ каждые 5—6 мѣсяцевъ смѣняйте его, такъ какъ онъ выдыхается» (Изъ письма М. Д. Рузского, хранителя зоол. музея Имп. Каз. универс. отъ 21 ноября 1897 г.).

19.—Изъ письма свящ. о. В. Герасимова изъ Щекуры, Березов. уѣзда, отъ 13 декабря 1897 г.: «19 сентября сего года былъ близъ устья рѣчки Елбынь-я, въ 25 верстахъ отъ Сартыни, внизъ по течению рѣки Сосы; часть праваго берега ея, именно мысъ, вдающійся въ устье рѣки, окаменѣла. Вся окаменѣлость простирается до 10 арш. длиною 2 ширины и $1\frac{1}{2}$ высоты. На камняхъ небольшой слой чернозема съ растительностью. По преданию воголовъ, на этомъ мѣстѣ существовала кузница, и какъ доказательство этого, они называютъ эту часть берега «огаромъ»—отъ горна кузницы. Это мѣсто почитается ими за святое, какъ и рѣчка Елбынь=чистый, святой, я=рѣчка. Тутъ же на берегу рѣчки найденъ узорчатый черепокъ—вѣроятно, вымытый изъ небольшого обрыва, въ пескѣ котораго встрѣчается много магнитнаго желѣзняка (?). Окаменѣвшій мысъ по-вогульски называется Кернъ-Варн-Нѣль=мысъ, гдѣ была кузница.

20.—Совѣтъ бесплатной народной библіотеки-читальни уѣзднаго комитета попечительства о народной трезвости въ г. Бугурусланѣ черезъ предсѣдателя своего А. Дегтярева обратился въ Музей съ просьбою о доставленіи коллекціи изъ предметовъ быта сѣверныхъ инородцевъ. (Письмо отъ 6 ноября 1897 г.).

Въ отвѣтъ на эту просьбу въ организующійся музей читальни выслано 64 номера вещей и фотографій. Отношеніемъ отъ 14 дек. Бугурусланскій уѣздный комитетъ попечительства о народной трезвости согласно постановленія своего отъ 9 декабря приноситъ Музею благодарность за содѣйствіе устройству музея.



ада. Північно-західною лінією з північного заходу на південний схід, від якої відходить ще одна лінія, яка відходить від північного заходу на південний схід, але з північного заходу на південний схід.

РІЧКА ТУРА.

(Къ вопросу объ улучшениі ея фарватера и сооруженіс же-
лѣзной дороги до Тобольска).

Пласти глинъ, распространенные по обѣ стороны Туры, со-
ставляютъ илato, поднимающееся на 82 метра надъ уровнемъ
моря. Мѣстами оно образуетъ немного вхолмленія простран-
ства и котлообразныя, довольно большія углубленія. Въ этихъ
пластахъ рѣка Тура проложила свое древнее русло, которое вѣ-
ками образовало широкую долину. Почвы послѣдней образовались
путемъ размыванія горныхъ породъ, входящихъ въ составъ пост-
пліоценовыхъ толщъ и называемыхъ аллювіальными паносами. Первобытные, высокіе берега, сопровождая теперешнее русло Туры
по обѣ стороны, приближаются къ нему въ нѣкоторыхъ мѣстахъ
довольно крутыми, иногда отвесными „ярами“, обнаженія кото-
рыхъ знакомятъ наблюдателя съ геогностическимъ строеніемъ
страны, между тѣмъ какъ почва самой долины, представляя раз-
рѣзы новѣйшихъ образованій, даетъ указанія на стратиграфиче-
скія условія залеганія породъ. удаленіе которыхъ составляетъ
задачу для инженеровъ-гидротехниковъ.

Древнія отложенія почвъ, образовавшихъ высокіе берега,
приближаются къ рѣкѣ Тури внизъ по течению отъ Тюмени въ
нижеслѣдующихъ пунктахъ.

1) Около Тюмени, по правому берегу рѣки, постпліоценово-
вый „яръ“, начинаясь отъ рѣчки Баборынки, образуетъ вогнутую
дугу съ обширными оврагами; ниже, близъ загородного сада, рѣка
отстуپаетъ отъ яра, образуя такъ называемые казачьи луга, и
снова приближается къ нему въ 16 верстахъ близъ деревни А-
типиной.

2) Образовавъ по правому берегу указанный казачій лугъ,
Тура около деревни Мысъ подошла къ лѣвому высокому берегу
древняго русла; потомъ отстунила отъ него и черезъ 3 версты,
при деревнѣ Яръ, сдѣлала поворотъ на юго-востокъ, при чмъ
крутыя обнаженія древнихъ береговъ опять приблизились съ лѣ-
вой стороны къ самому руслу.

3) Начиная отъ деревни Атипиной до Ошкуровой, верстъ

на девять по правому берегу, высокий постиллюценовый яръ, размытый течениемъ рѣки, образуетъ двѣ сильно вогнутыхъ дуги: первую—между деревнями Антишиной и Паренкиной, вторую—отъ разрушенныхъ соляныхъ магазиновъ ниже Паренкиной до деревни Мальковой.

4) Съ лѣвой стороны въ Туру впадаетъ небольшая рѣчка Тураевка, отъ устья которой, не доѣзжая деревни Борковъ, вытянулся у самаго русла высокий вогнутый яръ древнихъ береговъ, простираясь на пять верстъ до деревни Филиновой; онъ представляеть по своему строенію особый научный интересъ, о которомъ будетъ упомянуто ниже.

5) Далѣе, внизъ по теченію рѣки, въ предѣлахъ указаннаго пятнадцативерстнаго расстоянія, высокій древній берегъ подходитъ къ руслу Туры съ правой стороны около деревни Криводановой и съ лѣвой—около деревень Щербака и Созоновой.

Геогностическое строеніе описанныхъ постиллюценовыхъ на-
иластованій представляетъ слѣдующіе типы:

1) Подъ растительнымъ слоемъ, который бываетъ не толще полуторыхъ футовъ, лежитъ бледновато-желтый суглинокъ, мѣстами окрашенный окисью желѣза и содержащій извѣстъ съ очень слабыми признаками слюды. Мощность его бываетъ различная—начиная отъ сажени до четырехъ и болѣе саженъ. Благодаря измѣнчивому количеству содержанія песка, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ онъ дѣлается лѣпниной, годной для выдѣлки киричика. Ближе къ лежачему боку появляются иногда полосками, иногда гнѣздами, мергельныя стяженія, называемыя пѣмцами Losskindeln, съ большимъ процентомъ содержанія извести. Ниже залегаетъ слой кварцеваго песка, отъ аршина до $1\frac{1}{2}$ саженъ мощностью, съ подчиненными ему выклинивающимися проилластками желтой глины и галекъ, начиная отъ горошины и до величины картофеля. Слои кварцеваго песка (Sandlagen) мѣстами проникнуты просачивающейся желѣзистой ржавчиной, которая путемъ отложенія по берегамъ рѣки вокругъ растеній (потомъ выгнивающихъ) образуетъ стяженія въ видѣ цилиндровъ, величиною отъ синички до толстаго веретена. Ниже залегаетъ пласти сѣроватой илистой глины, вскипающей отъ кислотъ, толщиною отъ 0,60 сажени*) до двухъ и болѣе саженъ; подъ ней на бурыхъ глинахъ покоятся слои песковъ сильно пропитанные водой, называемые „лавунами“. Они иногда перемежаются съ тонкими проилластками желтовато-сѣрыхъ глинъ. Въ описанныхъ суглинкахъ встрѣча-

*) Сажени всюду выражены въ сотыхъ доляхъ.

ются разрозненными кости *Elephas primigenius*, *Bison priscus*, *Equus caballus*, *Rh. tichorhinus* и проч.

2) Второй типъ постплiocеновыхъ наилластованій, по течению рѣки Туры, слѣдующій. Подъ растительнымъ слоемъ залегаетъ тотъ же мощный суглинокъ, вскипающій въ кислотахъ; снизу его слой сѣроватаго песка съ подчиненными ему проилластками сѣроватой глины, заключающей въ себѣ раковины *Cyclas*, *Helix*, *Paludina* (дер. Рѣшетникова). Хотя эти виды моллюсковъ относятся къ возрасту послѣтретичныхъ образованій, но встрѣчаются и въ третичныхъ образованіяхъ вмѣстѣ съ *Union* и kostями мастодонта, которая однако около Тюмени до сихъ поръ не обнаружены. Тонкіе пласти песчанистой сѣроватой глины ниже переходятъ въ слой вязкихъ иловатыхъ сѣрыхъ глинъ, которая легко вскипаютъ отъ кислотъ. Толщина ихъ отъ 0,60 до 2,20 сажень. Глубже, отдѣляясь слоемъ крупнаго песка съ галькой, лежать темновато-сѣрыя глины, отъ кислотъ не вскипающія, съ подчиненными имъ голубыми, которая называются здѣсь „печинами“. Въ сѣроватыхъ илистыхъ и темновато-сѣрыхъ глинахъ находили кости *Bison priscus* въ видѣ неразрозненныхъ скелетовъ, вмѣстѣ съ kostями мамонта, носорога, лошади и оленя.

3) По свѣдѣніямъ, обязательно сообщеннымъ мнѣ Г. В. Костырко, ниже описанныхъ желтоватыхъ суглинковъ, буровыя скважины, проложенные почти подъ самымъ уровнемъ межевой воды въ рѣкѣ Турѣ, дали слѣдующіе результаты: въ ключевомъ логу, близъ завода Котельникова, на 2,20 сажени залегаетъ указанная выше сѣроватая илистая глина, отдѣляющаяся тонкимъ въ 0,50 сажени пластомъ песка и гальки отъ синеватой, плотной лѣнной глины, толщиною въ 1,10 сажени; глубже залегаетъ слой песковъ съ примѣсью буро-окристыхъ, похожихъ на лигнитъ, мелкихъ частичекъ неизвѣстныхъ мнѣ деревьевъ; этотъ песчаный слой толщиною въ 1,20 сажени покоятся на бурыхъ глинахъ, съ прослойками песка, въ которыхъ встрѣчаются, какъ и въ предыдущемъ пластѣ, похожія на лигнитъ зернышки; мощность бурыхъ глинъ 2,30 сажени; надъ слоями ихъ встрѣчаются ключи сильно желѣзистой воды.

4) Въ логу близъ Царева городища сѣрая иловатая глина съ прослойками песка залегаетъ до глубины 1,20 сажени; ниже ея идетъ песокъ съ галькой и прослойками глины до 2,10 сажени, переходящій въ слои его, содержащіе лигнитовидные кусочки растеній и залегающіе на 4,50 сажени. Какая порода служить подстилкой бурымъ глинамъ, пока неизвѣстно.

Рѣка Тура проложила себѣ широкую долину въ древнемъ

постиліоценовомъ плато, благодаря обширнымъ колебаніямъ уровня ея водъ въ межень и въ половодія. Вытекая съ восточныхъ склоновъ средняго Урала, богатыхъ водяными осадками, она принадлежить, по системѣ Воейкова, къ типу рѣкъ, разливающихся отъ весенняго таянія снѣговъ. Половодія Туры, кроме того, повторяются также и послѣ лѣтняго дождливаго времени, свойственнаго средней полосѣ Россіи. По метеорологическимъ наблюденіямъ на изслѣдуемомъ пространствѣ средняя количества выпадающихъ дождя и снѣга по временамъ года выражаются слѣдующимъ образомъ:

Весна (мартъ—май) 26,3 мм. Осень (сент.—нояб.) 49,5 мм.
Лѣто (июнь—августъ) 85,8 мм. Зима (дек.—февр.) 14,8 мм.

Первый приливъ воды начинается тотчасъ послѣ освобожденія рѣки отъ льда; второй бываетъ въ разное время осени, начиная съ половины іюля и до половины сентября. Такъ, въ 1889 году второй приливъ былъ около половины іюля, въ 1874 и 1879 гг.—въ первыхъ числахъ августа, въ 1876 и 1892 гг.—въ концѣ августа, а въ 1887 году—въ первую четверть октября. Средняя высота стоянія воды за двадцать лѣтъ, съ 1873 г. по 1892 годъ, была $8\frac{1}{2}$ аршинъ. Самое высокое стояніе воды во время весеннихъ разливовъ— $10\frac{1}{4}$ аршинъ—было въ 1889 году и самое низшее—5 арш. 2 вершка—въ 1884 г. Самое раннее освобожденіе Туры отъ льда было 26 марта (1888 г.), а самое позднее—23 апрѣля (1884 года). Такія колебанія въ уровнѣ водъ, при различной быстротѣ теченія со склоновъ восточного Урала, обусловили ту необыкновенно большую извилистость русла Туры, которая вмѣстѣ съ мелями и перекатами причиняетъ ежегодно невознаградимые убытки пароходовладѣльцамъ. Указанные выше древніе постиліоценовые берега, подходящіе къ руслу рѣки Туры, подвергаются разрушенію въ тотъ периодъ стоянія водъ, когда она прибоемъ своимъ подмываетъ слой песковъ, лежащихъ подъ желто-блѣдыми суглинками, и заставляютъ послѣдніе дѣлать обвалы, дающіе матеріалъ для мелей и перекатовъ.

Протекая отъ Тюмени съ NNW на SSE, Тура дѣлаетъ изгибы, или нетли, чаще всего съ сѣвера на югъ и обратно, вслѣдствіе чего, по законамъ Бера и теоріи Жильберта, сильныя разрушенія постиліоценовыхъ толщъ происходятъ именно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ рѣка, при меридиональныхъ поворотахъ, подходитъ къ ея правымъ высокимъ берегамъ. Размытые во время весенняго половодія суглинки, сортируясь по руслу рѣки, заставляютъ ее отступать то въ правую, то въ лѣвую сторону, оставляя безчисленные старицы и озера цѣ обоимъ берегамъ.

Рѣка Тура отъ впаденія въ нее выше Тюмени рѣчки Баборынки приближается къ правому вогнутому постиліоценоному высокому берегу и, казалось бы, представляетъ условія для его разрушенія; но таковое ослабляется вслѣдствіе того, что теченіе приняло ESE-ое направление. Однако, сличая иланъ Тюмени 1888 г. съ экспликаціей на иланъ Высочайше утвержденный 18 го іюля 1808 года, оказывается, что за истекшее столѣтіе правый берегъ Туры, начиная отъ Благовѣщенской церкви внизъ по рѣкѣ, обвалился не менѣе какъ на семь сажень, такъ что отъ береговой улицы, означенной на иланъ 1808 года, мѣстами остались только слѣды. Разрушеніе простоянено было въ иѣкоторыхъ пунктахъ укрѣпленіемъ берега посредствомъ деревянныхъ срубовъ, которые видны и теперь въ видѣ сгнившихъ бревенъ. Сильное разрушеніе праваго берега Туры было выше впаденія Тюменки и ниже Баборынки около Троицкаго монастыря, гдѣ рѣка имѣть меридиональное теченіе. Еще въ сорокахъ годахъ этого столѣтія обвалы берега грозили разрушить монастырскую стѣну, но смиренному архимандриту Владиміру удалось задержать сокрушающее дѣйствіе воды самими немудрыми средствами и притомъ совершенно случайно. Страстный любитель рѣчныхъ раковъ, о. Владиміръ пожелалъ развести ихъ вблизи монастырскихъ стѣнъ въ руслѣ рѣки; но такъ какъ въ этомъ мѣстѣ быстрымъ теченіемъ относило ихъ къ городу, то онъ измыслилъ набросать въ рѣку бутоваго камня, образовавъ изъ него иѣсколько поперечныхъ переборовъ, за которыми близъ берега могли бы укрываться раки. Это нехитрое и дешевое сооруженіе предохраняло отъ разрушенія берегъ рѣки и монастырскую стѣну довольно долго. Съ 1860-хъ годовъ любителя раковъ уже не было, плотинки о. Владиміра не поддерживались, и берегъ сталъ обваливаться.

Ниже Тюмени рѣка начинаетъ измѣнять теченіе съ ESE на NE, отступая отъ высокаго берега и оставляя луговое пространство съ болотами и высыхающими старицами. Буреніе на отмели почвъ, въ надеждѣ найти артезіанскую воду, показало нижеслѣдующіе пласти:

До глубины 1,20 саж. залегаетъ вязкая илистая сѣрая глина, не вскипающая отъ кислоты; она отдѣляется слоемъ въ 0,5 саж. свѣтло-желтой глины отъ иласта въ 1,50 саж. темно сѣрой глины, также не вскипающей отъ кислоты и очень вязкой. Ниже идетъ сѣрий песокъ, толщиною не болѣе сажени; онъ переходитъ въ мелкозернистый слой бѣлаго песка, мощностью въ 9,00 саж., который поконится на свѣтло-сѣрыхъ и голубоватыхъ глинахъ; глубина ихъ залеганія не изслѣдована. Отступивъ близъ Тюмени отъ вы-

сокаго берега, Тура около Александровскаго сада образовала старицу, которая во время половодія сливається съ главнымъ русломъ.

Въ восьми верстахъ отъ Тюмени по течению рѣки, около деревни Мысъ, Тура подходитъ къ лѣвому, высокому, истиліо-ценовому берегу, но, оставивши при подошвѣ его старицу, не подмываетъ суглинковъ. Чрезъ $2\frac{1}{2}$ версты, около деревни Ярь, рѣка дѣлаетъ крутой поворотъ на юго-востокъ, подходитъ къ высокому лѣвому берегу и разрушаетъ его. На протяженіи 10 верстъ отъ Тюмени до деревни Ярь правый высокій берегъ отдѣляется отъ русла рѣки отмелю, называемою Казачьимъ лугомъ, и старицею, или Быковскимъ озеромъ. Обогнувъ противъ деревни Коныловой крутой лѣвый берегъ, идущій отъ Яра, Тура сначала круто поворачиваетъ на сѣверо-востокъ, а потомъ, на протяженіи $4\frac{1}{2}$ верстъ, уклоняется на юго-востокъ до деревни Антишиной, принимая въ себя съ лѣвой стороны рѣку Ватажную. Отъ Антишиной рѣка течеть на востокъ, а потомъ круто поворачиваетъ сначала на сѣверъ и, сдѣлавши петлю, на югъ. На всемъ этомъ пространствѣ, протяженіемъ на десять верстъ, Тура подмываетъ правый, высокій, суглинковый берегъ, подчиняясь въ своемъ теченіи его сложнымъ изгибамъ; она дѣлаетъ здѣсь петлю длиною въ $5\frac{1}{2}$ верстъ и, принимая теченіе на NNW, огибаетъ высокій суглинковый ярь верхняго яруса, который вытянулся вогнутой дугой по правому берегу рѣки и, слѣдовательно, представляетъ наилучшія условія для разрушенія, какъ вслѣдствіе вращенія земли, такъ равно и отъ центробѣжной силы теченія. Обогнувъ ярь, Тура до деревни Субботиной принимаетъ направленіе съ NNW на SSE; при этомъ высокій берегъ хотя и дѣлается западнымъ, но, оставаясь по прежнему съ правой стороны теченія, подлежитъ въ силу закона Бера наибольшему разрушенію. Субботинскій берегъ, не имѣя выгнутости, разрушается менѣе Паренкинскаго, но зато образованію здѣсь мелей, кромѣ прочихъ условій, помогаютъ выносы песковъ и ила изъ Кривого озера, впадающаго въ Туру въ томъ мѣстѣ, гдѣ рѣка дѣлаетъ крутой поворотъ съ сѣвера на югъ по меридіану.

Этотъ пунктъ, вслѣдствіе характернаго направленія теченія рѣки и свойствъ залегающихъ по берегамъ горныхъ породъ, представляетъ поучительный примѣръ денудаціонныхъ процессовъ и гидротехническую задачу для инженеровъ по устраненію отлагающихся мелей, которая причиняютъ миллионы убытки. Противъ Паренкиной русло рѣки немного расширяется, и мели, бѣрущія матеріалъ отъ разрушающагося праваго постїліоценового берега, осаждаются на лѣвомъ берегу рѣки. Напластованія ихъ

идутъ въ слѣдующемъ порядке. До глубины 1,30 саж. отъ поверхности воды лежитъ отмытый мелкій бѣлый песокъ, переходящій сначала въ сѣроватый, а потомъ, до глубины 2,05 саж., въ довольно плотный песчаниковый слой, не разсыпающійся при высыханіи. Ниже залегаетъ сыпучій песокъ, но уже крупнозернистый. Шурфы ближе къ правому берегу Туры въ глубокомъ фарватерѣ показали слѣдующія напластованія: до 1,20 сажени отъ поверхности воды залегаетъ свѣтло-желтый плотный слой песка, подъ нимъ до 2,30 саж. идетъ песокъ, связанный сѣрой вязкой глиной, которая постепенно переходитъ въ голубоватую, или „печину“, выходящую ниже Паренкиной въ видѣ берегового мыска.

Противъ Субботиной, также по лѣвому берегу рѣки Туры, отложилась длинная мель изъ продуктовъ разрушенія суглинковъ праваго высокаго берега. Параллельно этой мели ложится вторая ближе къ правому берегу—по нашему мнѣнію, отъ выносовъ песчанаго ила изъ Кривого озера. Правѣе второй мели рѣка проложила себѣ неглубокій протокъ, по которому въ лѣтнєе время проходить суда, чтобы нѣсколько выпрямить направление пути, не маневрируя между двумя мелями. Напластованіе Субботинской мели, за немногими отличіями, такое же, какъ и Паренкинской.

Гидротехническія работы на этихъ двухъ, близкихъ къ Тюмени меляхъ не принесли пока никакой пользы для безпрепятственнаго движенія судовъ. Рассказываютъ, что около Субботиной, не укрѣнивъ предварительно разрушающихся береговъ и не преградивъ выносовъ изъ Кривого озера, инженеры направили работы къ тому, чтобы посредствомъ деревянныхъ заборовъ прекратить теченіе во вновь образующемся руслѣ (протокѣ) и направить струю воды между двумя мелями (въ предположеніи, что эта струя промоетъ себѣ русло). Эти сооруженія были подмыты и снесены. Около Паренкинскай мели для укрѣленія берега предполагалось возвести перпендикулярно къ нему „илетневые бычки“. Прекратить обвалы береговъ такого рода сооруженіями едва ли удастся; между тѣмъ такие бычки въ половодіе могутъ съ усиѣхомъ для поврежденія судовъ замѣнить подводные шкеры, если только не будутъ возведены выше уровня воды. Но и въ послѣднемъ случаѣ, при крутомъ поворотѣ въ этомъ мѣстѣ рѣки, подобныя сооруженія въ бурную погоду могутъ оказаться весьма плохую услугу судовладѣльцамъ. Передавая соображенія людей, стоящихъ близко къ интересамъ гидротехническихъ сооруженій, я не беру на себя смѣлости входить въ ихъ оцѣнку и обсужденіе.

Далѣе Тура между деревнями Мальковой и Ошкуровой на протяженіи трехъ верстъ дѣлаетъ изгибъ въ видѣ прямого угла, обращенного па сѣверо-западъ. Въ этомъ изгибѣ на правомъ, выгнутомъ берегу образуется мель, и рѣка отступаетъ на сѣверо-западъ, образуя „отлужье“. Мальковская мель опасна особенно вслѣдствіе того, что рѣка Тура въ этомъ мѣстѣ при поворотѣ суживается. Отъ деревни Ошкуровой Тура течеть съ юга на сѣверъ по широкой, давно развившейся долинѣ, оставляя по обѣ стороны значительное количество озеръ и старицъ, каковы: Илоское, Камышевое, Осиновое, Луговое, Шульбинское и Ессаульское. Послѣднее имѣетъ два стока въ Туру, которые, вынося песокъ, отлагають его немного ниже по теченію—сначала по правому берегу, а потомъ по лѣвому. Образованію этихъ мелей, мы полагаемъ, содѣйствуетъ также крутой поворотъ рѣки на юго-востокъ и двѣ рѣчки—Великанка и Каишкаринка, впадающая здѣсь съ лѣвой стороны въ Туру и отклоняющія ея теченіе на юго-востокъ. Чрезъ три версты юго-восточное направление рѣки перемѣняется на сѣверо-восточное, чтобы за Больше-Каишкаринскими юртами принять прямое направление. При послѣднемъ поворотѣ теченіе образуетъ заводъ, за которой образовался довольно большой островъ, окруженный песчаной мелью отъ выносовъ озера Каргачи и Нергазы. Удерживая далѣе юго-восточное направление на протяженіи шести верстъ, Тура протекаетъ въ широкой долинѣ съ озерами и старицами Косылбаево, Плача, Шикиши, Калышъ, Якушевсксе и проч. Въ этомъ участкѣ мели около юртъ Шикишинскихъ и Якушевскихъ, по нашимъ соображеніямъ, есть продукты озерныхъ отложений.

Отъ Якушевскихъ юртъ до деревни Филиновой Тура такъ же, какъ и около деревни Наренкиной, принимаетъ теченіе на сѣверъ, а потомъ, сдѣлавъ петлю, течеть на югъ. Петля эта отъ Якушевскихъ юртъ до дер. Шешуковой, не менѣе восьми верстъ длиною, имѣетъ выгибъ къ лѣвому берегу и около деревни Борковъ подмываетъ крутой постиліоценоый яръ. Высокій древній берегъ начинается выше деревни Борковъ отъ рѣки Тураевки; растягиваясь по лѣвому берегу рѣки и имѣя вогнутость по всей своей длини, онъ можетъ служить любопытнымъ потвержденіемъ теоріи Жильberta, по которой размывающая сила должна находиться въ зависимости отъ разности втянія вращенія земли и центробѣжной силы теченія. Это обстоятельство, при совокупности всѣхъ прочихъ условій, задерживаетъ здѣсь развитіе мели, существующей, какъ намъ известно по документамъ, съ начала текущаго столѣтія. Около Филиновой, гдѣ представляются наилучшія усло-

вія для разрушенія высокаго берега, выступаютъ трудно поддающіяся обваламъ голубыя глины, или „печины“.

Отъ деревни Шешуковой до Криводановой, на разстояніи шести верстъ, Тура, принимая восточное направление, дѣлаетъ два небольшихъ изгиба и около озера Матюшина подходитъ къ крутымъ яру древняго берега, подмывая его въ трехъ мѣстахъ на разстояніи двухъ съ половиной верстъ внизъ по теченію до озера Перекать-Рыбнаго. Обвалы береговъ въ этомъ участкѣ сами по себѣ оказывають слабое вліяніе на образованіе мелей, но узкое русло рѣки въ межень представляетъ для судоходства не малыя затрудненія.

Отъ Криводановой до дер. Щербака, на протяженіи 4 верстъ, Тура течеть на сѣверо-востокъ, а потомъ отъ впаденія съ лѣвой стороны рѣчки Айги до деревни Созоновой ($3\frac{1}{2}$ версты) — на востокъ. Близъ Созоновой высокій лѣвый берегъ обваливается не ежегодно; онъ даетъ матеріалъ для образованія мелей ниже Созоновой передъ впаденіемъ въ Туру озера Кривого.

Отъ Кривого озера, которое лежить въ трехъ съ половиной верстахъ ниже Созоновой, Тура дѣлаетъ крутой поворотъ по меридіану на югъ и принимаетъ въ себя р. Пышму. Направленіе теченія той и другой рѣки здѣсь слѣдующее: Тура и Пышма на протяженіи семи верстъ текутъ параллельно съ запада на востокъ, въ разстояніи полуторыхъ верстъ другъ отъ друга: Тура — сѣвериѣ, Пышма — южиѣ. Затѣмъ, какъ сказано, Тура дѣлаетъ поворотъ на югъ, соединяется съ Пышмой и снова принимаетъ восточное направление. Протекая въ меридіанальномъ направлениі, Тура подмываетъ правый берегъ и отлагаетъ мель ниже впаденія Пышмы; эта мель увеличивается выносами изъ Кривого озера и образуетъ перекатъ, затрудняющій судоходство. Въ верстѣ отъ впаденія Пышмы внизъ по рѣкѣ въ Туру впадаетъ лежащее почти параллельно ея руслу озеро Кононецъ. Характеръ напластованій переката, судя по образцамъ породъ, обязательно доставленныхъ мнѣ Янушевымъ, слѣдующій: до 1,13 сажени отъ межеваго уровня воды лежитъ сплошной желтоватый песокъ, связанный глиной, которая отъ кислотъ не вскипаетъ; ниже, на глубинѣ 1,96 сажени, идетъ сѣровато-блѣлый, легко разсыпающійся песокъ, исходящій постепенно въ песокъ же, но желтовато-сѣрый, тяжелый, не разсыпающійся при высыпаніи. Послѣдній залагаетъ до глубины 3,52 сажени и покоятся на вязкой голубой глине, мощность которой неизвѣстна.

На этомъ перекатѣ было остановлено вниманіе Тюменскихъ гидротехниковъ, которые въ навигацію 1894 года провели здѣсь

самое лучшее для работы время, когда, по словамъ инженера Бѣльского, глубина воды на перекатахъ Туры дошла до 8 четвертей и землечерпалку подвели къ Пышменскому перекату. Потомъ, когда рѣка стала мелѣть, по разсказамъ очевидцевъ, машину хотѣли передвинуть назадъ къ Субботиной, но мели около деревни Щербака ее не пустили, поэтому по необходимости пришлось продолжать начатыя работы у Пышмы, хотя какъ впереди, такъ и въ тылу, образовавшиеся перекаты прекратили судоходство*), и естественные обвалы береговъ вверхъ по рѣкѣ давали прекрасный материалъ для работы на Пышменскомъ перевалѣ. Рассказываютъ, что получаемые со дна рѣки продукты отложеній рабочие сначала спускали посредствомъ трубъ въ озеро Кононецъ, но потомъ, когда увидѣли, что оно начинаетъ выносить ихъ ниже переката, то измѣнили характеръ работъ. Очевидцы утверждаютъ однако, что результаты трудовъ увѣнчались проложеніемъ канавы на 4 вершка глубиною (углубленіе фарватера съ 16 на 20 верш.), протяженіемъ на 200 сажень. Когда къ концу осени вода стала немного прибывать, землечерпательную машину повели вверхъ по рѣкѣ къ Тюмени, но около деревни Субботиной она среди рѣки глубоко зарылась въ песчаную мель и погребла себя на цѣлую зиму подъ толстымъ слоемъ сибирскихъ льдовъ. Такимъ образомъ исполнилось предсказаніе Тобольскихъ Губернскихъ Вѣдомостей (№ 36 за 1894 г.), которое инженеръ Бѣльский опротестовалъ хотя и горячо, но преждевременно: бѣдствіе, постигшее землечерпательную машину, было обстоятельствомъ неизбѣжнымъ, поэтому и легко предвидѣннымъ.

Этимъ окончились гидротехнические работы 1894 года, стоявшія государственному казначейству, вѣроятно, не одну сотню тысячъ рублей.

Изъ настоящаго очерка видно, что Тура на разстояніи пятидесяти верстъ имѣеть 12 мелей и перекатовъ (мы не считаемъ тѣхъ, которые вновь формируются и устраненіе которыхъ предстоитъ еще въ будущемъ). Сколько же мелей придется расчистить до Тобольска по теченію рѣки по крайней мѣрѣ на разстояніи 350 верстъ? Судя по результатамъ работъ 1894 года, сколько, спрашивается, лѣтъ нужно будетъ употребить для устройства сколько-нибудь подходящихъ приспособленій для плаванія судовъ и какой капиталъ потребуется истратить для этого государственному казначейству? Пусть работы затянутся даже на десять лѣтъ (мы думаемъ даже на полстолѣтія), то и за это время успѣютъ уже обра-

*) Могли ходить только мелкосидящіе маленькие пароходы безъ баржъ.

зоваться новыя мели для новыхъ работъ. По тѣмъ колоссальнымъ капиталамъ, какіе издержаны правительствомъ за два года, нужно думать, что въ 10 лѣтъ они достигнутъ такихъ размѣровъ, что придется не разъ раскаяться, что связались съ расчисткой русла безводной рѣки Туры, отложивъ постройку желѣзной дороги до Тобольска, которую всеже рано или поздно придется соорудить. Между тѣмъ за время гидротехническихъ работъ, кромѣ расходовъ правительства, пароходовладѣльцы, какъ и въ 1894 году, будутъ терпѣть невозвратимые убытки, хотя теперь уже не въ интересахъ Бѣльского такъ краснорѣчиво говорить о нихъ, какъ дѣлалъ онъ это, обхлощатывая организацію ввѣренныхъ ему работъ.

26. С.



Остяцкая легенда о сотворении мира*).

Не было ни земли ни воды, былъ только одинъ Нумъ-Торумъ (Вышній Богъ). Былъ у Торума хотъ-домъ въ воздухѣ; на разстояніи трехъ аршинъ отъ дверей (оу) лежала доска (согыль), и только по этой доскѣ ходилъ Нумъ-Торумъ, когда онъ выходилъ изъ дома. И ѿль и пиль онъ только медъ (мау) и суръ**. День и ночь онъ бывалъ дома, только два-три раза въ день выходилъ гулять. Когда онъ приходилъ съ прогулки, то садился на мѣсто-перину,—садился и думалъ. Однажды, во время его размышленія, капнула капля сверху на столъ. Капля скатилась со стола, упала на полъ и вышелъ младенецъ-женщина (Еви). Еви***, маленькая дѣвочка, открыла дверь (оу пушмасъ) и вошла въ другую горницу. Когда она одѣлась въ этой комнатѣ въ платье, неизвѣстно откуда полученное, и вышла къ Нуму, то онъ бросился къ ней на шею, поцѣловалъ ее и сказалъ ей: «будемъ съ тобою вѣкъ жить». Долго ли, коротко ли они жили, но у нихъ родился сынъ (пыгъ-похъ). Сынъ росъ очень быстро, потому что такие люди растутъ быстро, и вышелъ однажды на преддверную доску гулять. Отецъ и мать говорили ему: «далеко не ходи, ты можешь съ этой доски упасть». Онъ ихъ успокоилъ, говоря, что не упадетъ. Вдругъ сверху спустилась бумага (нэбэкъ) прямо къ сыну Нума и прильнула къ ладони правой руки. Бумага эта поднялась вмѣстѣ съ нимъ кверху, и онъ пришелъ къ дѣдушкѣ. Тотъ его спросилъ: «Ты пришелъ ко мнѣ?» — «Да, я пришелъ!» — «Какъ поживаешь?» — «Ничего, живу». Дѣдушка спросилъ его: «Что у тебя есть тамъ внизу кромѣ домика, широко ли тамъ или узко?» И онъ отвѣтилъ ему: «Ничего не знаю, широко или узко?» — «А есть ли вода или земля?» — «Ничего не знаю;

*) Записана со словъ остяка Никиты Киндышева и послѣ пропрѣна путемъ перекрестного разспроса у 5 человѣкъ. Несомнѣнно, что въ легенда имѣется значительная часть наноснаго элемента, но многие остяки считаютъ эту легенду народно-остяцкой.

**) Суръ—по-остяцки—пища, по-зырянски—родъ кваса или пива. (А. П. Энгельгардтъ. «Русскій Сѣверъ»)

***) Еви—по-остяцки—женщина. Интересно это совпаденіе остяцкаго названія женщины Еви и библейскаго Ева. А. Ш.

внизъ смотрю: вездѣ широко, не видно ни земли ни воды». Тогда дѣдушка даль ему въ руку земли и ту бумажку, съ которой онъ поднялся кверху, и спустилъ его обратно въ домикъ къ Нуму-Торуму, сказавъ ему на прощанье: «Когда ты спустишься домой, то сбрось съ преддверной доски землю внизъ». Когда онъ спустился, то землю всю высыпалъ внизъ и пришелъ въ домъ, который былъ золотой (сорни). Тогда отецъ и мать спросили его, гдѣ онъ такъ долго ходилъ. Онъ имъ отвѣтилъ, что былъ на улицѣ, на доскѣ, и игралъ. На другой день дѣдушка самъ спустился въ золотой домъ Нумъ-Торума. Его напоили и накормили. Дѣдушка спросилъ у мальчика: «Знаешь ли ты, кто больше: сынъ или отецъ?» Онъ отвѣтилъ ему, что отецъ-богъ выше сына. Отецъ и мать стали спорить, что есть одинъ богъ. Дѣдушка сказалъ имъ: «У васъ ума нѣть, маленький умнѣе васъ». Затѣмъ дѣдушка скрылся. На другой день мальчикъ вышелъ опять на ту же доску, посмотрѣлъ внизъ и увидѣлъ землю, но лѣсу нѣть. Тогда онъ прибѣжалъ къ родителямъ и сказалъ, что увидѣлъ землю и сталъ просить пустить его внизъ. Его посадили въ золотую люльку (зыбку) и спустили на веревкѣ внизъ. Когда онъ, спустясь, правую ногу выставилъ изъ люльки на землю, то нога стала тонуть какъ будто бы въ яишѣ (ось-ляхѣ). Тогда отецъ обратно поднялъ его. Мальчикъ разсказываетъ, что спустился, но земля жидкая. Магъ стала говорить: «Ну, ладно, сынокъ, завтра спустимся вмѣстѣ, сама посмотрю». Назавтра, раненько утромъ, спустились оба въ люлькѣ. Спустились оба внизъ, и вотъ мать, дѣйствительно, увидѣла, что земли нѣтъ, а жидкая пяша (болото). Она сначала стала на ноги, потомъ пришлось нагнуться и уцѣпиться руками. И вотъ стала она тонуть и скоро совсѣмъ скрылась. Мальчикъ остался и заплакалъ. Наконецъ, онъ потянулся за веревку, и отецъ его поднялъ и сталъ спрашивать: «Ночему плачешь и гдѣ мать?» — «Мать», говорить онъ, «утонула въ яишѣ». Отецъ сталъ его утѣшать и сказалъ: «Скоро ли, долго ли, но всѣ все равно умремъ».

Скоро однако мать вышла изъ горницы смѣющаюся и стала говорить сыну: «Зачѣмъ ты плакалъ? Все равно, когда міръ будетъ на землѣ, то дѣти будутъ также оплакивать своихъ родителей. Скоро будутъ деревья и трава на землѣ; потомъ народятся вездѣ люди». На другой день поутру мальчика опять спустили на землю. Онъ вышелъ изъ люльки и побѣжалъ по землѣ: яши не было, земля укрѣпилась (му така исъ). Мальчикъ изъ земли сѣдалъ 2-хъ человѣкъ, мужчину и женщину, и когда онъ на нихъ дунулъ, они стали живыми (лылыгъ-ханэх). Потомъ Богъ создалъ морошку (мурахъ) и бруснику—красную ягоду (урды-рыхъ). И сказалъ Нумъ-Торумъ людямъ: «Вотъ вамъ мурахъ и урды-рыхъ,—морошка и красная ягода,—питайтесь ими». Потомъ онъ имъ сказалъ: «Когда я уйду отъ васъ, то придетъ куль (чертъ) и

будетъ васъ соблазнять (хусь-лэ). Вы ему не върьте, покамѣсть я не приду самъ; когда приду самъ, то скажу иначе». Когда онъ пошевелилъ веревкой, его подняли кверху. Тогда куль пришелъ къ вновь сдѣланнымъ людямъ и сталъ спрашивать: «Что? Торумъ повелѣлъ вамъ ъсть морошку и красную ягоду?» И онъ далъ имъ горсть черемухи (люмъ) и сказалъ: «Вы ъдите морошку и красную ягоду—отъ нея сытности нѣть; а вотъ если съѣсть эту горсть черемухи, то навсегда будешь сытъ». Они не думали ъсть, но куль уговорилъ ихъ. Они съѣли, и почувствовали, что сыты. Куль скрылся (манэсь). Они продолжали ъсть черемуху. Когда Торумъ пришелъ на землю и сталъ спрашивать, что они ъдятъ, они показали. Потомъ онъ опять сталъ показывать, что нужно ъсть. «Зачѣмъ вы послушались куля: онъ соблазнилъ васъ!» Когда Торумъ пошевелилъ ихъ рукой, они упали въ разныя стороны мертвые (халсъ). Когда потомъ Торумъ дунулъ опять на нихъ, они опять ожили. Потомъ онъ имъ сказалъ: «Я васъ оживилъ, смотрите—придетъ опять куль, будетъ васъ соблазнять,—вы его не слушайте; ъшьте мурахъ и урды-рыхъ, которыя я повелѣлъ вамъ ъсть раньше». Затѣмъ онъ создалъ зайца и сказалъ имъ: «Этого можно ъсть». Затѣмъ позволилъ имъ ъсть и малину (урмыль). «Смотрите», сказалъ онъ имъ на прощанье: «не давайте себя соблазнять кулю; вѣдь вы уже были мертвые; върьте, это — потому, что дали себя соблазнить дьяволу. Теперь я васъ оставлю еще здѣсь, и если куль будетъ васъ соблазнять, не слушайте его словъ, пока я не приду». И показалъ онъ имъ 3 дерева: сосну (унжи), лиственницу (нанкъ) и березу (халь-сумыть). Послѣ ухода Торума явился куль и сталъ говорить: «Зачѣмъ вамъ ъсть эту малину? что въ ней сытнаго? А вотъ есть кедръ (ногырь-юхъ), высокое дерево, на немъ шишки (ногырь); возьмите эту шишку, и будетъ у васъ полная горсть орѣховъ, и вы будете сыты». Когда они съѣли эту шишку, то увидѣли, что они нагіе, и стали другъ друга стыдиться и потомъ соблазнились другъ другомъ и согрѣшили. Послѣ этого они спрятались въ траву (торнъ). Когда пришелъ Торумъ и сталъ ихъ звать, они стали откликаться чуть слышно. «Почему вы спрятались?» спросилъ онъ ихъ. Когда онъ подошелъ къ нимъ, они оба сидѣли на землѣ и встать на ноги не могли. И сказалъ имъ Торумъ: «Вотъ я создалъ оленей (ули), овечекъ (ошъ), зайцевъ (шоуръ), коровъ (миссъ) и лошадей (лоу); когда будете ихъ употреблять, то кожей ихъ будете одѣваться. Когда я говорилъ вамъ, что нужно ъсть, вы не исполнили, теперь оставайтесь на землѣ».

Не оставилъ Торумъ имъ ни огня (тутъ) ни котла (путь), оставилъ только на сыромъ мясѣ (нэръ-нѣогы) и самъ ушелъ вверхъ, на небо. Спустя нѣкоторое время Торумъ посмотрѣлъ съ неба внизъ и увидѣлъ неисчислимое количество людей на землѣ, и столько стало людей,

что стало тесно и они стали воевать другъ съ другомъ.

«Что выйдетъ изъ этого?» подумалъ Торумъ: «надо дать имъ зиму, чтобы они мерзли». И народъ сталъ мерзнуть и умирать отъ мороза. Потомъ Торумъ сталъ размышлять, отчего осталось такъ мало народу да и оставшися—какие-то полуживые». И онъ опять спустился на землю. Ходилъ по землѣ и думалъ, и увидѣлъ камень (кевъ) и приложилъ руку къ этому камню, и пошелъ жаръ отъ этого камня. Возлъ этого камня лежалъ маленький камень. Когда онъ взялъ этотъ маленький камень и ударилъ о большой, то большой разсыпался и потомъ изъ него вышла женщина-огонь. Отъ камня пошла дорога (юшъ), неизвѣстно куда ведшая, но страшно широкая. Тогда еще изъ камня образовалась нецѣлая лодка (хопъ): то ли носъ, то ли корма ся—неизвѣстно. Взялъ Торумъ опять камешки и сталъ другъ о друга ударять,—и показался огонь. Тогда Торумъ сдѣлалъ изъ березовой коры трутъ (пигтъ), изрубилъ лѣсину, накололъ дровъ и развелъ огня. Когда онъ разложилъ огонь, то собралъ народъ и сталъ отогревать у этого огня. Потомъ сталъ онъ думать о томъ, что нельзя людямъ жить безъ варева (горячей пищи), и сдѣлалъ котель (изъ желѣза ли, изъ камня ли—неизвѣстно). И онъ принесъ въ этотъ котель воды, повѣсила котель на палки, убилъ скотину (то ли корову, то ли овцу—неизвѣстно), и когда все сварилось, Торумъ самъ сѣлъ, закусилъ—и ему показалась пища вкусной. Накормилъ онъ остальныхъ, оставшихся въ живыхъ, сказавъ имъ: «Вотъ я вамъ показаль примѣръ, какъ вамъ варить; вотъ огонь, вотъ вода; какъ я дѣлалъ, такъ дѣлайте и вы. Если будете зябнуть, разложите огонь—отогрѣетесь. Что добудете и что гдѣ достанете—вотъ такъ варите и пеките; и питайтесь той пищей, которую я вамъ послѣдовательствовалъ». Потомъ онъ имъ показалъ, какъ добывать птицу перѣвѣсами, рыбу—гимгами (пунъ), какъ неводить, какъ колыданить, и всякие промыслы. Затѣмъ сказалъ народу: «Больше я не приду къ вамъ; такъ и живите».

Когда Торумъ поднялся вверхъ, то спустя нѣкоторое время сталъ опять смотрѣть внизъ на землю и видѣть, что опять народъ размножился. Всѣ трудятся. И сталъ думать: «Вотъ сколько расплодилось народу: соблазнилъ ихъ дьяволъ». Сталъ Торумъ звать куля къ себѣ и сталъ говорить: «Ты безъ моего позволенія никого не тронь, не соблазняй, пока не скажу. Когда скажу, укажу на стараго или молодого, того и возьмешь. Половину народа ты возьмешь, а половина останется мнѣ».

А. Штернбергъ.



ПОЧВЫ ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ.

Въ предыдущихъ выпускахъ «Ежегодника» Тобольского Музея помѣщались извѣстія о моихъ изслѣдованіяхъ въ южныхъ округахъ Тобольской губ. въ 1895 и 1896 гг. Съ тѣхъ порь мнѣ удалось сдѣлать еще одну экскурсію по линіи Самарово—Тобольскъ—Петропавловскъ, во время которой былъ собранъ небольшой материалъ по почвамъ и растительности болѣе сѣверныхъ районовъ губерніи.

Нѣкоторые почвенные образцы, собранные при первыхъ двухъ экскурсіяхъ, были подвергнуты химическому анализу частью г. Шешуковы мъ, частью аналитиками Лабораторіи министерства земледѣлія, такъ что въ настоящее время накопилось уже довольно много разнообразныхъ данныхъ для сужденія о характерѣ почвъ южныхъ уѣздовъ Тобольской губ. Кроме того, я сдѣлалъ нѣсколько опредѣленій общаго количества растворимыхъ въ ведѣ веществъ, а также хлора¹⁾ въ воздушно-сухихъ почвахъ и подпочвахъ. Хотя мои опредѣленія и не могутъ претендовать на ту степень точности, которая достигается при работѣ по общепринятому методу, однако они даютъ величины сравнимыя, а потому я приведу ихъ въ списокъ почвъ.

Изслѣдованія въ Тобольской губ. стоять въ связи съ другими моими изслѣдованіями въ Западной Сибири. Результаты ихъ излагаются въ моей работѣ «Матеріалы для познанія почвъ и растительности Западной Сибири», въ которой почвамъ Тобольской губ. отведена особая глава. Въ виду мѣстнаго интереса этой главы, я рѣшаюсь напечатать

¹⁾ Для этихъ опредѣленій 25—50 г. почвы, измельченной и отсеянной черезъ сито съ отверстіями въ 1 мм, сильно взбалтывалось съ 100—250 кб. с. воды; черезъ 1—2 дня отфильтровывалось 25—100 кб. с. экстракта, и хлоръ опредѣлялся титрованіемъ по способу Фольгарда. Въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ для данной почвы имѣлись опредѣленія хлора, сдѣланныя другими аналитиками, въ списокъ почвъ я ограничиваюсь приведеніемъ своихъ чиселъ, ибо только они сравнимы между собою. Въ двухъ случаяхъ такого совпаденія анализовъ (№ 551 и 571) я получилъ величины меньшія, чѣмъ Лабораторія м. з., на 14—19%. Если допустить, что при такихъ упрощенныхъ опредѣленіяхъ ошибка обыкновенно не меньше 20%, то всетаки опредѣленія количествъ хлора больше 0,01 будутъ довольно близки къ дѣйствительности и годятся для нѣкоторыхъ заключеній.

её, съ нѣкоторыми сокращеніями, и въ «Ежегодникѣ» Тобольского Музея.

Не могу не выразить здѣсь моей глубокой признательности за со-
дѣйствіе моимъ изслѣдованіямъ тобольскимъ губернаторамъ Н. М. Бого-
дановичу и Л. М. Князеву, а также губернскому агроному Н. Л.
Скалозубову, который и самъ сдѣлалъ не мало для изученія естествен-
но-историческихъ условій края.

А. Списокъ почвъ Тобольской губерніи.

Въ настоящій списокъ вошли только тѣ разрѣзы, образцы кото-
рыхъ собраны и находятся въ коллекціи; значительное число разрѣзовъ,
отъ которыхъ образцы не собирались, не описываются, чтобы не увели-
чить объемъ списка. Главная масса образцовъ собрана при моихъ экс-
курсіяхъ 1895 и 1896 гг. мной и В. Р. Заленскимъ, помогавшимъ
мнѣ при изслѣдованіяхъ 1896 года. Нѣсколько образцовъ было взято по
моей просьбѣ въ 1898 г. Н. Л. Скалозубовымъ и Г. Я. Назаро-
вымъ.

Имѣющійся материалъ описывается не въ томъ порядкѣ, какъ онъ
собирался, а по группамъ почвъ, при чёмъ передъ детальнымъ описа-
ніемъ представителей каждой группы помѣщена общая ея характеристика
на основаніи наблюдений въ полѣ. Гдѣ это возможно, перечисленіе
представителей данной группы начинается съ почвъ Курганскаго уѣзда
и оканчивается почвами Покровской волости, Тюкалинск. у. Въ нѣкоторыхъ
случаихъ пришлось дѣлать отступлениія отъ этого общаго порядка, по-
тому что въ данной коллекціи, какъ, впрочемъ, и во всякой другой сколь-
ко-ниб. значительной, находятся образцы съ веяно выраженными при-
знаками того или другого сорта почвъ; такие образцы, относимые къ
данной группѣ лишь условно, перечисляются послѣ типичныхъ ея пред-
ставителей.—При каждомъ образцѣ, собранномъ не мною лично, фами-
лія коллектора обозначена въ концѣ описанія начальной буквой его фа-
миліи.

ЧЕРНОЗЕМНЫЯ ПОЧВЫ.

По ихъ распространенности въ южной части Тобольской губ. и
важной роли въ культурѣ различныхъ сельскохозяйственныхъ растеній,
черноземы въ описаніи почвъ должны быть поставлены на первое мѣсто.
Обыкновенно почвы эти не образуютъ значительныхъ сплошныхъ
площадей, ибо пріурочены къ вытянутымъ съ ЮЗ на СВ уваленнымъ
грядамъ, большую частью довольно узкимъ; между этими грядами раз-
виваются почвы другихъ типовъ. Рѣже, и именно въ южныхъ полови-
нахъ уѣздовъ Курганскаго, Ишимскаго и Тюкалинскаго, черноземы по-

крываютъ болѣе значительные участки ровной степи, какъ, напр., на Сорочьей степи въ Курганскомъ у. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ, уровень почвенныхъ водъ не бываетъ повышеннымъ, и буровыя скважины въ $1\frac{1}{2}$ —2 саж. глубиной не встрѣчаютъ еще значительной влажности въ материнскихъ породахъ; наоборотъ, при такомъ буреніи на различныхъ степныхъ участкахъ въ іюнь и іюль подпочва съ глубины около сажени представляется болѣе сухой, чѣмъ въ верхнихъ горизонтахъ. По свѣдѣніямъ, полученнымъ отъ мѣстныхъ жителей, снѣгъ даже съ ровныхъ степей сходитъ рано, старая трава быстро высыхаетъ и подвергается выжиганію, въ пониженныхъ же участкахъ территоріи вешняя вода, наоборотъ, застаивается долго, почему, будто бы, въ Сладковской волости и подобныхъ ей мѣстностяхъ, нельзя весной выжечь «камыши», въ которыхъ отрождается несмѣтное количество «гнуса», разносящаго лѣтомъ сибирскую язву. Послѣ сильныхъ ливней поверхность ровныхъ черноземныхъ участковъ иногда покрывается слоемъ воды, не успѣвающей быстро стечь или испариться; но уже черезъ какія-нибудь сутки даже и въ пониженіяхъ черноземного рельефа лишь сырой поверхностный горизонтъ почвы свидѣтельствуетъ о прошедшемъ ливнѣ: подпочва оказывается суще почвенного слоя.

Приведенные факты свидѣтельствуютъ о томъ, что тобольские черноземы, какъ увалльные, такъ и залегающіе на ровныхъ возвышенныхъ степныхъ участкахъ, по условіямъ водоснабженія не отличаются отъ черноземовъ Европейской Россіи; понятно, поэтому, что и на сибирскихъ черноземахъ нѣть условій для развитія хотя бы и единичныхъ представителей болотной растительности: почвы эти въ нетронутыхъ или мало измѣненныхъ культурой участкахъ покрыты либо степною растительностью типичнаго *habitus'a* и состава (съ преобладаніемъ злаковъ—*Festuca sulcata*, *Koeleria cristata*, различныхъ видовъ *Stipa* и *Avena desertorum*), либо березовыми лѣсами. Типичные степные участки на сибирскомъ черноземѣ развиваются лишь южнѣе сѣверной его границы и по мѣрѣ движенія къ югу становятся все чаще; черноземы же близъ сѣверной границы черноземной области отчасти и теперь покрыты березняками, отчасти же растительностью неопределеннаго характера, въ которой принимаютъ участіе и степные формы и многіе вульгарные виды, на типичныхъ черноземныхъ степяхъ не достигающіе массового развитія. Эта растительность, то болѣе, то менѣе степная, надо думать, всегда представляетъ явленіе вторичное, развиваясь на черноземахъ (а равно и другихъ почвахъ въ черноземной области), на которыхъ лѣсъ былъ уничтоженъ человѣкомъ. Любопытно, что и горизонтъ вскипанія подъ такою нетипичною растительностью является пониженнымъ, какъ и подъ березовымъ лѣсомъ. Черноземы, покрытые типичной степной растительностью, можно для краткости назвать «степными», а черноземы подъ

березняками — «лѣсными», не имѣя при этомъ въ виду ихъ генезиса. «Лѣсные» черноземы вдаются далеко на югъ и констатированы еще неоднократно близъ южной границы Тобольской губерніи; рѣшительно преобладаютъ надъ ними «степные» черноземы лишь за предѣлами этой губерніи, въ сѣверной части Акмолинской области.

Сравнительно рѣдко черноземы въ видѣ сколько-нибудь значительныхъ по размѣрамъ пятенъ появляются въ пониженныхъ участкахъ мѣстности; но эти пониженія всегда имѣютъ выходъ къ еще болѣе пониженнымъ пунктамъ, занятымъ солонцами или подзолами (таковъ, напр., черноземъ Мартиной, № 523, расположенный надъ «зарѣзомъ» озера Каменаго, черноземъ около оз. Курчинскаго, № 489 и др.); въ такихъ случаяхъ черноземы, говоря вообще, становятся въ условія болѣе богатого водоснабженія и дѣлаются солонцеватыми. Въ огромномъ большинствѣ случаевъ, однако, скопленіе солей хлористыхъ да, вѣроятно, и всякихъ другихъ, происходитъ не въ поверхностномъ горизонте, а въ подпочвѣ (Обогащеніе солями именно горизонта А констатировано лишь въ одномъ изъ солонцеватыхъ черноземовъ с. Введенскаго, расположенному въ нижней части сравнительно крутого увала. См. описание № 603). Но и при этихъ условіяхъ на черноземахъ не удавалось констатировать формъ болотныхъ: на черноземахъ солонцеватыхъ въ такихъ случаяхъ или появляются посреди степныхъ растеній нѣкоторыя солонцеватыя формы, какъ, напр., *Statice Gmelini*, *Artemisia maritima* и *rupestris*, или даже и онѣ отсутствуютъ, и лишь нѣкоторые обычные степные виды, а именно *Galatella punctata* var. *discoidea* и *Artemisia pontica*, развиваются въ гораздо большемъ количествѣ экземпляровъ, чѣмъ на черноземѣ несолонцеватомъ.

Солонцеватыя разности черноземовъ обыкновенно отличаются отъ несолонцеватыхъ болѣе или менѣе выраженной столбчатой структурой переходнаго къ подпочвѣ горизонта, каковой признакъ сближаетъ ихъ со структурными солонцами. И въ полѣ, где происходитъ постепенная смена въ пространствѣ обычного чернозема солонцеватымъ и этого послѣдняго структурнымъ солонцомъ, можно бываетъ выбратьъ такие образцы, которые и по структурѣ и по растительности, да вѣроятно и по химическому характеру, будутъ занимать среднее положеніе; поэтому можно говорить, что обычные черноземы связаны со структурными солонцами рядомъ постепенныхъ переходовъ. Отсюда однако не слѣдуетъ заключать, что черноземы въ Тобольской губ. образовались въ прежнее время или будутъ образовываться и дальше изъ структурныхъ солонцовъ путемъ постепенного обѣдиненія ихъ растворимыми солями, измѣненія структуры и т. д. Для доказательства такого происхожденія сибирскихъ черноземовъ нѣть въ настоящее время никакихъ серьезныхъ фактовъ, упомянутое же существованіе переходныхъ образованій въ природѣ мо-

жетъ быть съ неменшими правомъ сочтено за доказательство происходженія структурныхъ солонцовъ изъ черноземовъ.

Образованій, промежуточныхъ между черноземами и солонцами безструктурными, а равно и темноцвѣтными болотными почвами несолонцеватаго характера, мнѣ наблюдать не удалось, а потому я не рѣшаюсь примкнуть къ не разъ уже высказанному воззрѣнію о болотномъ происходженіи хотя бы только нѣкоторыхъ сибирскихъ черноземовъ. Да и a priori такой генезисъ представляется весьма мало вѣроятнымъ. Во 1-хъ, черноземы пріурочены къ опредѣленнымъ подпочвамъ, преимущественно же — къ лессовиднымъ суглинкамъ; если бы, слѣдовательно, черноземы образовались при условіяхъ заболачиванія, то нужно было бы допустить весьма глубокое измѣненіе въ характерѣ ихъ материнской породы въ позднѣйшее время, ибо теперь эта порода болѣе или менѣе приближается къ лессу, т. е. представляется въ сильной степени водопроницаемой. Во 2-хъ, нужно было бы доказать, что существуютъ болотные почвы, въ которыхъ не совершаются процессовъ разрушенія наименѣе стойкихъ силикатовъ материнской породы — цеолитовъ, ибо лишь при этомъ условіи было бы возможно образование черноземовъ, столь богатыхъ именно цеолитами. Правда, болотные почвы совершенно еще не изучены, но все то, что до сего времени известно о почвахъ, испытывающихъ хотя бы временный застой воды (подзолы, солонцы), заставляетъ предполагать, что при заболачиваніи могутъ образоваться лишь почвы, сравнительно бѣдныя цеолитами. При превращеніи такихъ почвъ въ черноземъ содержание въ нихъ цеолитовъ могло бы увеличиться, конечно, на счетъ дотолѣ нетронутыхъ процессомъ вывѣтриванія безводныхъ силикатовъ, но въ этомъ случаѣ черноземы должны бы сдѣлаться бѣдныя силикатнымъ пескомъ, нежели почвы, послужившія матеріаломъ для ихъ образования. Въ дальнѣйшемъ изложениіи мы увидимъ, однако, что минеральная основа тобольскихъ черноземовъ содержитъ силикатнаго песка не менѣе, чѣмъ таковая же основа анализированныхъ солонцовъ и подзола.

Я потому принужденъ былъ остановиться на этомъ, что и до сихъ поръ въ литературѣ встрѣчаются показанія о «сухопутно-болотномъ» происходженіи нѣкоторыхъ сибирскихъ черноземовъ, при чёмъ для подтвержденія такого генезиса соотвѣтственныхъ почвъ авторы ссылаются то на «кислый гумусъ», то на «корневища болотныхъ травъ», которые удается находить въ подпочвѣ сибирскихъ черноземовъ. Родоначальникъ такихъ мнѣній, кажется, слѣдуетъ считать г. Аленецына, который специально почвами не занимался, но тѣмъ не менѣе высказался о почвенныхъ условіяхъ района, въ которомъ производилъ изслѣдованія. Хотя онъ и допустилъ здѣсь существование «настоящаго чернозема», тѣмъ не менѣе, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, по его словамъ, «нѣть возможности найти разницу между сухою равниною, болотной грязью на берегу озера

и почвою на днѣ его, подлѣ берега». При такихъ условіяхъ, когда, очевидно, лишь темная окраска почвы является единственнымъ познавательнымъ признакомъ, не мудрено найти «корневища болотныхъ травъ» и въ «черноземахъ». Въ началѣ моихъ экскурсій въ Тобольской губ. и я стремился найти такія корневища, хотя бы въ подпочвѣ черноземовъ; долженъ признаться, однако, что это мнѣ не удалось даже относительно черноземовъ солонцеватыхъ. Я неоднократно находилъ корневища камыша въ подпочвахъ темноцвѣтныхъ безструктурныхъ солончаковъ (въ одномъ случаѣ и подъ структурнымъ солончакомъ № 534), но относительно характера такихъ почвъ, несмотря на интенсивную ихъ окраску, у меня ни разу не возникало сомнѣнія.

Средняя мощность тобольскихъ черноземовъ—около 21—22 дюймовъ, откуда слѣдуетъ, что они вообще тоньше лучшихъ черноземовъ Европейской Россіи. Лишь въ немногихъ случаяхъ была отмѣчена максимальная мощность до 30", затѣмъ, образцовъ меньше 20" толщиной въ коллекціи имѣется довольно много, при чёмъ къ черноземамъ отнесены и почвы съ ковыльныхъ степей юга Покровской вол., Тюкалинск. у., несмотря на небольшую ихъ мощность (дюймовъ 14) и явственный каштановый оттѣнокъ, ибо почвы эти оказались довольно богатыми гумусомъ (6—7%). Надлежитъ отмѣтить еще, что опредѣленіе общей мощности почвенного слоя въ тобольскихъ черноземахъ, особенно степныхъ, всегда болѣе или менѣе условно, потому что сплошная перегнойная окраска прекращается уже недалеко отъ поверхности, а въ переходномъ горизонтѣ партии, окрашенныя перегноемъ, чередуются неправильно съ вдающимися кверху партиями мало измѣненной подпочвы и проникаютъ внизъ на неодинаковую глубину; поэтому въ одной и той же ямѣ нерѣдко можно было сдѣлать два опредѣленія мощности, разнящіяся другъ отъ друга на 2 и больше дюймовъ. Горизонты коренной породы, прилегающіе къ почвѣ, содержатъ еще тонкіе перегнойные затеки; лишь съ 40—45" отъ поверхности начинается уже чистая коренная порода.

Можно упомянуть еще, что кротовины подъ тобольскими черноземами вообще нерѣдки, что и неудивительно, если принять въ расчетъ значительное количество роющихъ животныхъ: сусликовъ, тушканчиковъ и слѣпышей, изъ которыхъ, напр., тушканчиковъ я видѣлъ еще на сѣверной границѣ тобольского чернозема, въ Ишимскомъ у. Сурковъ и сурчинъ здѣсь вовсе не встрѣчено: область ихъ распространенія начинается лишь съ Кокчетавскаго уѣзда. Во многихъ мѣстахъ черноземной области Тобольской губерніи встречаются, обыкновенно группами, курганы, столь характерные и для чернозема Европейской Россіи.

Большая часть тобольскихъ черноземовъ образовалась на желтобурыхъ лессовидныхъ суглинякахъ, наиболѣе распространенной породѣ среди поверхностныхъ геологическихъ образованій всего района. Суглинки эти

имѣютъ то болѣе, то менѣе явственный желтый оттѣнокъ; въ горизонтѣ, непосредственно прилегающемъ къ почвѣ, особенно у черноземовъ лѣсныхъ, а также у суглинковъ и подзоловъ, этотъ оттѣнокъ мало замѣтенъ и становится все явственнѣе по мѣрѣ углубленія; вмѣстѣ съ тѣмъ увеличивается въ породѣ и содержаніе углекислой извести, которая, наконецъ, появляется въ видѣ выдѣленій по тонкимъ трубчатымъ ходамъ, пронизывающимъ материнскую породу; еще глубже залегаетъ горизонтъ, весьма богатый углекислой известию, которая распределена болѣе или менѣе равномѣрно въ толщѣ породы, отчего этотъ горизонтъ получаетъ равномѣрную блѣдовато-желтую окраску; крупныя известковыя конкреціи здѣсь рѣдки. Въ подпочвѣ черноземовъ типичныхъ степей желтый оттѣнокъ лессовидного суглинка и скопленія въ немъ углекислой извести представляютъ явленіе обычное уже для горизонта материнской породы, непосредственно прилегающаго къ почвѣ. Кромѣ углекислой извести, въ болѣе или менѣе глубокихъ горизонтахъ лессовидныхъ суглинковъ встречаются иногда гипсовые кристаллики, а также и хлористыя соли; въ водной вытяжкѣ изъ верхнихъ горизонтовъ подпочвы типичныхъ степей мнѣ нѣсколько разъ удавалось убѣждаться въ присутствіи замѣтныхъ количествъ хлористыхъ и сѣрнокислыхъ солей.

Какъ видно изъ предыдущаго, лессовидные суглинки обладаютъ трубчато-пористой структурой: толща ихъ проникнута сѣтью узкихъ трубчатыхъ ходовъ, то открытыхъ, то выполненныхъ углекислой изестью. Замѣчено уже г. Высоцкимъ, что въ горизонтѣ, непосредственно прилегающемъ къ почвѣ, трубчато-пористое строеніе является болѣе или менѣе нарушеннымъ.¹⁾ Въ естественныхъ разрѣзахъ лессовидные суглинки проявляютъ столбчатую отдѣльность, а поверхностные ихъ горизонты, обѣдненные углекислой изестью, имѣютъ орѣховатое строеніе. Наибольшей мощности достигаютъ эти породы, по даннымъ г. Высоцкаго, на склонахъ рѣчныхъ долинъ (1—3 саж.), въ межdurѣчныхъ же пространствахъ мощность ихъ значительно меньше 0,5—1,0 саж.; они подстилаются слоистыми суглинками и песками, тоже постепенно вѣтраста, которые залегаютъ уже на болѣе древнихъ (третичныхъ) породахъ.

Лессовидные суглинки являются то болѣе, то менѣе супесчаными; наиболѣе супесчаныя ихъ разности пріурочены главнымъ образомъ къ западной части изученного района, гдѣ (напр., въ разрѣзахъ по Тоболу, ниже Чернавскаго) эти породы имѣютъ мѣстами характеръ настоящихъ супесей, при чёмъ въ нихъ сохраняется и столбчатая отдѣльность и трубчато-пористая структура; въ западной же половинѣ района (напр., около Введенскаго и Старосидоровой) въ лессовидныхъ суглинкахъ кос-

¹⁾ Высоцкій. Геолог. изсл. въ черноз. полосѣ Зап. Сиб. (Г. Ж. 94 г.) и очеркъ третичныхъ и послѣтрет. образов. З. Сиб.

гдѣ попадаются и окатанныя кремнистая галька въ небольшомъ количествѣ. Къ востоку отъ р. Ишима супесчаныя разности лессовидныхъ суглинковъ встрѣчаются лишь въ видѣ исключенія.

Къ сожалѣнію, я не располагаю для лессовидныхъ суглинковъ полными анализами, которые могли бы вполнѣ выяснить отношенія, существующія между ними и черноземами; тѣмъ не менѣе, имѣется нѣкоторый материалъ для сужденія о связи между черноземомъ и лессовидными суглинками. Такъ, напр., имѣются аналитическія давныя о валовомъ составѣ почвы и подпочвы одного изъ степныхъ черноземовъ Покровской волости (Оконишниково, № 569); изъ этихъ данныхъ усматривается большая близость состава минеральной части почвы и подпочвы данного чернозема, какъ видно изъ слѣдующей таблицы:

Таблица 1.

Черноземъ № 569.	Минер. веществъ	CO ₂	P ₂ O ₅	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	K ₂ O	Na ₂ O
Горизонтъ А .	89,3	0,023	0,148	64,3	13,6	4,7	1,5	1,8	1,8	1,6
Горизонтъ С .	94,1	3,72	0,150	61,1	12,7	4,8	6,5	2,4	1,5	1,3

При такомъ сопоставленіи мы видимъ, что подпочва богаче почвы главнымъ образомъ содержаніемъ углекислоты и извести; принимая въ расчетъ, что эти два окисла образуютъ въ подпочвѣ и почвѣ углекислую известь, и вычисляя содержаніе всѣхъ прочихъ окисловъ въ 100 единицахъ минеральной основы обоихъ горизонтовъ, получимъ слѣдующее сопоставленіе:

Таблица 2.

Въ 100 ч. минеральн. основы.	CaCO ₃	P ₂ O ₅	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	K ₂ O	Na ₂ O
Горизонта А	0,05	0,166	71,9	15,2	5,3	1,6	2,0	2,0	1,8
Горизонта С	9,0	0,159	64,9	13,5	5,1	1,9	2,5	1,6	1,4

Отсюда можно видѣть, что подпочва значительно богаче почвы лишь углекислой известью, что не могло не отзываться на уменьшениі процентнаго содержанія въ ней нѣкоторыхъ веществъ, а именно SiO₂ и Al₂O₃; а потому нужно признать валовой составъ минеральной части почвы данного чернозема по содержанію всѣхъ прочихъ окисловъ весьма близкимъ къ составу подпочвы; едва ли будетъ большой натяжкой

утверждать, что данный черноземъ по минеральному составу представляетъ лессовидный суглинокъ съ прибавкой органическихъ веществъ, но безъ углекислого кальція.

Кромъ того, я располагаю еще двумя анализами черноземовъ и подстилающихъ ихъ лессовидныхъ суглинковъ, которые даютъ возможность сравнить почвы и подпочвы по отношенію къ двумъ вытяжкамъ —солянокислой (10% HCl) и сѣрнокислой. Оба анализа относятся къ черноземамъ Покровской волости и одинъ изъ нихъ—къ «степному» чернозему № 577, а другой—къ «лѣсному» № 595. Если принять въ расчетъ лишь валовое количество веществъ, растворимыхъ въ 10% HCl, а также количество металлическихъ окисловъ, извлекаемыхъ сѣрною кислотою, то получимъ слѣдующее сопоставленіе:

Таблица 3.

	Минеральн. веществъ.	Въ 10% HCl переходитъ	Въ H ₂ SO ₄ раствор.
№ 577, степной черноз., гориз. А	84,3	20,7	14,8
— С	87,1	26,5	18,6
№ 595, лѣсной черноз., гориз. А	80	20,5	11,8
— гориз. С	86,7	27,0	18,8

Отсюда можно было бы заключить, что въ подпочвѣ и степныхъ и лѣсныхъ черноземахъ содержится, напр., цеолитныхъ соединеній больше, чѣмъ въ почвѣ; однако, лишь подпочва степного чернозема оказалась вскипающей съ кислотами и CO₂ въ ней опредѣлено 3,52%; допуская, что вся углекислота соединена въ данномъ случаѣ съ известью, необходимо для сравнимости вычесть изъ соотвѣтственныхъ чиселъ эквивалентъ CaO=4,1. Выразивъ послѣ этого цеолитную часть и основанія, извлекаемыя сѣрной кислотой, въ процентахъ ко всему содержанію минеральныхъ веществъ, получимъ слѣдующую таблицу:

Таблица 4.

	Минер. ве- ществъ.	Изъ нихъ це- олитовъ.	Въ H ₂ SO ₄ растворимо.
№ 577, степной черноз., гориз. А	100	24,5	17,5
— гориз. С	100	25,7	16,6
№ 595, лѣсной черноз., гориз. А	100	25,6	14,7
— гориз. С	100	31,1	31,7

Такимъ образомъ, изъ одинаковыхъ количествъ минеральной основы почвы и подпочвы чернозема степного извлекаются кислотами ко-

личества веществъ, которыя слѣдуетъ призвать равными; для лѣсного чернозема этого равенства не существуетъ: подпочва здѣсь оказывается богаче почвы и цеолитами и окислами, извлекаемыми сѣрной кислотой. Это отношеніе едва ли можно считать случайнымъ; о вѣроятномъ его значеніи будетъ сказано въ другомъ мѣстѣ.

Рѣже черноземы подстилаются не лессовидными суглинками, а пластичными глинами, отложенными, по мнѣнію г. Высоцкаго, въ міоценовомъ бассейнѣ Западной Сибири¹⁾; глины эти имѣютъ сѣрий или буроватосѣрий цвѣтъ, а въ подпочвенномъ горизонѣ нерѣдко являются пестрыми. Онѣ обладаютъ очень высокой связностью и, высыхая, становятся чрезвычайно твердыми. Въ нѣсколькихъ образцахъ ихъ хлористыя соли оказались содержащимися въ ничтожныхъ количествахъ, по крайней мѣрѣ въ подпочвенномъ горизонѣ; на Сорочьей степи содержаніе хлора лишь на глубинѣ 7 футовъ возросло до 0,013%. Зато глины эти весьма богаты углекислой известью, распредѣляющейся въ верхнихъ горизонтахъ равномерно; часты однако и известковые конкреціи, обломки которыхъ встрѣчаются нерѣдко уже въ почвѣ: при буреніи на Сорочьей степи встрѣтилось три тонкихъ пропластка такихъ конкрецій на глубинѣ отъ 60 до 110 дюймовъ.

Въ качествѣ поверхностныхъ образованій эти глины появляются мѣстами главнымъ образомъ къ западу отъ р. Ишими и въ Тобольской губ. не встрѣчены сѣвернѣ параллели Бердюжьей Ишимского уѣзда. Ровные степные участки въ этомъ районѣ имѣютъ въ подпочвѣ по преимуществу сѣрия пластическая глина, при чемъ иногда можно видѣть, что эти глины уходятъ подъ грави, сложенные изъ лессовидныхъ суглинковъ (напр. около с. Лопатинскаго и на Сорочьей степи).

Къ сожалѣнію, я не располагаю анализомъ валового состава этихъ глинъ; нѣкоторое представленіе о соотношеніяхъ между ними и образовавшимися изъ нихъ черноземомъ можетъ быть получено лишь изъ разсмотрѣнія данныхъ анализа вытяжки десятипроцентной соляной кислотой степного чернозема № 485.

Таблица 5.

	Въ HCl растворимо.								
	Всего.	CO ₂	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	K ₂ O	Na ₂ O
№ 485, горизонтъ А .	38,1	0,05	20,36	8,9	4,8	1,5	1,5	0,7	0,2
— горизонтъ С .	51,6	9,6	16,6	7,1	4,0	12,4	1,6	0,6	0,3

1) Высоцкій. Геолог. изсл. по линіи Сиб. ж. д. (Горн. Журн. 1894 г., т. 2, вып. 5; стр. 78—79).

Отсюда ясно, что подпочва значительно богаче образовавшагося на ней почвенного слоя лишь содержанием углесолей, преимущественно СаСО₃; собственно же цеолитами почвенный слой богаче подпочвы (38,0 и 29,6%) ; если вычислить количество цеолитов въ процентахъ всей минеральной основы, то получится, что въ 100 ч. минеральной основы почвы содержится около 43,5, а подпочвы—только около 32% цеолитовъ, откуда слѣдуетъ, что почвенный слой значительно богаче подпочвы соединеніями, важными въ дѣлѣ питанія растеній.

Характеръ подпочвы оказываетъ большое вліяніе на консистенцію чернозема: даже наиболѣе глинистые изъ черноземовъ на лессовидныхъ суглинкахъ оказываются съ поверхности болѣе или менѣе разсыпчатыми и вообще мало связаны по сравненію съ черноземами, образовавшимися на третичныхъ глинахъ. Поэтому тобольские черноземы могутъ быть подраздѣлены на двѣ группы: черноземы глинистые, каковой эпитетъ долженъ быть сохраненъ за черноземами на третичныхъ глинахъ, и черноземы лесовые, съ подпочвой изъ лессовидныхъ породъ.

α) Глинистые черноземы

затекаютъ на ровныхъ степныхъ участкахъ и, какъ кажется, на неодинаковыхъ уровняхъ въ недалекихъ другъ отъ друга пунктахъ: такъ, напр., участокъ глинистаго чернозема между озерами Лопатинскимъ и Долматовскимъ расположены, повидимому, на болѣе низкомъ уровнѣ сравнительно съ сѣвернымъ концомъ Сорочьей степи, начинающейся въ нѣсколькихъ верстахъ къ югу.

Наиболѣе выдающейся особенностью этихъ почвъ является весьма значительная связность въ горизонтальномъ направленіи, зависящая, несомнѣнно, отъ большого содержанія въ почвѣ «глины»: анализы двухъ образцовъ глинистаго чернозема, дѣйствительно, обнаруживаютъ очень значительное количество глинозема, растворимаго въ сѣрной кислотѣ: 11,7 и 10,8%, что при перечисленіи на глину даетъ 46,8 и 43,2%. Въ естественномъ ихъ состояніи эти почвы изборождены сѣтью широкихъ и глубокихъ трещинъ съ обвалившимися краями, благодаря чему у населенія этотъ сортъ черноземовъ слыветь подъ именемъ «щельниковъ»,—впрочемъ, наравнѣ съ некоторыми другими почвами. Перегнойная окраска проникаетъ въ толщу глинистаго чернозема весьма неравномерно: часто уже у самой поверхности разрѣза можно наблюдать табачнобурыя или сѣрыя партии мало измѣненной подпочвы, а рядомъ съ ними менѣе глинистые и сильно окрашенныя перегноемъ полосы уходять внизъ глубже 30 дюймовъ. Поэтому опредѣленіе общей мощности почвы здѣсь еще болѣе условно, чѣмъ для черноземовъ лесовыхъ, но въ общемъ можно принять, что мощность эта довольно значительна (въ среднемъ не

меньше 24 дм., $\min - 19$ дм.). Ясныхъ горизонтовъ въ глинистыхъ черноземахъ отличить обыкновенно нельзя, крупичатой структуры въ нихъ нѣть: почва распадается на неправильные комки, зерна или горошины. Часто уже на поверхности почвы можно наблюдать обломки известковыхъ конкреций, почему первоначально я и назвалъ эти почвы глинисто-известковымъ черноземомъ. Изъ приведенного выше анализа, можетъ быть, слѣдовало бы заключить, что эти почвы образовались на породахъ, болѣе богатыхъ углекислою извѣстью, чѣмъ лессовидные суглинки. Всиканіе съ кислотами, поэтому, начинается очень близко къ поверхности, въ среднемъ (8 дм.)—даже выше, чѣмъ, напр., въ структурныхъ солонцахъ; тѣмъ не менѣе, содержаніе хлористыхъ солей въ почвахъ и подпочвахъ четырехъ изслѣдованныхъ образцовъ ничтожно. Солонцеватыхъ разностей этого сорта черноземовъ мнѣ наблюдать не пришлось.

Окраска большей части глинистыхъ черноземовъ менѣе интенсивна, чѣмъ у черноземовъ лесовыхъ; соответственно этому и содержаніе перегноя въ нихъ нерѣдко менѣе; въ среднемъ изъ 8 опредѣленій оно равняется 7,4%.

Нормальная растительность типичныхъ глинистыхъ черноземовъ чисто степная: ни лѣса ни отдельныхъ деревьевъ на нихъ я ни разу не видѣлъ.

Распространеніе этого сорта почвъ въ Тобольской губ. довольно ограничено: онѣ встрѣчаются мѣстами къ югу отъ параллели Берлюжьей, преимущественно въ междурѣчье Тоболъ-Ишимъ, и къ В отъ р. Ишима почти неизвѣстны.

№ 372. Близъ д. Сычевки, Курган. уѣзда, въ 150 саж. на ЮЗ отъ кургана, называемаго Мокрымъ бугромъ; высокая мѣстность; разнотравный степной участокъ съ *Avena desertorum* и многими *Echinops Ritro*. $A' + A + B = 20 - 28"$ въ разныхъ мѣстахъ ямы. Почва покрыта широкими щелями съ осипавшимися краями; съ 4" начинаются въ ней табачнобурыя очень связныя партіи; есть известковые камешки и кремнистые гальки. Всиканіе съ 4". Въ верхнемъ горизонте подпочвы содержится хлора менѣе 0,01%.

№ 482. На казенномъ степномъ участкѣ къ Ю отъ д. Якуниной по дорогѣ въ Боксары, Курган. уѣзда, разнотравная степь лугового характера. Ровная мѣстность съ маленькими новиженіями, въ которыхъ—солонцы; березовые колки лишь по окраинамъ этого участка. $A' + A + B = 19"$; бурыя партіи появляются съ 5" отъ поверхности, щели на поверхности неясны. Всиканіе съ 6".

№ 500. Въ 6 в. отъ Баксаровъ по дор. въ Лебяжье, Курган. уѣзда, въ 100 саж. на ЮЗ отъ высохшаго болота Спорнаго (на томъ же степномъ участкѣ, гдѣ взятъ № 482). Степь изъ *Festuca sulcata* и *Stipa capillata*. $A' + A + B = 20"$; всиканіе съ 7"; болѣе типичный по общему

habitus'у глинистый черноземъ, нежели взятый въ образцѣ № 482. (3).

№ 317. Въ 8 в. отъ Куреинскаго по дор. въ Лопатинское, Курган. уѣзда, на такъ наз. Сорочьей степи. Разнотравный степной участокъ, на которомъ степные злаки (*Stipa pennata* и *capillata*, *Avena desertorum*, *Festuca sulcata*, *Koeleria cristata*, *Avena Schelliana*), не образуютъ главной массы растительности. $A'+A+B=28''$; почва покрыта щелями; вскипаніе бурное уже на 6" въ глинистыхъ партіяхъ.

№ 485. Въ сѣверозападномъ углу Сорочьей степи, Курган. уѣзда, въ 2-хъ в. на Ю отъ «Вохринской дубровы»; ковыльная степь (преобладаетъ *Stipa capillata* и *Avena desertorum*); $A'+A+B=15-25''$; сѣрабурый подпочвенный суглинокъ, какъ обыкновенно, съ перегнойными протеками, которые достигаютъ глубины приблизительно 50"; далѣе книзу подпочва представляетъ сѣрую чрезвычайно связную глину, въ которой до глубины 110" пройдено нѣсколько тонкихъ пропластковъ известковыхъ конкрецій. Много щелей. Всикаливіе мѣстами съ 5". Въ А и С—слѣды хлористыхъ солей и лишь на глубинѣ 84" опредѣлено 0,013% Cl.

№ 505. Въ 12 в. къ ЮЗ отъ Куреинскаго по дор. въ Привольную, Курган. уѣзда, ровный участокъ; ковыльная степь изъ *Stipa pennata*, *St. capillata*, *Festuca sulcata*. $A'+A+B=25''$; выцвѣты углесолей мѣстами уже съ 3", отсюда начинается и вскипаніе. Почва покрыта щелями. Въ А и С слѣды хлора (3).

№ 315. Въ 18 в. отъ Моршихи по дор. въ Кривинское, Курган. уѣзда, высокая и ровная мѣстность; типичная степь; преобладаетъ *Avena desertorum*; кроме того *Stipa pennata* и *St. capillata*, *Festuca sulcata* и *Koeleria cristata*; между дерновинами этихъ злаковъ много различныхъ степныхъ формъ. $A'+A+B=28''$; глинистая бурая партіи и бѣлыя примазки здѣсь начинаются только съ 11"; почва покрыта сѣтью широкихъ трещинъ, частью зияющихъ, частью съ уже обвалившимися краями. Всикаливаніе на 10". Въ почвѣ и подпочвѣ—известковая стяженія. Въ С слѣды хлористыхъ солей.

№ 370. Въ 12 в. отъ Казаркинского къ Моршихѣ, Курган. уѣзда, типичная степь; разнотравье, ибо обычные степные злаки (*Avena desertorum* и *Stipa capillata*) не образуютъ главной массы растительности. Западная покатость увала, подъ которымъ щельниковая степь смѣняется солонцами. $A'+A+B$ въ среднемъ около 22"; съ 5" начинаются бурая глинистая партіи и мелкие бѣлые выцвѣты. Почва изборождена широкими щелями. Всикаливаніе въ выцвѣтахъ съ 5".

№ 318. Въ 10 в. отъ Кривинского, по дор. въ Макушино, Курган. уѣзда, щельниковая степь, разнотравье; $A'+A+B=30''$; выцвѣты солей и глинистая партіи въ нѣкоторыхъ мѣстахъ разрѣза начинаются у самой поверхности.

№ 520. Въ 11 в. отъ Кривинского по дор. въ Макушино, Курган.

у́зда, у конца того степного участка, на которомъ взяты № 318; слабое падение на югъ; довольно редкотравная степь изъ *Stipa capillata* и *Avena desertorum*. Саженяхъ въ 100 отсюда степь уже смѣняется солонцомъ. $A' + A + B = 19"$; $B = 8$; А имѣеть интенсивный черный цветъ; уже у самой поверхности въ почвѣ попадаются бурыя глинистая партии и выцвѣты углесолей; вскипаніе съ 4"; щели узки и подпочвенный суглинокъ сравнительно мало связанъ.

№ 521. Въ 7 в. отъ Макушина, Курган. у́зда, по дор. въ Обутково, степной участокъ съ преобладаніемъ *Stipa capillata*; $A' + A + B = 21"$; близко къ поверхности есть бурыя глинистая партии, въ коихъ вскипаніе начинается на 9". Подпочвенный суглинокъ сравнительно мало связанъ.

№ 367. Въ 10 в. отъ Пѣгновского къ Бердюжей, Ишимского у́зда, ровная мѣстность со слабымъ скатомъ на СЗ. Старая залежь, покрытая *Stipa pennata* и *St. capillata* съ различными степными; $A' + A + B = 21"$; тотчасъ подъ дерномъ начинаются бурыя глинистая партии; вскипаніе однако только съ 17"; въ сѣроватомъ связномъ подпочвенномъ суглинкѣ известковые камешки.

№ 332. Въ 2 в. на СВ отъ Афонькиной, Ишимск. у́зда, степной участокъ, сопровождающій правый высокій берегъ долины Ишима, саженяхъ въ 15 отъ обрыва, близъ такъ наз. Кучумовой горы. Степь состоитъ главнымъ образомъ изъ *Avena desertorum*, *Stipa capillata* и *St. Lessingiana*. $A' + A + B = 24"$, $B = 12"$, щеловать, съ бѣлыми выцвѣтами. Подпочвенный каштановобурый суглинокъ съ известковыми камешками, повидимому, представляетъ элювіальное видоизмѣненіе сѣровѣтлой глинистой породы, обнаженной въ верхней части обрыва въ долину. Вскипаніе съ 13"; щелей на поверхности нѣтъ, кротовины во всѣхъ горизонтахъ.

№ 532. Въ $\frac{1}{2}$ в. отъ д. Большой (по дорогѣ изъ Сладковского), Ишимского у́зда, небольшая грива надъ «переймой». Заброшенная недавно пашня. $A' + A + B = 25 - 28"$; $B = 15 - 18$, буроватого цвета. Вскипаніе на 20".

№ 559. Въ 3 в. къ Ю отъ Большепесчанского, Тюкал. у́зда, плохо выраженная грива; залежь на «церковной» землѣ, покрытая нетипичной растительностью изъ лугово-лѣсныхъ и степныхъ формъ. $A' + A + B = 19"$; съ глубины 3" начинаются табачнобурыя глинистая партии. Въ сѣроватомъ связномъ подпочвенномъ суглинкѣ известковые камешки. Вскипаніе съ 3" (въ глинистыхъ партияхъ); по отзывамъ мѣстныхъ жителей, въ сухое время эта почва покрывается щелями. Во всякомъ случаѣ, какъ этотъ образецъ, такъ равно и предыдущіе (520, 521, 367, 332), уже не столь типичны, какъ перечисленные выше представители глинистыхъ черноземовъ Курганского у́зда.

3) Черноземы на лессовидныхъ подпочвахъ

покрываютъ главнымъ образомъ гривныя возвышенія и рѣже встрѣчаются на ровныхъ высокихъ степяхъ, напр. около с. Пѣтуховскаго, Ишимск. уѣзда, или сходить въ низины (см. выше), дѣлаясь солонцеватыми. По связности верхняго горизонта они всегда уступаютъ черноземамъ глинистымъ, независимо отъ содержанія глины, иногда очень значительного (по анализамъ Лабораторіи М. З., сѣрная кислота извлекаетъ изъ нихъ 9—11, а по анализамъ г. Шешукова—7—9% глинозема); благодаря этому свойству, населеніе предпочитаетъ обрабатывать именно этотъ сортъ черноземовъ. На степяхъ нерѣдко и эти черноземы бываютъ изборождены трещинами, всегда болѣе узкими, чѣмъ щели глинистыхъ черноземовъ. Въ западной половинѣ района, въ Тоболь-Ишимскомъ междурѣчье, встречаются по Тоболу сильно супесчаныя разности лессовыхъ черноземовъ, образовавшіяся на супесчаныхъ лессовидныхъ породахъ. Далѣе на востокъ, въ томъ же междурѣчье, характеръ лессовидныхъ породъ въ общемъ дѣлается суглинистымъ, но поверхностный горизонтъ черноземовъ, особенно на степныхъ участкахъ, производить впечатлѣніе супесчанаго: въ немъ замѣтна значительная примѣсь песчаныхъ частицъ. По мнѣнію г. Высоцкаго, подмѣтившаго эту особенность, такой характеръ поверхности горизонта «зависитъ отъ продолжительной переработки... атмосферными агентами и растительностью»; какъ кажется, наибольшее вліяніе изъ числа этихъ агентовъ обнаруживаетъ вѣтеръ, именно: въ Тоболь-Ишимскомъ междурѣчье случилось мнѣ видѣть «черную бурю». Къ востоку отъ р. Ишина черноземы съ такимъ супесчанистымъ характеромъ появляются гораздо рѣже.

Структурные особенности черноземовъ на лессовидной подпочвѣ представляютъ въ общемъ мало характернаго: лишь въ рѣдкихъ случаяхъ (главнымъ образомъ по Иртышу) они обладаютъ типичной крупичатой структурой поверхности горизонта; въ большинствѣ разрѣзовъ такая структура выражена очень слабо или совсѣмъ отсутствуетъ: почва распадается на неправильные комки. На типичныхъ степныхъ участкахъ, какъ и въ глинистыхъ черноземахъ, уже близко къ поверхности случалось наблюдать бурыя глинистые партіи, такъ что толщина слоя, равномѣрно и сплошь окрашенаго перегноемъ, незначительна (иногда 4—5"); въ лѣсахъ, а также во всѣхъ черноземахъ, расположенныхъ ближе къ сѣверной ихъ границѣ, толщина поверхности слоя, равномѣрно окрашенаго перегноемъ, болѣе значительна (дюймовъ 8—12). Переходный горизонтъ состоитъ изъ глинистыхъ партій, вдающихся отъ подпочвы кверху и отдѣленныхъ другъ отъ друга системой истончающихся книзу клиньевъ, болѣе густо окрашеныхъ перегноемъ.

Установленіе общей мощности почвы, а иногда и границы между

отдѣльными горизонтами, представляется, какъ замѣчено выше, дѣломъ въ значительной мѣрѣ условнымъ. Можно принять, что въ среднемъ изъ многихъ опредѣленій общая мощность почвъ этого сорта равна 21". Стоитъ замѣтить, что черноземы тоньше $1\frac{1}{2}$ футовъ приходилось регистрировать въ межdurъчье Тоболь-Ишимъ чаще, нежели къ В отъ р. Ишима; это находится въ связи съ наибольшимъ развитіемъ гравнаго рельефа въ указанномъ межdurъчье, ибо тонкіе черноземы встрѣчаются именно на покатостяхъ гравнъ, гдѣ почвы наиболѣе подвержены выдуванію и смыву.

Цвѣтъ поверхностнаго горизонта колеблется отъ черносѣраго до темносѣраго съ каштановымъ оттенкомъ, содержаніе гумуса по анализамъ Лабораторіи М. З.—отъ 7,5 до 12, а по анализамъ г. Шешукова—отъ 6,5 до 11%, въ среднемъ же—приблизительно 8—10%.

Растительность этихъ черноземовъ, какъ было выше указано, то лѣсная (березовые лѣса), то степная, иногда съ примѣсью солонцеватыхъ элементовъ. Въ верхнихъ горизонтахъ подпочвы черноземовъ подъ березняками обнаружены лишь слѣды хлора; тотъ же результатъ получился и для нѣкоторыхъ чисто степныхъ черноземовъ, для другихъ же —въ подпочвѣ опредѣлены замѣтныя количества хлора (до 0,067%); въ тѣхъ случаяхъ, когда посреди степи появляются и солонцовыѣ элементы, обыкновенно удается констатировать присутствіе въ верхнихъ частяхъ подпочвы болѣе или менѣе значительныхъ количествъ хлора. Глубина вскипающаго слоя въ черноземахъ съ лѣсной растительностью понижена до 20 и больше дюймовъ; подъ степною растительностью вскипаніе начинается гораздо выше. Солонцеватые черноземы въ этомъ отношеніи ведутъ себя различно: въ нѣкоторыхъ изъ нихъ глубина вскипающаго слоя противъ ожиданія понижена до 20 слишкомъ дюймовъ, въ другихъ вскипавіе начинается уже близко къ поверхности (подробнѣе объ этихъ отношеніяхъ будетъ сказано ниже).

Распространеніе лесовыхъ черноземовъ на югъ Тобольской губ. весьма значительно, но сѣверная граница ихъ до сихъ поръ сколько-нибудь детально еще не установлена; выше былъ намѣченъ приблизительный ея ходъ въ губ. Тобольской и Пермской на основаніи личныхъ наблюдений и литературныхъ данныхъ.

Въ дальнѣйшемъ списокъ лесовые черноземы сгруппированы слѣдующимъ образомъ: 1) черноземы Тоболь-Ишимскаго межdurъчья; 2) черноземы Ишимъ-Иртышскіе—главнымъ образомъ волостей Сладковской и Большепесчанской и сходныхъ съ ними по общему характеру мѣстностей (см. «Геобот. изсл. въ южной полосѣ Тоб. губ.» Гордягина, стр. 10); 3) черноземы пріиртышскіе и пріомскіе и 4) черноземы Покровской вол. Тюкаль. уѣзда. (Подъ А' въ списѣ подразумѣвается 1—2 верхнихъ дюйма почвы, гдѣ сосредоточено наибольшее количество еще не-

разложившихся органическихъ остатковъ; А' обычно не собирался).

1. Черноземы междурѣчья Тоболъ-Ишимъ.

№ 300. Въ 7 в. отъ Ялымы къ В. Алабугѣ, Курганск. уѣзда, поле, скатъ къ западу; недалеко березнякъ. А+В=17", С—желтобурая супесь, въ ней кротовины; супесчаная разность.

№ 303. Въ 8 в. отъ Черемуховскаго по дор. изъ Барабы, Курган. уѣзда, опушка березняка; дерновины *Stipa pennata*, *Festuca sulcata* и *Koeleria cristata*; *Avena Schelliana*, *Phleum Boehmeri* и много другихъ степныхъ травъ въ смѣси съ луговольсными. А'+А+В=24"; С—желтобурая супесь съ кротовинами.

№ 605. Въ межѣ с. Введенскаго, близъ д. Старосидоровой, Курган. уѣзда. Вершина увала у кургана «Пожнинъ бугоръ», цѣлинный степной участокъ. А'+А+В=30", супесчаный черноземъ (С).

№ 606. Въ 150 саж. отъ предыдущаго разрѣза, на вершинѣ болѣе низкаго увала. Цѣлинный степной участокъ. А'+А+В=20"—суглинистый черноземъ; въ подпочвѣ много известковыхъ глазковъ (С).

№ 608. Тамъ же, гдѣ предыдущій №, но близъ подошвы увала, рядомъ съ пашней, на которой порядочно растетъ овесъ. Растительность степная съ примѣсью солонцеватыхъ формъ. А=10; В=14, столбчатъ. Въ А—слѣды Cl; въ В и верхнемъ гориз. подпочвы—0,015% Cl. Вещества, извлекаемыя водой, въ подпочвѣ съ глуб. ниже 60 см содержится 0,60% (С).

№ 601. Тамъ же, но на половинѣ спуска съ главнаго увала къ солонцеватой низинѣ, поле, на которомъ картофель растетъ прекрасно. А+В=24"—супесчаный черноземъ. (С).

№ 602. Тамъ же, но еще ниже по склону, картофель достигаетъ высоты 12—13 вершковъ. А+В=20", супесчаный черноземъ. Слѣды хлора. Вода извлекается изъ почвы 0,1% экстрактивныхъ веществъ. (С).

№ 603. Въ 15 саж. отъ предыдущаго ниже по склону; кусты картофеля рѣдки, высотой 3—5 верш., жалкаго вида; надежды на урожай нѣть. А=22", черносѣрый съ выцвѣтами солей. В=6", столбчатъ. Солонцеватая разность: въ гориз. А (съ глубины 10 см) Cl—0,064%, въ В (съ глуб. 50 см)—0,032 и въ С (съ глубины ниже 70 см)—0,022; вещества, извлекаемыя водой, въ гориз. А содержится 1,6%, въ гориз. В—0,85%. (С).

№ 611. Г. Курганъ, городская березовая роща, полянка близъ кладбищенскихъ воротъ, покрытая б. ч. степными формами. А+В=30", супесчаный черноземъ. Въ подпочвѣ лишь слѣды хлора. (С).

№ 308. Въ 12 в. отъ с. Чашинскаго по дор. въ Брылинское, Курган. уѣзда, непаханный участокъ посреди полей на срединѣ слабой

покатости къ СЗ; нетипичная степная растительность; $A'+A+B=17''$, С—желтобурый суглинокъ съ кротовинами; вскипанія не удается обнаружить еще на глубинѣ 30".

№ 311. Въ 6^{1/2} в. отъ с. Сычевского, Курган. уѣзда, по Ишимскому тракту, опушка березового колка рядомъ съ полемъ. $A'+A=10''$, черносырый, $B=7''$, вверху темнѣе, чѣмъ А, орѣховатый; бурное вскипаніе лишь въ подпочвѣ; можетъ быть, слабо-солонцеватая разность.

№ 480. Въ 3 в. на ЮВ отъ с. Барашкова, Курган. уѣзда, участокъ г. Березина; старая пашня, покрытая сорными формами, на слабо выраженной гривѣ; кругомъ небольшие колки и отдѣльные экземпляры березы; $A+B=20''$; въ желтобуромъ подпочвенномъ суглинкѣ на 26" выцвѣты углесолей по корневымъ ходамъ; съ этой же глубины начинается и вскипаніе.

№ 481. Между д. Кокушкиной и оз. Ахтабаномъ, Курган. уѣзда, непаханный участокъ посреди полей, покрытый типичной степной растительностью съ фономъ изъ *Festuca sulcata*; $A'+A+B=22''$; въ желтобуромъ подпочвенномъ суглинкѣ сростки *CaCO₃*; вскипаніе съ 17".

№ 313. Въ 7 в. отъ Елошнаго, по дор. изъ Арлагуля, Курган. уѣзда, покатость небольшого увала; нетипичная степная растительность, по которой идетъ мелкий березнякъ; $A'+A+B=17''$; съ глубины 26" начинается мѣстное вскипаніе въ подпочвенномъ лессовидномъ суглинкѣ.

№ 314. Въ 16 в. отъ Елошнаго, по дор. въ Моршиху, Курган. уѣзда, участокъ на увалѣ, покрытый степными формами съ мелкой березой и осиной; $A'+A+B=21''$; желтобурый подпочвенный суглинокъ содержитъ много выцвѣтовъ углесолей; вскипаніе съ 24".

№ 316. Въ 22 в. отъ Кривинского, по дор. въ Куреинское, Курган. уѣзда, непаханный участокъ среди полей, покрытый типичной лугово-степной растительностью, въ коей есть и ковыли и *Avena desertorum*, но они стушевываются передъ множествомъ экземпляровъ *O nobrychis sativa*, *Astragalus O nobrychis*, *Lathyrus tuberosus*, *Pulsatilla patens* и т. д. $A'+A+B=19''$; почва и подпочва пронизаны кротовинами; выцвѣты углесолей по корневымъ ходамъ начинаются уже съ гориз. В, т. е. съ глубины 12"; отсюда же начинается и вскипаніе.

№ 504. Въ 10 в. отъ с. Кривинского, по дор. въ Куреинское, Курган. уѣзда, степной участокъ на плоскомъ увалѣ. $A'+A+B=21''$; вскипаніе съ 14" (3).

№ 501. Въ 6 в. къ ЮВ отъ с. Лебяжьяго, Курган. уѣзда, равная мѣстность. Въ мѣстѣ выемки—сорная растительность, немного дальше—таволга и вишня. Отдѣльные включения углекислой извести—уже въ А; $A'+A+B=19''$; лессовидный подпочвенный суглинокъ здесь имѣть мощность всего въ 19"; подъ нимъ начинается конгломератъ изъ галекъ; сплошное вскипаніе съ 18" (3).

№ 499. Въ 4 в. на СЗ отъ с. Кривинского, по дорогѣ въ Баксары, Курган. уѣзда, ровная мѣстность; старая залежь съ *Festuca sulcata* и *Stipa capillata*. $A' + A + B = 20"$; вскипаніе съ 19" (3).

№ 496. Около с. Лопатинского, Курган. уѣзда, на гривѣ между озерами Вышневымъ и Песъянымъ, степной участокъ рядомъ съ крупнымъ березнякомъ; слабая покатость къ оз. Вышневому. $A' + A + B = 17"$; выцвѣты углесолей въ подпочвенномъ суглинкѣ съ 21", отсюда и вскипаніе.

№ 495. Въ югозападномъ концѣ Долматовой дубровы, недалеко отъ с. Лопатинского, Курган. уѣзда; крупный березнякъ съ нетипичной растительностью. $A' + A + B = 23"$; въ подпочвенномъ суглинкѣ—выцвѣты углесолей; вскипаніе съ 20"; перегнойная окраска ослаблена по сравненію съ предыдущимъ образцомъ. Въ подпочвѣ—слѣды Cl.

№ 511. Въ 6 $\frac{1}{2}$ в. къ ЮВ отъ с. Куреинского, Курган. уѣзда, старая залежь, покрыта пыреемъ; разрѣзъ сдѣланъ на склонѣ гривы къ оз. Хохловатикъ. $A' + A + B = 16"$; въ подпочвенной желтобурой супеси съ 17" начинаются выцвѣты углесолей и вскипаніе.

№ 512. На восточной сторонѣ оз. Б. Филатова въ Куреинской вол., Курган. уѣзда, участокъ ковыльной степи на покатости къ озеру; почва съ поверхности покрыта сѣтью узкихъ трещинъ. $A' + A + B = 17"$; подпочвенный суглинокъ съ массой выцвѣтовъ углесолей; вскипаніе съ 12". Въ подпочвѣ—0,018% Cl.

№ 516. Въ 2 в. на ВЮВ отъ с. Куреинского, Курган. уѣзда, степной участокъ съ *Stipa capillata* и *Festuca sulcata*, на слабой покатости къ оз. Журавлику. Въ подпочвѣ масса выцвѣтовъ углесолей; вскипаніе съ 15". Въ почвѣ и подпочвѣ—слѣды Cl.

№ 519. Въ 3 в. на Ю отъ д. Шепериной, Курган. уѣзда, типичный степной участокъ съ преобладаніемъ *Stipa capillata*; почти совершенно ровная мѣстность надъ «зарѣзомъ» оз. Горькаго; $A' + A + B = 21"$; вскипаніе уже съ 12".

№ 515. Въ такъ наз. Куреинской дубровѣ, на гривѣ, вдающейся въ оз. Куреинское, Курган. уѣзда. Крупная береза съ примѣсью осины; много вишни. Лугово-лѣсная растительность съ примѣсью нѣкоторыхъ степныхъ формъ; $A' + A + B = 21"$; перегнойная окраска почвы весьма интенсивна; подпочвенный суглинокъ имѣеть въ верхнихъ горизонтахъ болѣе бурый оттѣнокъ, чѣмъ у образцовъ, собранныхъ въ степи. Вскипаніе начинается на 24".

№ 321. Въ 2 в. къ Ю отъ с. Пѣтуховскаго, Ишимск. уѣзда, степной участокъ, покрытый дерновинами *Stipa pennata* и *St. capillata*; $A' + A + B = 26"$; въ почвѣ и подпочвенной желтобурой супеси—кротовины; вскипаніе съ 15".

№ 325. Въ 12 в. отъ Безкамышной въ Соколовское, Ишимск.

уѣзда, залежь, покрытая *Bromus inermis* и степными; $A' + A + B = 21''$; подпочвенный суглиноокъ содержитъ много выцвѣтовъ CaCO_3 .

№ 628. Въ 3—4 в. отъ г. Петропавловска, по дорогѣ въ такъ наз. «Борокъ», типичная ковыльная степь по высокому берегу Ишимской долины, недалеко отъ обрыва. $A + B = 12 - 15 - 18$; равномѣрная окраска проникаетъ лишь на 6", при чёмъ тонъ окраски довольно свѣтлый. Даље окраска проникаетъ клиньями разной длины, отчего и общая мощность почвы сильно варьируетъ. С—желтобурая супесь, въ коей — бѣлыя примазки. Всипаніе и выцвѣты углесолей съ 12".

№ 328. Въ $7\frac{1}{2}$ в. отъ Красноярскаго, по дор. въ Ильинское, Ишимск. уѣзда, слабый скатъ къ В., выбитая степная растительность; $A' + A + B = 25''$; подпочвенная желтобурая супесь вскипаетъ и содержитъ выцвѣты углесолей.

№ 329. На 14-й в. отъ Ильинскаго къ Казанскому, Ишимскаго уѣзда, слабый скатъ на ю., къ оз. Яровскому. Молодой рѣдкій березнякъ, въ коемъ *Stipa pennata*, *Festuca sulcata* и разныя др. степные въ смѣси съ лугово-лѣсными формами; $A' + A + B = 20''$; всипанія не обнаружено еще и на 25" отъ поверхности почвы.

№ 365. Въ 17 в. отъ Ишима по дор. въ Локтишское, недавняя залежь съ нетипичной растительностью; $A' + A + B = 21''$; желтобурый подпочвенный суглиноокъ содержитъ выцвѣты углесолей; въ почвѣ всипанія нѣть. Можетъ быть отнесенъ и къ суглинистымъ разностямъ.

№ 368. На 15-й в. отъ Бердюжьей къ Бѣляковскому, Ишимск. уѣзда, березово-осиновый колокъ въ когловинкѣ рядомъ съ полемъ. $A' + A + B = 21''$, суглинистый черноземъ; гориз. А окрашенъ нѣсколько свѣтлѣе, чѣмъ В; въ нѣсколькихъ саженяхъ отсюда, на опушкѣ колка, верхній горизонтъ окрашенъ гораздо темнѣе.

№ 394. Въ 4 в. отъ с. Ларихинскаго, по дорогѣ въ г. Ишимъ, мелкій березнякъ посреди полей на гривѣ. $A + B = 22''$, супесчаный черноземъ. Всипаніе съ 26".

№ 391. Въ 1 в. къ СВ отъ г. Ишима, грива, поросшая березовымъ лѣсомъ, выгонъ. $A + B = 18''$, слегка супесчаный черноземъ. Всипанія нѣть еще на 35".

№ 390. Въ 18 в. отъ Малышевої, по дорогѣ въ Челнокову, грива, на которой встрѣченъ самый сѣверный черноземъ. Окраина поля на опушкѣ березняка. $A + B = 17''$, $A = 11''$ —равномѣрная черная окраска, супесчаный. С—желтовато-бурый суглиноокъ, желтѣющій по мѣрѣ углубленія. Всипанія нѣть еще на 34".

№ 333. Въ 13 в. отъ Боровой по дор. въ Тушнолобово, Ишимск. уѣзда, поле на довольно сильной покатости въ долину р. Ишима. $A + B = 16''$; въ подпочвѣ желтобурая супесь, въ коей всипанія нѣть еще и на 28" отъ поверхности почвы.

№ 323. Въ 6^{1/2} в. отъ с. Пѣтуховскаго, Ишимск. уѣзда, по дор. въ д. Сливную, равнинный степной участокъ, типичная степь, фонъ изъ *Festuca sulcata*; разнотравье. A' + A = B = 21"; почва покрыта узкими трещинами. Подпочвенный желтобурый суглинокъ бѣлѣеть при высыханіи; вскипаніе съ 7"; много кротовинъ.

№ 523. Въ 7^{1/2} в. къ СЗ отъ Куренинскаго, Курган. уѣзда, на Сорочьей степи, слабый увалъ, покрытый типичной степной растительностью изъ дов. рѣдкихъ дерновинъ *Stipa capillata* и *Avena desertorum*. Самое высокое мѣсто на Сорочьей степи. A' + A + B = около 19" (мѣстами въ разрѣзѣ вдоль вертикальныхъ трещинъ и глубже). Почва покрыта сѣтыю узкихъ щелей. Выцвѣты углесолей съ 10"; вскипаніе мѣстами уже съ 3"; подпочвенный желтобурый суглинокъ съ бѣлыми выцвѣтами констатированъ еще на глубинѣ 74".

№ 484. На гривѣ въ Долматовой дубровѣ, въ Лопатинской вол., Курган. уѣзда, въ верхней трети южной покатости; березовый лѣсъ. A' + A + B = 14". Подпочвенный суглинокъ отличается отъ типичныхъ лесовидныхъ. Къ черноземамъ эта почва отнесена условно, лишь на основаніи интенсивной окраски верхняго горизонта.

№ 306. Въ 3—4 в. отъ с. Мендерскаго, Курган. уѣзда, по дор. въ Чашинское, выбитая степная растительность на южномъ скатѣ увала. Между прочимъ, попадаются экземпляры *Statice Gmelini* и *Saussurea amara*. A' + A + B = 19"; подпочвенный суглинокъ бѣлѣеть при высыханіи. Вскипаніе съ 20"; повидимому, солонцеватая разность супесчанаго чернозема; въ почвѣ Cl содержится менѣе 0,01%.

№ 319. Въ 22 в. отъ Обутковъ къ Рынкамъ, Ишимск. уѣзда, степная растительность, ровная мѣстность. A' + A + B + B' = 28"; горизонтъ Въ столбчатъ; въ почвѣ и подпочвѣ — кротовины. Подпочвенный суглинокъ содержитъ много выцвѣтовъ углесолей и бурно вскипаетъ. Много кротовинъ. Повидимому, солонцеватая разновидность.

№ 489. Около 1 в. къ З отъ оз. Курчинскаго, Лопатин. волости, Курган. уѣзда. Почва покрыта дерновинами *Festuca sulcata*; много *Artemisia pontica* и попадается *Artemisia rupestris*; дальше на Въ, къ озеру Курчину, мѣстность немногого понижается и переходитъ въ формаль-ные солонцы. A' + A + B = 21"; подпочвенный суглинокъ съ охристыми пятнами и выцвѣтами солей; вскипаніе съ 23". Въ подпочвѣ содержится 0,088% Cl. Солонцеватая разность.

№ 490. Лопатинская вол., Курган. уѣзда. Въ 1/2 в. къ Ю отъ оз. Карнова, на сѣверной покатости гривы Сыроватой, непаханный залогъ среди полей съ рѣдкими дерновинами *Festuca sulcata* и *Stipa capillata*, между которыми попадаются экземпляры *Statice Gmelini*. A' + A + B = 14"; въ подпочвѣ желтобурый суглинокъ съ выцвѣтами солей; вскипаніе съ 17". Горизонтъ А имѣеть сравнительно свѣтлый цвѣтъ, въ Въ

окраска местами интенсивнѣе и появляется столбчатость. Образецъ этотъ можетъ быть отнесенъ и къ нетипичнымъ структурнымъ солонцамъ.

№ 526. Въ 2 в. къ З отъ Мартиной, Курган. уѣзда, рѣдкотравный степной участокъ къ С отъ оз. Каменчаго. Много *Festuca sulcata*, *Galatella punctata* и *Artemisia pontica*; $A + A + B + B = 18"$; въ желтоватобуромъ подпочвенномъ суглинкѣ гвѣзда кристалловъ гипса; въ переходномъ горизонтѣ столбчатость, цветъ А довольно интенсивный; вскипаніе съ 5"; въ гориз. А содержится меньше 0,01% Cl, въ В — уже 0,125, въ С — 0,263; солонцеватая разность.

№ 304. Между г. Курганомъ и д. Курганской, чуть замѣтная лощинка на высокомъ берегу Тобола. $A + A = 11"$, сверху нетолстый налѣвъ, книзу нормальная почва черно-бронзового цвѣта и крупичатаго строенія; $B = 9"$ — сырватобѣлый, подзолистый, съ многочисленными желѣзистыми конкрециами; С = буро-желтоватый не вскипающій суглинокъ съ перегнойными подтеками и подзолистыми примазками; книзу постепенно желтѣеть и приблизительно на глубинѣ 53" отъ поверхности почвы переходитъ въ столбчатую лессовидную породу съ бѣлыми глазками углекислой извести. Подзолистая разность.

№ 506. Въ 12 в. отъ с. Красноярскаго, по дор. въ Ильинское, Ишимскаго уѣзда, небольшое пониженіе на увалѣ, березовые пни. $A + A + B = 19"$; В — подзолистъ; въ С — красноватобурый суглинокъ (3).

2. Черноземы Сладковской волости и прилегающихъ аналогичныхъ мѣстностей.

№ 507. Въ 12 в. на В отъ д. Пелевиной, по дор. въ Сладковское, Ишимск. уѣзда, поляна между колками березы. Растительность степная съ примѣсью *Veronica longifolia*; $A + A + B = 24"$; въ С — желтобурый лессовидный суглинокъ; вскипаніе съ 23" (3).

№ 508. Въ 12 в. на Ю отъ с. Сладковскаго, Ишимск. уѣзда, по дор. въ Таволжанъ, поляна между березовыми колками рядомъ со старой пашней; $A + A + B = 24"$; подпочвенный суглинокъ менѣе типиченъ, чѣмъ у предыдущаго образца; въ В появляются выщѣты; вскипаніе начинается съ 10" (3).

№ 548. Въ 6—7 в. на СЗ отъ с. Сладковскаго, Ишимск. уѣзда, по дор. въ д. Мал. Курталь, поляна, окруженная березовыми колками. Растительность лугово-болотная съ примѣсью вѣкоторыхъ степныхъ формъ. $A + A + B = 25"$; вскипаніе съ 20" (3).

№ 547. Въ 100 саж. на ЮЗ отъ с. Сладковскаго, Ишимск. уѣзда, выбитая нетипичная растительность. $A + A + B = 17"$; въ желтобуромъ подпочвенномъ суглинкѣ выщѣты углесолей съ глубины 26"; отсюда же начинается и вскипаніе; можетъ быть, почва съ поверхности отчасти смыта (3).

№ 537. Саж. во 100 на СВ отъ д. Никулиной, Ишимск. уѣзда, поляна между колками. Растительность луговолѣсная. $A' + A + B = 19''$; вскипанія не констатировано еще и на 27" (3).

№ 538. Въ 200 саж. на ЮВ отъ Бѣковой, Ишимск. уѣзда, поляна между березовыми колками. Луговолѣсная растительность; $A' + A + B = 26''$; по ослабленной окраскѣ подходитъ къ предыдущему образцу и подобно ему отличается глубокимъ вскипаніемъ—ниже 28" (3).

№ 540. Въ 200 саж. на СЗ отъ д. Дубровной, Ишимск. уѣзда. Поляна между березовыми колками, недалеко отъ края кочковатаго болота. Растительность луговолѣсная съ примѣсью такихъ формъ, какъ *Veronica spicata* и *Phlomis tuberosa*. $A' + A + B = 23''$; вскипаніе обнаруживается уже съ 13" (3).

№ 509. Восточный берегъ оз. Таволжана въ Ишимск. уѣздѣ, надъ «зарѣзомъ»; растительность выбита скотомъ; $A' + A + B = 23''$; вскипаніе уже съ 12"; образецъ этотъ имѣеть довольно неопределенный характеръ и на подпочвѣ приближается къ глинистымъ черноземамъ (3).

№ 552. Въ 3 в. къ С отъ Большесечанского, Тюкалин. уѣзда, плохо выраженная грива; старая пашня, покрытая луговолѣсными и сорными формами. $A' + A + B = 16''$; желтогатобурый подпочвенный суглиночъ начинаетъ вскипать съ 23" отъ поверхности почвы; окраска поверхностного горизонта ослаблена; почва, навѣрно, была покрыта лѣсомъ.

№ 553. Въ 1 в. на ЮЗ отъ Большесечанского, Тюкалин. уѣзда, поляна между березовыми колками. Растительность изъ луговолѣсныхъ формъ; есть *Festuca sulcata*, *Veronica spuria*, *Phlomis tuberosa*, *Lathyrus tuberosus*; рядомъ—пашня. $A' + A + B = 20''$; вскипаніе уже съ 16"; довольно типичный образецъ (3).

№ 560. Въ 10 в. отъ Налимовой, по дор. въ Червоусову, Тюкалин. уѣзда, поляна между колками, покрытая главнымъ образомъ *Calamagrostis epigejos*. $A' + A + B = 20''$; $B = 8''$; вскипаніе въ подпочвенномъ желтовато-буromъ суглиночъ съ 24".

№ 338. Въ 7 в. отъ Колмаковой, по дор. въ Тюкалинскъ, поляна между колками, покрытая луговолѣсными формами, среди коихъ есть и нѣкоторые степные. $A' + A + B = 23''$; $B = 8''$; бурый съ желтоватымъ оттенкомъ подпочвенный суглиночъ не вскипаетъ и въ горизонте, прилегающемъ къ В.

№ 335. Въ 11 в. отъ Абатской къ Камышенкѣ, Тюкалин. уѣзда, опушка березняка; луговолѣсная растительность съ примѣсью нехарактерныхъ степныхъ формъ. $A' + A + B = 20''$; $B = 5''$; въ С—желтобурый суглиночъ; вскипанія нѣть еще и на 35".

3. Черноземы пріиртышского и пріомскаю районовъ.

№ 342. Въ 8 в. отъ Бекишева по дор. въ Сухово, Тюкалинскаго

уезда, ровный степной участок; много *Avena desertorum*, типчака и *Stipa capillata*; типичная степная растительность. $A' + A + B = 23"$; $B = 9$; въ подпочв. суглинкѣ много углесолей; вскипаніе уже съ 12". Въ почвѣ—кротовины.

№ 561. На 9-й в. отъ Бекишева къ Замираловой, Тюкал. уезда, на съверной окраинѣ типичного степного участка; въ мѣстѣ выемки едва замѣтное пониженіе, въ коемъ степные злаки уступаютъ свое мѣсто *Calamagrostis epigejos* и начинаетъ селиться береза. $A' + A + B = 20"$; $B = 7 - 12"$; вскипаніе проявляется лишь на 24".

№ 562. На 21-й в. отъ Бекишева къ Замираловой, Тюкалинскаго уезда, продолженіе все того же равниннаго степного участка, на которомъ взяты 2 предыдущіе образца. Довольно много дерновинъ *Avena desertorum*, затѣмъ эспарцета, *Peucedanum officinale*, *Artemisia latifolia* и *A. sericea*, *Galatella Hauptii* и др. степныхъ, а *Calamagrostis epigejos*, *Dracocerphal. Ruyschiana* etc. въ маломъ количествѣ экземпляровъ; въ общемъ степь имѣеть характеръ разнотравный; поверхность почвы покрыта узкими щелями. $A' + A + B = 21 - 25"$; $B = 9 - 11"$; въ подпочвенномъ суглинкѣ масса выцвѣтовъ углесолей; во всѣхъ горизонтахъ кротовины; вскипаніе съ 15".

№ 563. Въ 3 в. не доѣзжая до Любина, по дор. изъ Замираловой, Тюкалин. уезда, старая пашня, покрытая *Stipa capillata*, *Festuca sulcata*, *Artemisia frigida*. $A' + A + B = 18"$; $B = 7"$; подпочвенная лессовидная порода имѣеть сѣровато-желтый оттѣнокъ и содержитъ много выцвѣтовъ; сплошное вскипаніе съ 15", а по кротовинамъ и выше.

№ 343. Въ 18 в. отъ Сухова, по дор. въ Красноярское, Тюкалин. уезда, старая залежь, покрытая *Stipa capillata* и др. степными съ значительной примѣсью *Calamagrostis epigejos*. $A' + A + B = 23"$; $B = 7"$; по цвѣту почвы этотъ образецъ представляетъ аналогію съ предыдущимъ, но вскипаніе въ немъ—только съ 25". Во всѣхъ горизонтахъ—кротовины.

№ 344. Въ 8 в. отъ Красноярского, по дор. въ Кулачье, Тюкал. уезда, опушка березняка на окраинѣ поля; растительность гл. обр. сорная. $A + B = 19"$; $B = 9"$; въ подпочвѣ желтобурая супесь и почва представляетъ сильно супесчаную разность мѣстныхъ черноземовъ. Вскипанія въ поверхностномъ горизонте подпочвы нѣть.

№ 345. Въ 13 в. отъ Кулачьяго, Тюкал. уезда, по дор. въ Омскъ, молодая залежь, покрытая сорными; ровная мѣстность. $A + B = 23"$; $B = 9"$.

№ 346. Въ 21 в. отъ Омска, по дор. въ Сыропятское, Тюкалин. уезда, степь на высокомъ увалѣ; разнотравье; изъ злаковъ порядочно *Festuca sulcata*. $A' + A + B = 17"$; въ лессовидной подпочвѣ выцвѣты углесолей съ 22", а вскипаніе—съ 20".

№ 580. Въ 10 в. на СВ отъ Сыропятского, по дор. въ Юрьев-

ское, Тюкалин. уѣзда, поляна между колками; дерновины ковыля; $A' + A - B = 23''$; $B = 11''$; вскипаніе съ 25''.

н° 347. Въ 11 в. отъ Сыропятского, по дор. въ Юрьевское, Тюкалин. уѣзда, типичный степной участокъ, то съ преобладаніемъ *Stipa capillata* и *Avena desertorum*, то разнотравный; образецъ взять посреди разнотравья: много *Festuca sulcata*, *Pulsatilla patens*, *Peucedanum officinale* и *alsaticum*; почва покрыта узкими щелями. $A' + A - B = 21''$; $B = 9''$; лессовидный подпочвенный суглиникъ пронизанъ кротовинами и содержитъ бѣлые выцѣльты; вскипаніе — уже въ ниж. части горизонта В.

н° 564. Въ 9—10 верстахъ отъ Юрьевского, Тюкалин. уѣзда, по таکъ наз. Пяташной дорогѣ на Куликовское; старая пашня, покрытая *Stipa pennata*, *Stipa capillata*, *Festuca sulcata*, *Peucedanum officinale* и *Calamagrostis epigejos* $A' + A - B = 18''$; $B = 7''$; очень слабое вскипаніе мѣстами уже съ 8''; сплошное — съ 14''.

н° 348. Въ 4 в. отъ Куликовского, Тюкалин. уѣзда, по обычной дорогѣ изъ Юрьевского, давнишняя залежь, покрытая *Stipa capillata*, *Calamagrostis epigejos* и различными степными. $A' + A - B = 21''$; $B = 6''$; въ подпочвенномъ суглинике вскипаніе начинается лишь на 25''.

н° 581. Въ 2 в. на СВ отъ д. Богдановой, Тюкалин. уѣзда, по дор. въ с. Куликовское. Степь изъ *Stipa capillata*. $A' + A - B = 24''$; $B = 13''$; вскипаніе — уже съ 14'' (3).

н° 582. Въ 2 в. отъ Куликовского по дор. въ д. Глуховскую, Тюкалин. уѣзда, на правомъ берегу Оми, въ $\frac{1}{2}$ в. отъ обрыва. Степной участокъ изъ *Stipa capillata*. $A' + A - B = 26''$; $B = 19''$; вскипаніе — съ 15'' (3).

н° 583. Правый берегъ Оми въ 2 в. отъ с. Воскресенского по дор. въ д. Глуховскую, Тюкалин. уѣзда; степь изъ *Stipa capillata*; $A' + A - B = 26''$; $B = 16''$; вскипаніе съ 14''. Покатость въ сторону Оми; рядомъ — пашня (3).

н° 584. Правый берегъ Оми противъ д. Глуховской, Тюкалинск. уѣзда, саженяхъ въ 30 отъ обрыва; растительность степная. $A' + A - B = 23''$; $B = 16''$; вскипаніе — съ $8\frac{1}{2}''$ (3).

н° 586. На В отъ ст. Калачинской Зап.-Сиб. ж. д., по дор. въ д. Таволжанку, Тюкалин. уѣзда, рядомъ съ пашней. $A' + A - B = 28''$; $B = 19''$; вскипаніе — съ 15'' (3).

н° 587. Въ 13 в. на В отъ Куликовского по лѣвому берегу Оми, по дор. въ Таволжанку, Тюкалинскаго уѣзда, саженяхъ въ 10 отъ березового колка; $A' + A - B = 22''$; $B = 14''$; вскипаніе — только съ 24''; растительность лугово-болѣсная, съ примѣсью нѣкоторыхъ степныхъ (3).

н° 585. Лѣвый берегъ Оми въ 3 вер. на В отъ Куликовского, Тюкалинскаго уѣзда, степь изъ *Stipa capillata*. $A' + A - B = 28''$; горизонтовъ различить нельзя, ибо уже подъ дерномъ начинаются

желтобурыя пятна; выцвѣты и вскипаніе съ 7" (3).

н° 588. Въ 2-хъ в. на ЮЗ отъ д. Глуховской, Тюкал. уѣзда, по лѣвобережью Оми, покатость къ рѣкѣ; трава выбита; $A' + A + B = 29"$; вскипаніе съ 4". Известковыя конкреціи во всѣхъ горизонтахъ. Представляетъ гомологъ предыдущаго образца (3).

н° 361. Въ 4 в. отъ Серебрянки, по дор. въ Теребиловку, Тюкал. уѣзда, залежь, покрытая степными и сорными формами. Недалеко березнякъ. $A' + A + B = 23"$, $B = 9"$. Вскипаніе начинается съ 28" и только съ 30" появляются выцвѣты углесолей.

н° 359. На 8-й в. отъ Хомутинскаго къ Еланкѣ, Тюкал. уѣзда, залежь, покрытая очень высокимъ эспарцетомъ и нѣкоторыми другими степными растеніями и массой лугово-льсныхъ. $A' + A + B = 21"$; $B = 5"$; мѣстнос вскипаніе появляется лишь на 26".

4. Черноземы заомскаго угла губерніи, главнымъ образомъ Покровской волости.

н° 565. Въ 16 в. отъ Куликовскаго, по дор. въ Лагушку, Тюкал. уѣзда, степной участокъ, покрытый *Stipa capillata* и *Avena desertorum* съ различными другими степными. Кругомъ колки. Почва щелевата; $A' + A + B = 24"$; бурыя партіи появляются близко къ поверхности; много кротовинъ; вскипаніе уже съ 5".

н° 590. Въ 2 в. на В отъ д. Лагушки, Тюкал. уѣзда, полява между колками, покрытая дерновинами *Stipa capillata*. $A' + A + B = 27"$; по строенію сходенъ съ предыдущимъ. Мѣстное вскипаніе (въ бурыхъ партіяхъ)—уже съ 3", сплошное—съ 9" (3).

н° 592. Въ 3 в. на ЮВ отъ Лагушки, по дор. къ выселку Золотая Нива, Тюкал. уѣзда. Дерновины *Stipa capillata*; растительность степная. $A' + A + B = 22"$; $B = 11"$; вскипаніе съ 23" (3).

н° 567. Въ 10—11 в. отъ Лагушки, по дор. въ Оконишниково, Тюкал. уѣзда, поляна между колками, покрытая довольно рѣдкой растительностью изъ *Artemisia pontica*, *Galatella punctata* и нѣк. другихъ степныхъ. $A' + A + B = 18"$; $B = 13"$ —столбчато-орѣловатый; вскипаніе съ 13"; солонцеватая разность.

н° 351. Въ 3 в. отъ Оконишникова, по дор. въ Камышную, Тюкалин. уѣзда, типичная степь на небольшомъ увалѣ. $A' + A + B = 13—14"$; $B = 4—5"$; почва очень сильно супесчана; въ подпочвенной желто-буруй супеси вскипаніе съ 24".

н° 595. Въ 6 в. на Ю отъ Оконишникова, Тюкал. уѣзда, по дорогѣ въ д. Камышную. Старая пашня, окруженнная колками. $A' + A + B = 24"$; суглинистый черноземъ. Вскипаніе съ 25" (3).

н° 596. Верстахъ въ 8 отъ Оконишникова, по дор. въ Камышную,

Тюкал. уѣзда, пашня на окраинѣ колка. $A' + A + B = 21''$; $B = 13''$; вскипание съ $21''$ (3).

№ 354. Въ 4 в. отъ Оконишникова, по дор. въ Кабанье, Тюкал. уѣзда, небольшое пониженіе посреди степи, рядомъ съ полемъ. $A' + A + B = 21''$; $B = 14''$, слегка столбчатъ. Подпочва съ бѣлыми выцвѣтами и вскипаетъ.

№ 568. Въ 6 в. отъ Оконишникова, по дор. въ Крестики, Тюкал. уѣзда, вичтожное пониженіе среди ковыльной степи, покрытое множествомъ *Calamagrostis epigejos*, *Galatella punctata*, *Filipendula Ulmaria* и нѣкоторыя другія, безъ ковылей и *Avena desertorum*; есть и мелкая отдѣльная березки, рядомъ—пашня. $A' + A + B = 30''$; $B = 15''$; вскипание начинается только съ $29''$. Въ подпочвѣ—слѣды Cl.

№ 569. Въ 30 саж. на В отъ предыдущаго образца, посреди типичной степи изъ *Stipa capillata* и *Avena desertorum*; $A' + A + B = 14''$; $B = 8''$; вскипание уже съ $12''$; цветъ А гораздо менѣе интенсивенъ, чѣмъ у образца № 568. Въ подпочвѣ—слѣды Cl.

№ 355. Въ 5 в. отъ Крестиковъ, по дор. въ Прѣсновку, Тюкал. уѣзда. Цѣлинная степь рядомъ съ полемъ въ едва замѣтной лощинкѣ. $A' + A + B = 16—21''$; $B = 8—13''$; вскипание съ глубины $17''$.

№ 577. По направленію отъ Крестиковъ, Тюкал. уѣзда, къ оз. Май-Сору. Типичная степь изъ *Avena desertorum* и *Stipa capillata*, довольно рѣдкотравная. Въ 1 в. къ С начинаются первые березовые колки. $A' + A + B = 14''$; $B = 6''$; явственный каштановый оттѣнокъ; вскипание уже съ $12''$. Въ подпочвѣ—меньше 0,01% Cl.

№ 578. Въ 5 в. отъ Крестиковъ, Тюкал. уѣзда, на Ю; ровная ковыльная степь изъ *Stipa capillata* и *Avena desertorum*, *Bupleurum baldense*, *Aster alpinus*, *Jurinea linearifolia* etc. Рѣдкотравье; почва имѣеть явственный каштаново-серый цветъ. $A' + A + B = 15''$; $B = 7''$; вскипание местное съ $9''$, общее съ $11''$; въ подпочвѣ довольно крупныя известковыя конкреции.

№ 575. Къ Ю отъ Крестиковъ, Тюкал. уѣзда, по направленію къ оз. Май-Сору. Южный конецъ бездревесной ковыльной степи передъ такъ наз. Голодной степью. Рѣдкотравье; преобладаютъ *Avena desertorum* и *Stipa capillata*; порядочно *Bupleurum baldense*; солонцоватыхъ формъ нетъ; почва имѣеть довольно свѣтлый оттѣнокъ; $A' + A + B = 14''$; вскипание съ $14''$. Въ подпочвѣ—0,067% Cl.

№ 570. Въ 4 в. къ СЗ отъ Крестиковъ, Тюкал. уѣзда, вершина увала близъ оз. Горькаго, очень слабое паденіе на В, къ озерной визинѣ. Рѣдкотравная степь изъ *Festuca sulcata* съ рѣдкой *Stipa capillata*, *Artemisia sacrorum*, *Adonis wolgensis* и *Statice Gmelini*. $A' + A + B = 10'$; вскипание уже съ $6\frac{1}{2}'$ сплошное. Въ подпочвѣ 0,116% Cl. Каштановый цветъ еще болѣе выраженъ, чѣмъ у предыдущихъ. Этотъ

образецъ приводится вмѣстѣ съ черноземами лишь благодаря его сходству съ № 575 и отсутствію отдельной рубрики для капитановыхъ почвъ.

нр° 569, 577 и 575, несмотря на сравнительно слабую окраску сиро-каштанового цвѣта, оказались по анализамъ довольно богатыи перегноемъ (6,6 и выше 7%).

СОЛОНЦОВЫЯ ПОЧВЫ

зalегаютъ всегда на пониженныхъ сравнительно съ окружающими почвами участкахъ терроріи, обыкновенно въ междугривныхъ пониженияхъ, гдѣ иногда занимаютъ большія площади. Рѣже встрѣчаются онъ по бокамъ гривъ, въ видѣ сравнительно небольшихъ и рѣзко очерченныхъ пятенъ, выдающихся почти полнымъ отсутствіемъ растительности. Посреди высокихъ ровныхъ степей въ Тобольской губ. онъ встрѣчаются рѣдко, помѣщаясь здѣсь тоже въ маленькихъ котловинкахъ; гораздо чаще мелкія солонцеватыя пятна посреди степей Акмолинскаго и Атбасарскаго уѣздовъ, гдѣ они располагаются иногда (какъ напр. по р. Нурѣ) около самаго обрыва въ рѣчную долину.

Съ морфологической точки зреія онъ распадаются на солонцы структурные и безструктурные. Структурные солонцы (или иначе сухие, послѣднее название, впрочемъ, менѣе удачно) залегаютъ главнымъ образомъ виѣ междугривныхъ понижений на боковыхъ поверхностяхъ гривъ, гдѣ иногда встрѣчаются очень пологія мѣста, и на покатостяхъ къ подзолистымъ котловинкамъ; рѣже они наблюдались и въ междугривныхъ пониженияхъ, рядомъ съ солонцами безструктурными. Благодаря такимъ условіямъ залеганія, структурные солонцы большую часть лѣта представляются сухими; несомнѣнно однако, что они должны испытывать хотя временный застой воды, особенно весною. Верхній ихъ горизонтъ представляетъ сѣрую или даже свѣтлосѣрую безструктурную массу, иногда сильно песчанистую и съ бурыми подпалинами; этотъ горизонтъ то развитъ очень мало, представляя лишь керку дюйма въ 2—3 толщиной, то имѣеть болѣе значительную мощность. Подъ нимъ залегаетъ характерный для этого сорта почвъ столбчатый слой: если снять весь верхній горизонтъ, то обнаруживаются верхнія плоскости неправильно 6-5 или 4-границыхъ столбовъ, дюймовъ 2—3 въ диаметрѣ, отдѣленныя другъ отъ друга вертикальными щелями. Связность материала, изъ котораго состоятъ эти столбы, особенно велика близъ верхней ихъ поверхности: нерѣдко лопата, ударяясь о нихъ, звучитъ и отскакиваетъ, какъ отъ удара о камень. Книзу связность уменьшается, и столбы легко разсыпаются въ болѣе или менѣе крупные остроугольные орѣхи, окрашенные перегноемъ въ болѣе темный цвѣтъ, чѣмъ собственно столбчатый

горизонтъ, ибо поверхность столбовъ—темно-серая, иногда даже со светлыми песчанистыми примазками; внутри столбовъ, однако, окраска перетекаетъ болѣе интенсивна. Благодаря нерѣдко значительному развитию темного орѣховатаго слоя подъ столбчатымъ, въ дальнѣйшемъ описаніи мыѣстами говорится о горизонтахъ В и В₁, понимая подъ этими обозначеніями столбчатый и орѣховатый горизонты отдаленно. Мощность структурныхъ солонцовъ варьируетъ въ широкихъ предѣлахъ: въ одномъ случаѣ былъ зарегистрированъ структурный солонецъ даже только въ 9" толщиной; обыкновенно же мощность этихъ почвъ значительно больше и въ среднемъ—около 19, увеличиваясь въ крайнихъ случаяхъ до 26—27"; мощность одного столбчатаго горизонта—5—6", рѣдко больше (до 13").

Вскапаніе съ кислотами въ структурныхъ солонцахъ въ видѣ исключенія начинается уже отъ поверхности (констатировано лишь въ одномъ случаѣ); наиболѣе часто и вскипаніе, и соляные выцвѣты начинаются только съ орѣховатаго горизонта В₁ (въ среднемъ изъ всѣхъ опредѣленій—на глубинѣ 10—11"); рѣже вскипаетъ лишь подпочва; въ такихъ случаяхъ констатировано рѣзкое оподзоливание поверхностнаго горизонта.

Анализъ одного изъ представителей структурныхъ солонцовъ обнаружилъ присутствіе въ столбчатомъ его горизонте сравнительно небольшого количества растворимыхъ въ водѣ солей (около 0,2%); щелочной характеръ водной вытяжки заставляетъ предполагать въ немъ присутствіе Na2CO3; такимъ же щелочнымъ характеромъ обладаетъ водная вытяжка и еще изъ нѣсколькихъ структурныхъ солонцовъ. Возможно, что типичные представители этого сорта почвъ окажутся обычно содержащими въ своемъ составѣ углекислую щелочи. Химизмъ этихъ почвъ, по-видимому, вообще своеобразенъ и заслуживаетъ болѣе тщательнаго изученія. Количество хлора въ этихъ почвахъ возрастаетъ по мѣрѣ углубленія и часто весьма невелико.

Растительность, покрывающая структурные солонцы, довольно разнообразна. Иногда на такихъ солонцахъ развивается лишь чрезвычайно жалкая и рѣдкая растительность, состоящая изъ немногихъ видовъ, либо чисто солонцовыхъ, либо въ смѣси съ *Festuca sulcata*; солонцы съ такой бѣдной растительностью оказываются лежащими выше сосѣднихъ междугравивныхъ понижений и часто не имѣютъ значительно развитого безструктурного горизонта А; въ другихъ случаяхъ горизонтъ этотъ болѣе развитъ, окрашенъ темнѣе и почва приближается по габитусу къ солонцеватымъ черноземамъ: на такихъ структурныхъ солонцахъ развита рѣдкотравная степная растительность съ малой примѣсью солонцеватыхъ формъ, въ родѣ *Statice Gmelini* и *Artemisia maritima*; наконецъ, иногда наблюдается формальное оподзоливание структурнаго солонца, при чмъ

поверхностный безструктурный слой имѣть характеръ подзола, а отдельности столбчатаго горизонта оподзоливаются отчасти близъ верхней границы, пріобрѣтая закругленныя верхушки, отчасти по боковымъ поверхностямъ; въ такихъ случаяхъ на солонцахъ развиваются березняки, и солонцовыя формы могутъ совсѣмъ отсутствовать. Въ междугривныхъ пониженіяхъ, въ зависимости отъ высокаго стоянія почвенныхъ водъ, эти почвы несутъ болѣе богатую растительность изъ смѣси формъ солонцовыхъ, степныхъ и болотныхъ. Подпочву структурныхъ солонцовъ образуютъ нерѣдко обогащенные солями и потерявшія пористую структуру видоизмѣненія лессовидныхъ породъ; въ междугривныхъ пониженіяхъ эти почвы связаны съ аллювиальными бурыми и свѣтлобурыми соленосными суглинками.

Солонцы безструктурные залегаютъ главнымъ образомъ (но не исключительно) въ междугривныхъ пониженіяхъ и вообще въ наиболѣе пониженныхъ участкахъ, по днищамъ усохшихъ озеръ, по займищамъ и переймамъ, занимая иногда большія пространства (напр. около оз. Б. Невидимъ, затѣмъ въ районѣ бывшаго бассейна оз. Сумы-Чебаклы, около оз. Салтайма, Мангута и др.). Лишь въ мѣстностяхъ съ очень плохо развитымъ рельефомъ, въ родѣ волостей Сладковской и Большепесчанской, иногда неясно выражена связь между ними и наиболѣе пониженными участками территории. Даже и въ сухое время года такие солонцы являются болѣе или менѣе влажными и потому заслуживаютъ названія «мокрыхъ»; иногда уже при рытьѣ мелкихъ ямъ (для выемки почвенныхъ образцовъ) въ нихъ встрѣчается вода на глубинѣ 2—3 футовъ, такъ что вообще уровень почвенныхъ водъ для этихъ почвъ сравнительно съ другими можетъ считаться повышеннымъ. Отсюда понятно, что такого sorta солонцеватыя почвы лишь содержаниемъ значительного количества легко растворимыхъ солей отличаются отъ болотныхъ почвъ, распространенныхъ, при аналогичныхъ условіяхъ рельефа, и гораздо съ вернѣе той области, въ которой распространены солонцы. Впрочемъ, соленостность, особенно значительная, не остается, вѣроятно, безъ вліянія и на самый характеръ почвы, такъ что между не солонцеватыми и солонцеватыми болотными почвами, можетъ быть, существуютъ и болѣе значительные различія.

Сравнительно рѣже появляются безструктурные солонцы въ наибольшихъ депрессій рельефа; сюда относятся, напр., некоторые солонцы Ишимъ-Иртышскаго междурѣчья, главнымъ образомъ Сладковской волости; такія почвы уже не могутъ быть названы «мокрыми», ибо по влажности мало отличаются отъ окружающихъ.

Сколько нибудь рѣзкихъ структурныхъ особенностей почвы эти не представляютъ: поверхностный слой ихъ, болѣе или менѣе влажный даже въ сухое время, безструктуренъ и мягокъ, т.-е. поддается лопать го-

раздо легче, чѣмъ всѣ остальные почвы юга Тобольской губерніи, кромѣ развѣ подзоловъ. По цвету можно отличить двѣ разности такихъ солонцовъ: черные и сѣрые, но изъ имѣющихся аналитическихъ данныхъ видно, что и въ сѣрыхъ содержаніе органическихъ веществъ очень значительно. Только относительно черныхъ солонцовъ замѣчена въ нѣсколькихъ случаяхъ слоистость верхняго ихъ горизонта, вообще же эти почвы слоистости не проявляютъ, и перегнойная окраска въ нихъ ослабляется постепенно по направлению къ подпочвѣ, представляющей соленосный суглинокъ разныхъ оттенковъ бураго или сѣраго цвѣта, въ сыромъ состояніи мягкой и ливкій. Вполнѣ понятно, что въ почвѣ, а иногда и въ подпочвѣ ихъ, приходилось констатировать бурыя подпалины и даже зерна болотной руды.

Мощность этихъ почвъ сильно варьируетъ: сѣрыя разности, залегающія по недавно обсохшимъ днищамъ озеръ, наименѣе мощны—3—8"; черные солонцы лишь въ видѣ исключенія тоньше 10 и толще 30"; обыкновенно, мощность ихъ близка къ мощности черноземовъ. Вскапаніе нерѣдко начинается уже отъ поверхности, рѣже падаетъ до 10, тахит—до 12". По содержанію хлора эти солонцы вообще превосходятъ солонцы структурные; во многихъ изъ нихъ, кромѣ того, наибольшее содержаніе хлора приходится на поверхностный горизонтъ и убываетъ по направлению къ подпочвѣ; въ другихъ, болѣе выщелоченныхъ, почва бѣднѣе хлоромъ, чѣмъ подпочва.

Для примѣра можно привести нѣсколько опредѣленій хлора въ разныхъ горизонтахъ солонцовъ структурныхъ и безструктурныхъ.

Таблица 6.

Солонцы структурные.	Хлоръ.	Солонцы безструктурные.	Хлоръ.
574, гориз. А . .	0,002	312, гориз. А . .	1,038
574, гориз. С . .	0,026	312, гориз. С . .	0,296
542, гориз. А . .	0,001	541, гориз. А . .	0,627
542, гориз. С . .	0,039	541, гориз. С . .	0,483
572, гориз. А . .	0,009	571, гориз. А . .	0,328
572, гориз. С . .	0,170	571, гориз. С . .	0,222
613, гориз. А . .	0,007	604, гориз. А . .	0,410
613, гориз. С . .	0,363	604, гориз. С . .	0,145

Эта таблица во всякомъ случаѣ даеть нѣкоторое представлениe о варіаціяхъ въ содержаніи хлора въ различныхъ солонцахъ и въ различныхъ горизонтахъ одного и того же солонца.

Изъ 5 опредѣленій гумуса въ поверхностномъ горизонте безструктурныхъ солонцовъ его оказалось, въ четырехъ случаяхъ, 8—10%, а въ одномъ—около 20%; столь высокое содержаніе органическихъ веществъ въ этомъ образцѣ совпадаетъ съ своеобразнымъ характеромъ поверхности горизонта, въ которомъ отмѣчены тонкія прерывчатыя прослойки растительныхъ остатковъ, хотя въ настоящее время въ немъ ничего не растетъ, кромѣ рѣдкихъ экземпляровъ трехъ солянокъ (см. описание № 337); въ другихъ случаяхъ этого нѣтъ, растительность тоже слабая, и даже цвѣтъ поверхностного горизонта не очень темный (напр. въ № 551 и 571) и тѣмъ не менѣе содержаніе гумуса—значительно.

Растительность безструктурныхъ солонцовъ тѣмъ бѣднѣе, чѣмъ богаче солью данная почвы; чѣмъ меньше солей, тѣмъ больше появляется болотныхъ растеній; большее или меньшее развитіе растительного ковра зависитъ, однако, не только отъ солености почвы, а и отъ характера водоснабженія; если бы почвы эти были плохо снабжены водой, на нихъ не могли бы развиваться, вѣроятно, и такія формы, какъ *Salicornia*. И при большемъ содержаніи солей въ почвѣ растительность чувствуетъ себя еще довольно сносно, если уровень почвенныхъ водъ стоитъ высоко.

По способу происхожденія солонцеватыя почвы различны: либо онѣ образуются на породахъ уже богатыхъ солями (какъ напр., въ днищахъ высохшихъ соленыхъ озеръ), либо материнская порода ихъ обогащается солями лишь вслѣдствіе благопріятныхъ условій залеганія; этому обстоятельству, однако, нѣть основаній придавать значеніе въ классификациіи солонцовъ, ибо и въ томъ, и въ другомъ случаѣ различны по структурнымъ особенностямъ разности могутъ находиться рядомъ. Такъ напр., солонцы № 531 и 534 собраны въ одной и той же «переймѣ»; солонцы 571 и 572 лежать въ 3 саженяхъ другъ отъ друга. Очевидно, структурнымъ особенностямъ въ классификациіи солонцовъ должно отдать предпочтеніе передъ всѣми другими признаками.—Превращаются ли солонцы въ концѣ концовъ въ какія нибудь другія почвы съ теченіемъ времени—въ точности неизвѣстно. Начавшееся выщелачиваніе ихъ, о которомъ можно заключить по возрастанію содержанія солей съ глубиною, совпадаетъ съ подзолообразовательными процессами, которые имѣютъ мѣсто какъ въ солонцахъ безструктурныхъ (см. ниже обѣ анализы № 551), такъ и структурныхъ; въ тѣхъ и другихъ подзолообразованіе можетъ выразиться въ рѣзкихъ наружныхъ признакахъ (образованіе на поверхности солонца песчанистой или подзолистой корки для безструктурныхъ солонцовъ замѣчено мною лишь въ описываемаго района, уже въ области каштановыхъ почвъ; корка эта содержитъ ничтожныя ко-

личества хлористыхъ солей по сравненію съ подпочвой).

Въ заключеніе остается сказать, что вопреки моей прежней терминологіи (см. «о коллекціи почвъ Тобольской губ.», Тобольскъ, 1895), я не счелъ возможнымъ выдѣлять «подсолонки», т.-е. болѣе или менѣе выщелоченные структурные солонцы, въ особый сортъ почвъ, тѣмъ болѣе, что у населенія подъ именемъ подсолонковъ слывутъ и структурные, и безструктурные солонцы, если съ поверхности они выщелочены и допускаютъ сносное развитіе растительности.

а. Структурные солонцы.

№ 301. Около Верх. Алабуги, Курган. уѣзда, на церковной землѣ. Солонцеватое пятно посреди березняка; очень рѣдкія дерновинки *Festuca sulcata*; $A=2"$ —сѣрая песчанистая корка; $B+B_1=12"$; $B=5"$, столбчатъ, черносѣрого цвета, диаметръ столбовъ около 2". Въ С—свѣтлобурый связный суглинокъ, книзу дѣлающійся супесчанымъ; уже въ гориз. Въ содержитъ 0,011% Cl, въ С-же—0,100%; поверхностное вскипаніе.

№ 310. Въ 7 в. отъ Першина, по дор. въ Доможирову, Курган. уѣзда, дерновины *Festuca sulcata* и нѣк. др. степныхъ злаковъ; примѣсь *Statice Gmelini*; рѣдкая и низкая растительность. $A'+A=$ ок. 6"; $B+B_1=11$; $B=6$, столбчатъ, столбы до 4" въ диаметрѣ, въ разломѣ черные; вскипаніе съ 12"; въ подпочвѣ свѣтлокаштановый суглинокъ съ выцвѣтами солей и кротовинами.

№ 612. Г. Курганъ, около городской березовой рощи. $A'+A=8"$ —оподзоленный слой, бѣлѣюшій книзу; $B=12"$ —столбчатый слой, болѣе темнаго цвета; оподзоленная разность структурного солонца (С).

№ 492. Въ 2 в. къ З отъ Лопатинскаго, Курган. уѣзда, по дорогѣ къ оз. Б. Невидимъ, въ молодомъ осиново-березовомъ колкѣ. $A'+A=4"$ —оподзоленный; $B=5"$, черный, орѣховатый. Вскипаніе уже съ глубины 15"; хлора въ гориз. Въ меньше 0,01%. Повидимому, должно быть отнесено къ оподзоленнымъ структурнымъ солонцамъ (3).

№ 607. Въ межѣ с. Введенскаго, близъ д. Старосидоровой, Курган. уѣзда. Солонцеватое почти голое пятно между увалами въ высокой мѣстности. $A'+A=10$, вверху съ темной коркой, книзу свѣтлѣеть; $B=16"$ —столбчатый, окрашенъ темнѣе, чѣмъ А. Съ четвертымъ по вѣсу количествомъ воды изъ гориз. А и Въ образуется вязкая, съ трудомъ переливающаяся и не отстаивающаяся, масса съ щелочной реакцией. Вытяжка изъ С легкѣ отстаетъ и имѣетъ реакцію нейтральную. Хлора въ Съ содержитъ меньше 0,01% (С).

№ 369. Въ 12 в. отъ д. Долгой къ Казаркинскому, Курганскаго уѣзда, слабое пониженіе на гривѣ; рѣдкотравный степной участокъ.

$A+B+B'=17''$; $A=5$; $B=7''$, столбчатый; более темный, чѣмъ А; выцвѣты солей и вскипаніе—уже съ 10''. Хлора въ подпочвѣ содержится 0,138%. Темное окрашиваніе горизонта А и отсутствіе солонцовыхъ видовъ сближаетъ эту почву съ солонцеватыми разностями черноземовъ.

№ 534. Въ 2 в. къ С отъ д. Малиновой, Ишимск. уѣзда, ровная низменная перейма, покрытая довольно густою растительностью; изъ злаковъ много *Atropis festucaeformis*; солонцовая, степная и луговая формы. $A'+A+B=16''$; $A'=3''$, довольно рыхлый, сѣрий, супесчаный; $A=5''$, столбчатъ съ выцвѣтами невскипающихъ солей. Въ почвѣ и подпочвѣ—корневища *Arundo*, почти сплошь уже отмершія, а на поверхности этого растенія не замѣтно. Вскипаніе съ 7''; на 87'' въ подпочвенномъ свѣтлобуромъ суглинкѣ стоитъ вода (іюль 1896 г.).

№ 542. Въ 6 в. на СВ отъ Сладковскаго, Ишимск. уѣзда, по дор. въ дер. Остропятову. Сѣверный склонъ гравы, рядомъ съ пашней. Лугово-льсная растительность съ примѣсью *Statice Gmelini*. $A+B+B_1=27''$. $A=4$, $B=13''$ столбчатый, более темный, чѣмъ А, диаметръ столбовъ до 4'', вскипаніе съ 12''; хлора въ А—только 0,001, въ С—0,039% (3).

№ 613. На 12-й в. отъ Голышмановой къ Малышевой, Ишимск. уѣзда, подсолоночный лугъ среди березняковъ. Изъ солонцовыхъ формъ отмѣчены: *Cirsium esculentum*, *Mililotus dentatus*. $A'+A=8''$ —столбчатъ; $B=6''$. Въ водной вытяжкѣ изъ столбчатаго горизонта (съ глубины 4—10 см), имѣющей щелочную реакцію, хлора обнаружено менѣе 0,01; а въ вытяжкѣ изъ гориз. С (съ глуб. 50—55 см) уже 0,363% (С).

№ 615. Въ 3 в. отъ д. Пономаревой, Ялуторовскаго уѣзда, въ долинѣ Тобола; мѣстность эта изрѣдка заливается; солонецъ съ рѣдкой растительностью (есть *Atropis distans*); $A'+A=8''$, столбчатый горизонтъ; $B=12''$; водная вытяжка изъ А (съ пятернымъ количествомъ) воды образуетъ густую, не отстаивающуюся массу. Реакція вытяжекъ изъ А и С—щелочная (Н).

№ 555. Въ 1 в. на СВ отъ д. Осиновой, по дор. изъ Большепесчанскаго, Тюкал. уѣзда, поляна между колками; лугово-льсная растительность съ примѣсью *Statice Gmelini* и *Artemisia maritima*. $A+B+B_1=25''$; $A=5$, $B=5''$, столбчатъ, диаметръ столбовъ до 3; вскипаніе и выцвѣты солей съ 15''; хлора въ подпочвѣ 0,037% (3).

№ 336. Въ 3 в. отъ Орловой, по дор. изъ Камышенки, Тюкал. уѣзда, лугъ между колками съ густой растительностью изъ смѣси степныхъ и лугово-льсныхъ формъ. $A+B=16''$, $B=10''$, столбчатъ, темнѣе А; въ подпочвенномъ желтобуромъ суглинкѣ появляются при высыханіи выцвѣты. Вскипаніе обнаружено лишь въ подпочвѣ, въ которой содержание Cl—0,036%.

№ 339. На 4-й в. отъ Тюкалинска, по дор. въ Андронкину, близъ оз. Березина, рѣдкотравный степной участокъ, на которомъ кое-гдѣ и солонцовые виды. Мощность всей почвы=21", А=2", В=7"—столбчатый; вскипаніе съ 14"; въ подпочвенномъ суглинкѣ—соляные гнѣзда; хлора въ подпочвѣ—0,021%.

№ 358. На 10-й в. отъ Кибурлы къ Ниж.-Омской, Тюкалинского уѣзда, густая растительность изъ смѣси луговольсныхъ и степныхъ формъ; кругомъ березовые колки. А'+А+В=18"; В=12", столбчатъ въ верхней части. Вскипаніе съ 10"; въ подпочвенномъ суглинкѣ выцвѣты солей. Можетъ быть отнесенъ и къ солонц. разностямъ черноземовъ.

№ 356. Въ 5 в. отъ Лагушекъ, по дор. въ Куликовское, Тюкал. уѣзда, очень рѣдкотравный степной участокъ на окраинѣ займища Ди-чиннаго. А+В=19—27; В=11—19, вверху столбчатъ и окрашены темнѣе А; соляные гнѣзда начинаются уже въ А; вскипаніе съ 6", хлора въ подпочвѣ—0,074%.

№ 350. Въ 4 в. отъ Оконишникова, по дор. въ Камышенку, Тюкалинского уѣзда, окраинная часть бересового колка, луговольсная растительность. А+В+В'=21"; А=7"—мѣстами съ подзолистыми пятнами; В вверху столбчатъ; вскипаніе съ 21", хлора въ подпочвѣ—0,037%.

№ 574. Въ 1/2 в. на В отъ южнаго конца оз. Чулмана, на сѣверной окраинѣ Голодной степи (Покровск. вол., Тюкал. уѣзда). Рѣдкотравье; изъ злаковъ главн. обр. *Festuca sulcata*, *Galatella punctata*, *Artemisia pontica* и *rupestris*, различныя степныя. А+В+В'=18"; В+В'=12", столбчатъ; вскипаніе уже на 8". Хлора въ А—всего 0,002%, въ С—0,026%.

№ 572. Въ 3 в. къ СЗ отъ Крестиковъ, Тюкал. уѣзда, подъ уваломъ близъ оз. Горькаго. Рѣдкотравный участокъ, покрытый *Festuca sulcata* съ примѣсью *Stipa capillata* и даже *Avena desertorum*, *Statice Gmelini*, *Saussurea amara*. А+В+В'=16", А=4, В=6", столбчатъ; вскипаніе съ 8", соляныхъ гнѣздъ въ почвѣ нѣтъ. Въ А хлора содержится меньше 0,01, въ В=0,020, въ С—0,170 и лишь на глубинѣ 68"—0,227%. Взять въ 3 саж. отъ № 571 (см. ниже).

3. Безструктурные солонцы.

№ 604. Въ межѣ с. Введенскаго, близъ д. Старосидоровой, Курганск. уѣзда, солонцеватая низина подъ уваломъ (въ 80 саж. отъ солонцеватаго чернозема № 603); типичная солонцеватая растительность: *Artemisia maritima*, *Hordeum pratense*, *Statice Gmelini*, *Elymus dasystachys*. А=8"—«гнилая земля», по мѣстному выражению—сѣрий разсыпчатый слой съ бѣловатыми прожилками, какъ-бы плѣсенью (взять

съ глуб. 8—10 см); В=24"—болѣе темноцвѣтный, но тоже безструктурный (съ глуб. 20—30 см; С взята на глуб. 80 см). Содержаніе Cl и веществъ, извлекаемыхъ водой, въ разныхъ горизонтахъ слѣдующее:

	гор. А	гор. В	гор. С
Экстракт. вещества (высуш. при 110° С)	4,64%	—	1,02
Хлоръ	0,410	0,343	0,145

нº 600. Въ той же низинѣ, что и предыдущій; очень напоминаетъ его по виду, но мощность гораздо меньше; А+В=20"; хлора въ гориз. А=0,022%, въ гориз. С—слѣды. Яма этого образца находится дальше отъ увала и потому, можетъ быть, поверхностный слой мало обогащенъ солями.

нº 312. Въ 24 в. отъ Моревскаго, по дор. въ Арлагуль, Курган. уѣзда, солонцеватая низменность, покрытая *Statice caspia*, *Statice Gmelini* и др. солянками. А+В=22"; гнѣзда солей и конкреціи болотной руды въ подпочвенномъ суглинкѣ. Поверхностный горизонтъ почвы, повидимому, слоистъ. Вскипаніе поверхностное. Въ А—1,038, въ С—0,296% Cl.

нº 494. Въ 9—10 в. къ З отъ Лопатинскаго, Курган. уѣзда, на восточной сторонѣ оз. Б. Невидимъ, низменная солонцеватая мѣстность; частное пониженіе, заросшее камышомъ. А+В=13"; верхняя часть почвы торфяниста, книзу много невскипающихъ бѣлыхъ выцвѣтовъ; вскипаніе только съ 12". Въ С—0,211% Cl (3).

нº 497. На восточной сторонѣ оз. Б. Невидимъ, верстахъ въ 14—15 отъ с. Лопатинскаго, Курган. уѣзда, надъ старымъ «зарѣзомъ» озера; рѣдкотравье; виды степные преобладаютъ надъ солонцовыми (*Statice Gmelini* и *Saussurea amara*). А+В=23", книзу въ почвѣ и подпочвѣ—соляные гнѣзда; вскипаніе начинается мѣстами уже съ 3".

нº 493. Въ 1 в. на З отъ д. Худяковой, Курган. уѣзда. Почти голый солонецъ съ бѣлой коркой; А+В=9"; вскипаніе отъ поверхности (3).

нº 531. Въ 5—6 в. на В отъ с. Сладковскаго, Ишимск. уѣзда, по дорогѣ въ Катайское, перейма между озерами, покрытая густою растительностью съ значительной примѣсью солонцовыхъ формъ. А+В=20"; въ С—0,252% Cl; соляные гнѣзда уже въ А, вскипаніе поверхностное.

нº 541. Въ 2-хъ в. на ЮВ отъ Сладковскаго, по дор. въ Дубровную, Ишимск. уѣзда, солонецъ между колками, покрытый мясистыми солянками, *Statice Gmelini* и *Artemisia maritima*. А'+А+В=28"; В=15, съ бурыми пятнами. Много соляныхъ гнѣздъ. Вскипаніе поверхностное. Въ А содержится 0,627, въ С—0,483% Cl (3).

нº 543. Въ 9 в. на СВ отъ Сладковскаго, по дор. въ Остропятову,

Ишимск. уѣзда, поляна между колками. Нетипичная растительность. $A+B=18$; $B=9''$, съ бурыми пятнами и выцвѣтами солей, вскипает; въ А вскипанія нѣтъ (3).

№ 545. Въ 200 саж. на СВ отъ Сладковского, Ишимск. уѣзда, ровная мѣстность, покрытая солонцовыми формами, между которыми много *Statice Gmelini*. $A'+A+B=24''$; горизонтовъ различить нельзя, ибо бурыя глинистые партии начинаются отъ самой поверхности. Вскипаніе съ 9'' (3).

№ 544. Въ 2-хъ в. на ЮЗ отъ Остропятовой, ровная низина, покрытая мясистыми солянками; кругомъ камыши. $A+B=21''$; $B=9$, появляются бурыя партии подпочвенного суглинка; въ А—кусочки гнилой древесины. Вскипаніе съ 9'' (3).

№ 536. Въ 2 в. на СВ отъ д. Щербаковой, Ишимск. уѣзда, поляна между колками, покрытая луговолѣсными формами съ примѣсью многихъ экземпляровъ *Statice Gmelini*. $A+B=17''$, $B=9$; вскипаніе съ 6'' (3).

№ 551. Въ 4 в. къ Ю отъ Остропятовой и въ 3 в. къ С отъ д. Малиновой, Ишимск. уѣзда, рядомъ съ пашней, мѣстность чуть повыше переймы, гдѣ взята № 534. Растительность содержитъ много солонцовыхъ элементовъ; даже въ пшеницѣ, выдающейся плохимъ развитиемъ, растутъ: *Statice Gmelini*, *Plantago Cornuti*, *Saussurea amara*; $A+B=15$; $B=7''$; выцвѣты невскипающихъ солей уже на 6—7'', а вскипаніе только съ 10''; въ подпочвенномъ суглинкѣ своеобразныя черные включения. Цвѣтъ А болѣе слабый, нежели у настоящихъ черныхъ солонцовъ. Въ подпочвѣ опредѣлено 0,206% Cl.

№ 614. Поскотина с. Аромашевского, Ишимск. уѣзда, солонецъ въ сырой котловинѣ; есть *Cirsium esculentum*. $A+B=24''$ —сѣрый безструктурный. Въ гориз. А констатировано 0,024% Cl, въ С (на глуб. 60 см)—меньше 0,01 (С).

№ 616. Около д. Пономаревой, Ялутор. уѣзда, въ долинѣ Тобола; есть *Statice Gmelini*. $A+B=22—26''$, сѣрый, безструктурный; содержание Cl во всѣхъ горизонтахъ—меньше 0,01% (Н).

№ 387. На 15-й в. отъ Кусеряка, Тобольск. уѣзда, по дорогѣ въ Чистяки, слабое пониженіе между березовыми колками; довольно густая трава, много характерныхъ солонцовыхъ формъ. $A=12''$, черный, липкий, съ выцвѣтами солей, корневищами камыша и рыжими подпалинами. $B=7$ —сѣрый. Въ С—свѣтлосѣрый, плотный суглинокъ съ бурыми подпалинами. Вскипаніе съ 11'', приблизительно съ этой же глубины выступаетъ и вода.

№ 556. Въ 4½ в. на С отъ Большепесчанского, Тюкаль. уѣзда, легкое междугривное пониженіе, покрытое довольно высокой травой; много экземпляровъ *Statice Gmelini*, *Artemisia rupestris* и *A. roptica*.

$A+B=20''$, въ В (8'') перегнойная окраска проникаетъ внизъ клиньями; въ А—соляные гнѣзда и вскипаніе съ 5''. Въ А содержится 0,035, въ С—0,078 и въ С на глубинѣ 76''—0,063% хлора.

№ 341. Въ 18 в. отъ Андронкиной къ Бекишеву, Тюкалинскаго уѣзда, поляна между колками, покрытая нетипичной растительностью изъ степныхъ и луговольсныхъ формъ со *Statice Gmelini*, *Artemisia rupestris*, *Galatella punctata*. $A+B=24''$; $B=10''$; мелкие соляные выцвѣты уже въ А, вскипаніе съ 4''.

№ 337. Въ 4 в. отъ Крутихи въ Колмакову, Тюкал. уѣзда, маленькое возвышеніе посреди чернаго солонца, покрытое рѣдкими экземплярами *Salicornia herbacea*, *Suaeda corniculata*, *Obione pedunculata*; $A+B=13''$; $B=5$. Въ верхней части гор. А прерывчатыя прослойки растительныхъ остатковъ и мелкая гнѣзда невскипающихъ солей; вскипаніе только съ 5'', слабое; въ подпочвѣ крупныя гнѣзда солей, но вскипаніе тоже слабое; есть зерна болотной руды.

№ 363. Въ 25 в. отъ Баженовскаго, по дор. въ Нагибино, Тюкал. уѣзда, поляна между колками, покрытая луговольсными съ примѣсью *Statice Gmelini*, *Artemisia maritima* и *rupestris*, *Galatella punctata*, *Alopecurus arundinaceus*. $A+B=15''$; $B=4\frac{1}{2}''$ —перегнойная окраска проникаетъ вглубь клиньями; вскипаніе съ 10''. Представляетъ переходъ къ структурнымъ солонцамъ, ибо въ нижней части гориз. А имѣть почти столбчатую структуру.

№ 353. На сѣв. берегу оз. Васькина, къ югу отъ Крестиковъ, Тюкал. уѣзда, верстахъ въ 2—2 $\frac{1}{2}$ отъ пояса камышей на этомъ озерѣ и верстахъ въ 2 къ Ю отъ послѣдняго березового колка, близъ окраины Голодной степи. Весьма рѣдкая степная растительность, въ коей есть *Stipa capillata* и *Avena desertorum*; много *Artemisia maritima*. $A+B=18''$, $B=12''$, съ неясно выраженной столбчатой структурой. Вскипаніе уже съ 5'', а выцвѣты солей лишь въ подпочвѣ. Переходнаго характера (къ структурнымъ солонцамъ).

№ 517. На сѣв. берегу оз. Каменного, въ 2 в. къ ЮЗ отъ д. Мартиной, Курган. уѣзда, надъ старымъ «зарѣзомъ» и саж. во 100 отъ теперешняго «стекла» озера. Солонецъ, покрытый *Atropis festucaeformis*, *Statice Gmelini*, *Artemisia maritima* и *Saussurea amara*. $A+B=3''$, сѣроватый, песчанистый, съ бурыми подпалинами и мелкими соляными гнѣздами; С—болѣе крупный желтоватый песокъ съ подпалинами и гнѣздами солей; подъ нимъ начинается погребенный слой сѣрой суглинистой почвы въ 6'', опять съ гнѣздами солей, который переходитъ постепенно въ сѣроватобурый суглинокъ. Такимъ образомъ, здѣсь песчаный солонецъ покрываетъ обычный сѣрый. Вскипаніе отъ поверхности. Хлора въ А содержится меньше 0,01%.

№ 571. Въ 3 в. къ СЗ отъ Крестиковъ, Тюкал. уѣзда, нѣсколько

выпуклый злой солонецъ подъ уваломъ у оз. Горькаго. Рѣдкая растительность изъ *Salicornia herbacea*, *Petrosimonia monandra*, *Frankenia hispida*, *Atropis distans*, *Statice caspia*. $A+B=6''$. Есть поверхностные выцвѣты соли. Вскипаніе поверхностное; вода встрѣчена на 50'' отъ поверхности (августъ 1896 г.). Въ А содержится 0,328, въ С—0,222% хлора.

н° 576. Въ 1 в. къ Ю отъ южнаго конца оз. Чулмана, уже въ Голодной степи (Покровск. вол. Тюкалин. уѣзда); ровная мѣстность, покрытая низкой и рѣдкой растительностью, состоящей главнымъ образомъ изъ *Festuca sulcata*, *Galatella punctata*, *Artemisia maritima*, *Melilotus dentatus*, *Plantago Cornuti*, *Triticum ramosum*; рѣзкія солянки отсутствуютъ. $A+B=3''$; мѣстами вскипаніе уже на поверхности.

н° 352. На сѣв. берегу оз. Васькина къ Ю отъ Крестиковъ, Тюкалин. уѣзда, въ $\frac{1}{2}$ в. отъ пояса камышей, въ Голодной степи. Рѣдкая, но довольно высокая растительность, много *Festuca sulcata*, *Artemisia maritima* и *rupestris*; затѣмъ: *Statice caspia* и *St. Gmelini*, *Lepidium latifolium*, *Aster Tripolium*, *Astragalus sulcatus*, *Galatella punctata*, *Galium verum* и нѣк. др. степныхъ и солонцовыя формы. $A+B=8''$; вскипаніе поверхностное; вода выступаетъ уже на 12''.

ПОДЗОЛИСТЫЯ ПОЧВЫ.

Почвы этого типа составляютъ вполнѣ естественную группу, которая съ химической точки зрѣнія характеризуется обогащеніемъ почвенного горизонта пылеобразнымъ кремнеземомъ; это обогащеніе происходитъ насчетъ разложенія силикатныхъ соединеній материнской породы (главнымъ образомъ—цеолитовъ) подъ вліяніемъ нѣкоторыхъ перегнойныхъ кислотъ, образующихъ съ основаніями цеолитовъ болѣе или менѣе растворимыя соли; соли эти выносятся въ глубже лежащіе горизонты, а слой почвы, охваченный подзолообразованіемъ, обогащается лишь пылеобразнымъ кремнеземомъ, отъ которого и пріобрѣтаетъ сѣробѣлый или каштаново-сѣрый цвѣтъ и мучнистую консистенцію. Присутствіе такого подзолистаго горизонта является признакомъ, общимъ для всѣхъ подзолистыхъ почвъ, которыхъ въ другихъ отношеніяхъ могутъ быть различны въ зависимости отъ: 1) интенсивности подзолообразовательного процесса, 2) его локализаціи и 3) характера материнской породы.

Въ природѣ встрѣчаются почвы въ различныхъ степеняхъ оподзоливанія. Начальную стадію этого процесса мы имѣемъ уже въ сѣрыхъ суглинкахъ Европейской Россіи, гдѣ вѣтъ еще специального подзолистаго горизонта, но гдѣ уже появляются «бѣлясопепельные примазки» на наружныхъ поверхностяхъ орѣховатыхъ отдѣльностей горизонта В. Дальнѣйшая стадія оподзоливанія проявляется въ тѣхъ почвахъ, гдѣ ко-

личество этого бѣлясопепельного вещества уже болѣе значительно, при чёмъ процессъ локализируется главнымъ образомъ въ верхней части горизонта В, гдѣ появляется болѣе или менѣе тонкая подзолистая прослойка; книзу сохраняется еще орѣховатость, но орѣшки уже сильно окутаны пылеобразнымъ кремнеземомъ; при этомъ верхній горизонтъ почвы имѣеть болѣе или менѣе интенсивный сѣрий цвѣтъ и не обнаруживаетъ такой выщелоченности, какъ подзолистый горизонтъ В. Между этими почвами, которые должны быть названы подзолистыми суглинками, и суглинками сѣрыми въ природѣ не существуетъ границы; съ другой стороны, нѣть границы и между подзолистыми суглинками и настоящими подзолами, которые отличаются отъ предыдущихъ лишь болѣе сильнымъ развитиемъ подзолистаго слоя. Процессъ подзолообразованія въ подзолахъ прошелъ дальше всего и нерѣдко охватилъ всю толщу почвы, такъ что нельзя отличить особаго горизонта А; рѣже этотъ горизонтъ имѣется, но въ такомъ случаѣ его перегнойная окраска слабѣе, чѣмъ въ типичныхъ подзолистыхъ суглинкахъ. Иногда встречаются и такие подзолы, у которыхъ характерный для нихъ процессъ охватилъ только верхній горизонтъ; переходный же горизонтъ такихъ почвъ отличается болѣе интенсивной окраской и дѣйствительно содержитъ перегноя болѣе, чѣмъ верхній (анализы приведены ниже); кверху и книзу этотъ темноокрашенный слой постепенно переходитъ въ подзолъ и въ подпочву. Эта разновидность подзоловъ встрѣчена нѣсколько разъ на югѣ Тобольской губ. и залегаетъ всегда въ мѣстахъ болѣе влажныхъ, чѣмъ обычные подзолы. Материнская ея порода отличается по наружнымъ признакамъ отъ обычныхъ подпочвъ подзоловъ въ этой мѣстности; въ изслѣдованныхъ случаяхъ изъ этой породы уже на глубинѣ 3—5 футовъ выступаетъ вода. Повидимому, эти подзолы представляютъ лишь стадію оподзоливанія ранѣе образовавшихся темноцвѣтныхъ почвъ, относительно характера которыхъ я въ настоящее время не могу высказать ничего опредѣленнаго.

Различный составъ материнской породы обусловливаетъ большую или меньшую супесчанистость подзолистыхъ почвъ, такъ что можно еще отличать подзолистыя супеси; эти послѣднія характеризуются болѣе примѣсью крупныхъ песчаныхъ частицъ, чѣмъ въ подзолистыхъ суглинкахъ и подзолахъ.

Мощность подзолистыхъ почвъ довольно разнообразна, но вообще невелика; такъ, напр., большинство типичныхъ подзоловъ юга Тобольской губ. имѣютъ всего 6—12" въ толщину; подзолистыя почвы толще 20" встрѣчены были лишь около с. Самарова, Тобольского уѣзда, гдѣ они залегаютъ на своеобразныхъ тонкосупесчаныхъ суглинкахъ.

Материнской породой для большей части подзоловъ въ области чернозема являются лессовидные суглинки, которые подъ подзолами прі-

обрѣтаютъ болѣе или менѣе интенсивную бурую окраску и орѣховатое сложеніе; книзу такой бурый суглинокъ обыкновенно болѣе или менѣе быстро желтѣеть и становится неотличимымъ отъ подпочвы сосѣднихъ черноземовъ, при чмъ въ немъ иногда уже съ глубины около $2\frac{1}{2}$ футовъ появляются и выцвѣты углесолей; чаще же вскипающій горизонтъ опускается ниже 30". Внѣ области чернозема материнской породой для подзолистыхъ почвъ является бурые суглинки, болѣе или менѣе супесчаные.

Растительность подзолистыхъ почвъ—лѣсная. На сѣверѣ на подзолистыхъ почвахъ развиты таежные лѣса изъ ели, пихты, кедра, иногда съ примѣсью сосны, рѣже березняки; въ области чернозема подзолистыя почвы покрыты березняками съ примѣсью осины. Травянистая растительность на сѣверѣ имѣть болѣе или менѣе рѣзкій лѣсной характеръ, а на югѣ въ березнякахъ попадается много чисто степныхъ формъ, а формы лѣсныхъ почти совсѣмъ исчезаютъ.

Подзолистыя почвы отличаются широкимъ распространеніемъ въ Тобольской губ. Впѣ области чернозема онѣ играютъ, повидимому, главную роль въ почвенномъ покровѣ страны; въ области чернозема онѣ попадаются часто въ видѣ небольшихъ пятенъ, занимая, подобно солонцамъ, пониженные участки territori. Чаще всего встречаются онѣ по котловинкамъ среди чернозема, при чмъ иногда края котловинки заняты солонцеватыми почвами, а ея дно—подзоломъ.

Настоящіе подзолы разбросаны по всей территории и представляютъ наиболѣе частое явленіе между подзолистыми почвами; подзолистые суглинки появляются рѣже и при томъ главнымъ образомъ внѣ области чернозема; здѣсь они, можетъ быть, покрываютъ значительныя площади (напр., по высокому берегу Иртыша около Тобольска), но о распространеніи ихъ не имѣется до сихъ поръ сколько-ниб. подробныхъ свѣдѣній. Супесчаныя разновидности подзолистыхъ почвъ встрѣчаются promiscue съ суглинистыми.

Хотя между сѣрыми и подзолистыми суглинками въ природѣ нѣть никакой границы, однако удобнѣе перечислить сѣрые суглинки вмѣсть съ другими неподзолистыми почвами, и потому въ дальнѣйшемъ спискѣ приведены лишь почвы съ болѣе рѣзкимъ подзолистымъ характеромъ, т.-е. подзолы и подзолистыя супеси. Образцовъ, которые могли бы быть отнесены къ подзолистымъ суглинкамъ, въ данной коллекціи почти нѣть.

№ 386. На 3-й в. отъ Балахлея къ Кусеряку, Тобольского уѣзда, рѣдкій старый березнякъ въ уроцищѣ Куюкъ; слабая покатость къ оврагу съ задернованными стѣнками; сѣрый подзолистый суглинокъ, нетипичный. $A'=1\frac{1}{2}''$ —листв. войлокъ; $A+B=8''$; $B=4''$ —подзолистая

прослойка. Въ подпочвѣ—краснобурый орѣховатый суглинокъ.

№ 514. Въ 6 в. на СЗ отъ Куреинскаго, Курганскаго уѣзда, мелкій березнякъ въ понижениі на ЮВ окраинѣ Сорочьей степи; растительность луговая. $A' + A = 7"$, подзол, прослойка довольно темнаго оттѣнка, съ конкрециами и бурыми подпалинами. $B = 9"$, темносѣрый орѣховатый, связнѣе и темнѣе, чѣмъ А; въ С—сѣроватобурый липкій суглинокъ; вскипаніе появляется лишь съ 45".

№ 518. Въ 1 в. къ Ю отъ д. Шепериной, Курган. уѣзда, мелкій осинникъ на старой вырубкѣ въ междугривномъ понижениі; растительность лугово-лѣсная. $A' + A = 5—6"$,—свѣтлая подзолистая прослойка съ конкрециами; $B =$ въ среднемъ 9", темный, почти черный, орѣховатый. Подпочвенный суглинокъ, въ коемъ перегнойные протеки идутъ мѣстами до глубины 30", начинаетъ вскипать на 36".

№ 498. По дорогѣ изъ Куреинскаго въ д. Степную, Курган. уѣзда, въ 1-й в. отъ Степной; березнякъ съ ивнякомъ на днѣ котловинки, по бокамъ которой—солонцы. $A' + A = 7"$ —подзолистая прослойка; $B = 9"$ —почти черный, связный и орѣховатый, мѣстами съ ржавыми пятнами. Подпочвенный суглинокъ, тоже съ ржавыми подпалинами, не вскипаетъ еще на глубинѣ 26".

№ 324. Въ 1½ в. отъ дер. Жагриной, по дор. въ Безкамышную, Ишимск. уѣзда. Осинникъ съ примѣсью березы въ едва замѣтной котловинкѣ посреди ровной мѣстности. $A' + A = 12"$ —подзолистая прослойка, вверху ноздреватая, внизу съ конкрециами. $B = 3—6"$ (въ разныхъ мѣстахъ ямы), очень темный и связный. Въ грязнобуромъ подпочвенномъ суглинкѣ охристыя пятна.

№ 623. Въ 3 в. отъ с. Самаровскаго, Тобольск. уѣзда, на высокой стрѣлкѣ, раздѣляющей долины Иртыша и Оби; еловокедровый старый лѣсъ. $A' = 2½"$, моховой покровъ. $A = 6$, свѣтлокаштановый, очень мелкозернистый, съ бурыми подпалинами. $B = 15"$, безструктурный, сѣроватобѣлый, съ многочисленными мелкими ноздринами. С—бурый тонкосупесчаный суглинокъ съ подзолистыми затеками.

Примѣчаніе. Въ томъ же лѣсу въ другомъ мѣстѣ взять образецъ № 618, оказавшійся тождественнымъ съ предыдущимъ.

№ 381. На 21-й в. отъ Абалака на югъ, близъ д. Шевелевой, Тобольск. уѣзда. Окраина лѣса изъ березы, сосны, кедра, пихты. $A' + A + B = 10"$, подзолъ, довольно темнаго цвѣта.

№ 382. На 17-й в. отъ Куларовой къ Ашлыку, Тобольск. уѣзда, сосновка съ березой и елью. $A' + A + B = 12"$ —свѣтлокаштановый подзолъ съ мелкими конкрециами.

№ 384. На 4-й в. отъ слободы Черной къ Индерскимъ юртамъ, Тобольскаго уѣзда, лѣсъ изъ пихты, сосны, березы. $A' = 2—3$; $A = 5$ —свѣтлосѣрый; $B = 5"$ —еще свѣтлѣе, нѣсколько супесчанъ. Можетъ быть

отнесенъ и къ нетипичнымъ подзолистымъ суглинкамъ.

№ 491. Въ 2 в. на Ю отъ оз. Гладкова, въ Лопатинской вол., Курган. уѣзда, частное пониженіе на гривѣ, заросшее крутымъ березнякомъ и осинникомъ. $A' + A = 5"$ — сѣрый безструктурный; $B = 5$ — сѣровато-блѣлая подзолистая прослойка съ пластинчато-поздреватымъ сложеніемъ и множествомъ мелкихъ конкрецій. Въ подпочвѣ — несомнѣнныи элювій лессовиднаго суглинка.

№ 366. На 7-ї в. отъ Локтинскаго къ Пѣгановой, Ишимскаго уѣзда, осинникъ въ котловинѣ на небольшомъ увалѣ. $A' + A + B = 10"$, сѣровато-блѣлый подзолъ со многими конкреціями.

№ 392. Въ 1 в. къ СВ отъ г. Ишима, мелкій березнякъ въ легкомъ междугривномъ пониженіи. $A' + A + B = 9"$; A' — черный дерновый; вверху почва окрашена темнѣе, книзу блѣеть (образецъ взятъ въ 60 саж. отъ чернозема № 391).

№ 330. На 7-ї в. отъ Ларихинскаго, по дор. въ г. Ишимъ, березнякъ въ маленькой котловинѣ посреди черноземныхъ полей. $A' + A = 6"$; весьма темный, связный, крупичатый; $B = 9 - 10"$, вверху сѣрая, книзу блѣющая подзолистая прослойка съ дов. крупными конкреціями. Бурый подпочвенный суглинокъ книзу желтѣеть и переходитъ въ лессовидный. Этотъ образецъ, можетъ быть, представляетъ гомологъ оподзоленныхъ черноземовъ.

№ 510. Верстахъ въ 18 отъ с. Сладковскаго, Ишимск. уѣзда, по дор. въ д. Таволжанъ, въ березовомъ колкѣ. $A' + A + B = 16"$, свѣтлосѣрый подзолъ. На 18" вскипаніе не было констатировано (3).

№ 535. Въ 10 в. на В отъ с. Сладковскаго, по дор. въ Щербакову, Ишимск. уѣзда, въ такъ наз. Китайской рощѣ. $A + B = 7"$; $B = 4$ — подзолистая прослойка; вскипанія не констатировано на 17" (3).

№ 546. Въ 2 в. на З отъ с. Сладковскаго, Ишимскаго уѣзда, въ березовомъ колкѣ. $A' + A + B = 10"$; свѣтлосѣрый подзолъ со многими мелкими конкреціями (3).

№ 549. Въ 12 в. на СЗ отъ с. Сладковскаго, Ишимскаго уѣзда, въ березово-осиновомъ колкѣ. $A' + A + B = 7"$ — свѣтлосѣрый подзолъ съ мелкими конкреціями; на 18" вскипанія еще не констатировано (3).

№ 554. Въ 3 в. на С отъ Большепесчанскаго, Тюкалинскаго уѣзда, небольшое пониженіе на той же гривѣ, гдѣ взять черноземъ № 552; рѣдкій березово-осиновый колокъ съ луговольсною растительностью; много Galatella punctata; $A' + A = 7"$ — подзолистая прослойка; $B = 4"$ — немного темнѣе А, появляются глинистые партии. Подпочвенный красновато-бурый суглинокъ книзу желтѣеть и дюймовъ съ 30 становится неотличимымъ отъ лессовидной подпочвы соседнаго чернозема, а съ 32" онъ начинаетъ вскипать съ кислотой.

№ 557. Въ 100 саж. на СВ отъ д. Осиновой, по дор. изъ Большев-

песчанского, Тюкалин. уезда, опушка березового колка. $A' + A + B = 8''$ — съробѣлый подзолъ съ мелкими конкрециями. Вскапанія не констатировано на 20" (3).

нº 349. Въ 4 в. отъ Оконишникова, по дор. въ Камышную, Тюкалин. уезда, въ серединѣ березового колка, въ 30 саж. отъ обр. № 350. $A' + A + B = 12''$ — бѣловатый подзолъ типичнаго строенія; бурый подпочвенный суглинокъ книзу становится лессовиднымъ, но не вскипаетъ еще на 35".

нº 573. Верстахъ въ 5 къ СЗ отъ Крестиковъ, Тюкалин. уезда, березовый колокъ въ небольшомъ понижениі на увалѣ, занятомъ степью. Растительность лугово-льсная, съ примѣсью вѣкоторыхъ степныхъ формъ. $A' + A + B = 13''$; типичный подзолъ, но съ каштановымъ оттенкомъ; подпочвенный лессовидный суглинокъ свѣтлѣеть по мѣрѣ углубленія и вскипаетъ уже съ 27".

нº 589. Лѣвый высокій берегъ р. Оми въ 1-й в. отъ Куликовскаго, по дор. въ Таволжанку, Тюкал. уезда. Березовый колокъ въ частномъ понижениі. $A' + A + B = 10''$ — сърый подзолъ типичнаго строенія. Вскапанія на 15" не констатировано (3).

нº 594. Въ 1 в. на СЗ отъ с. Оконишникова, Тюкал. уезда, молодой березнякъ въ едва замѣтномъ понижениі местности. $A' + A + B = 7''$ — съробѣлый типичный подзолъ (3).

нº 597. Въ 8 в. на Ю отъ с. Оконишникова, по дор. въ Камышную, Тюкал. уезда, въ серединѣ березового колка. $A' + A + B = 6''$ — типичный подзолъ (3).

нº 591. Въ 3 в. на В отъ д. Лагушки, Тюкал. уезда, березовый колокъ въ небольшомъ понижениі. $A' + A + B = 6''$, подзолъ болѣе темнаго сѣраго цвѣта, чѣмъ обыкновенно (3).

нº 320. Въ 7 в. отъ Пѣтуховскаго, Ишимск. уезда, по дор. изъ Рынковъ, въ мелкомъ березнякѣ, посреди котораго растетъ *Stipa pennata*. $A' + A = 4\frac{1}{4}''$, темносѣрый, супесчаный; $B = 7\frac{1}{2}$, оподзоленный; супесчаный подпочвенный суглинокъ книзу желтѣеть, но еще на 25" вскипанія не констатировано.

нº 326. Въ 9 в. на С отъ с. Соколовскаго, Ишимск. уезда, окраина небольшой котловинки; старая залежь, покрытая *Stipa pennata*, *Veronica spuria*, *Plantago maxima*, *Potentilla bifurca*, *Artemisia pontica* etc. $A' + A = 5$, пахотный, сърый, супесчаный; $B = 7''$ — слабо оподзоленный слой.

нº 331. Въ 12 в. отъ г. Ишина, по дор. въ Ларихинское, березовый колокъ въ котловинѣ; $A' + A = 6\frac{1}{2}''$, сърый, супесчаный, $B = 8\frac{1}{2}''$, оподзоленный.

нº 334. Въ 4 в. отъ Тушнолобовой, по дор. въ Абатскую, Ишимск. уезда, березнякъ. $A' = 3''$, $A + B = 10$ — тонкая подзолистая супесь.

н° 539. Въ З в. на С отъ Сладковского, Ишимского уѣзда, мелкій березнякъ на небольшомъ увалѣ, рядомъ съ пашней. $A' + A = 7"$, свѣтлосѣрый, супесчаный; $B = 6"$, еще свѣтлѣе, оподзоленный; краснобурый орѣховатый подпочвенный суглинокъ книзу желтѣеть и вскипаетъ съ глубины 42".

ТЕМНОСѢРЫЯ И СѢРЫЯ ПОЧВЫ.

Почвы эти отличаются отъ подзолистыхъ отсутствиемъ подзолистаго горизонта и болѣе интенсивнымъ окрашиваніемъ поверхностнаго слоя. Сюда должны быть отнесены:

во 1-хъ, черноземовидные суглиники, которые представляютъ какъ бы недоразвитые черноземы и отличаются отъ послѣднихъ лишь меньшей мощностью, которая, напр., въ образцѣ н° 487 падаетъ до 9", обыкновенно же бываетъ больше, такъ что приходится совершенно условно отдѣлять эти суглиники отъ черноземовъ. Почвы эти образуются при спокойныхъ условіяхъ рельефа и потому малая ихъ мощность не зависитъ отъ смыванія.

во 2-хъ, сѣрые суглиники обыкновенно съ слабо выраженнымъ орѣховатымъ горизонтомъ, аналогичные сѣрымъ суглинкамъ Европейской Россіи. Какъ черноземовидные, такъ и сѣрые суглиники на югѣ Тобольской губ. не пользуются большимъ распространеніемъ; тѣ и другіе наблюдались въ березовыхъ лѣсахъ, главнымъ образомъ по окраинамъ чернозема, гдѣ этотъ послѣдній смѣняется подзолистыми почвами. Часто однако переходъ отъ чернозема къ подзолу очень быстръ, и потому эти почвы, представляющія по своимъ признакамъ нѣчто среднее между этими двумя крайними типами, не развиваются вовсе. Какъ кажется, чаще появляются сѣрые суглиники близъ сѣверной границы чернозема, встрѣчаясь и въ черноземной области (мнѣ случалось слышать, что на сѣверѣ Ишимского уѣзда такие сѣрые суглиники, а отчасти и нетипичные подзолистые, населеніе зоветъ «красиками» — въ отличіе отъ «бѣликовъ» или «бѣличныхъ земель» — ибо при пахотѣ обнаруживается иногда красноватобурая окраска ихъ подпочвы, а не бѣлый переходный горизонтъ, свойственный подзолистымъ почвамъ). Полное отдѣленіе черноземовидныхъ суглиновъ отъ сѣрыхъ невозможно, ибо интенсивность окраски варьируетъ въ значительной мѣрѣ. Особой области сѣрыхъ суглиновъ къ сѣверу отъ области чернозема въ Западной Сибири, по крайней мѣрѣ по моимъ маршрутамъ, нѣть: они попадаются здѣсь изолированными пятнами, перемежаясь съ обширными партіями подзолистыхъ почвъ. Н. Л. Скалозубовъ, впрочемъ, утверждаетъ, что въ Тобольской губ. есть полоса сѣрыхъ почвъ (см. «Опытъ естественно-историч. описанія Тобольской губерніи», Тобольскъ, 1899, стр. 17). Указанія

на почвы этого рода въ Ялуторовскомъ уѣздѣ есть въ статьѣ Г. Я. Назарова о Ялуторовскомъ уѣздѣ. (Тоб. губ. Вѣд. 1896 г.).

Въ этой же группѣ могутъ быть перечислены, въ 3 хъ, и два сорта почвъ болотныхъ, а именно:

а) иловатые суглинки, залегающіе по займищамъ, поросшимъ ивнякомъ, на несолонцеватыхъ аллювіальныхъ суглинкахъ; они безструктурны, съраго цвѣта, въ сыромъ состояніи весьма вязки и сильно мелкоземисты; бурыя подпалины встрѣчаются какъ въ почвѣ, такъ и въ подпочвѣ; растительность ихъ довольно бѣдна и состоитъ изъ мелкаго ивняка (*Salix rosmarinifolia?*) съ примѣсью разныхъ травянистыхъ болотныхъ формъ. Въ коллекціи имѣются образцы этихъ суглинковъ только изъ Тюкалинскаго уѣзда, но почвы эти небольшими пятнами по такъ назыв. аллапамъ встрѣчались мнѣ и въ другихъ южныхъ уѣздахъ Тобольской губ. Иловатые суглинки, несомнѣнно, имѣютъ сходство съ подзолами; они отличаются отъ нихъ лишь болѣе темнымъ сѣрымъ цвѣтомъ, подпочвой и близостью почвенныхъ водъ; отнести ихъ къ подзолистой группѣ не позволяетъ мнѣ лишь отсутствіе аналитического материала, безъ котораго нельзѧ утверждать, что и въ нихъ имѣть мѣсто процессъ подзолообразованія.

б) темные болотные суглинки, отличающіеся интенсивной перегнойной окраской, то почти совсѣмъ черной и въ свѣжемъ разрѣзѣ съ синеватымъ оттѣнкомъ, то черносѣрой. Они имѣютъ слабо выраженную крупичатую структуру и залегаютъ тоже на несолонцеватыхъ аллювіальныхъ суглинкахъ разной окраски; въ почвѣ, а иногда и въ подпочвѣ замѣчаются бурыя подпалины, рѣже и зерна болотной руды. Отъ безструктурныхъ солонцовъ они отличаются главнымъ образомъ отсутствіемъ значительного количества растворимыхъ солей. Они могутъ достигать большой мощности и несутъ довольно разнообразную растительность съ большей или меньшей примѣсью болотныхъ формъ. Въ Тобольскомъ уѣздѣ такія почвы мѣстами воздѣлываются и носятъ название «трунды». Въ южныхъ частяхъ губерніи почвы эти попадаются довольно рѣдко. Химическій ихъ характеръ до сихъ поръ совершенно не выясненъ. Въ заключеніе остается упомянуть, что, въ зависимости отъ характера подпочвы, имѣются супесчаныя разновидности сѣрыхъ и черноземовидныхъ суглинковъ.

Въ дальнѣйшемъ изложеніи перечислены отъ № 388 до № 362 темносѣрые и сѣрые суглинки и супеси, отъ № 357 до № 566 — иловатые суглинки и отъ № 529 до № 382 В — болотные суглинки.

№ 388. Въ 7 в. отъ Готопутовой, Ишимск. уѣзда, по дор. изъ Чистяковъ, мелкій березнякъ на небольшомъ увалѣ. A+B=15", A=8 — темносѣрый, B=7 — крупчато-орѣховатый; въ подпочвѣ — бурый, книзу желтѣющій суглинокъ.

№ 389. На 14-й в. отъ Готопутовой, по дорогѣ въ Малышеву, Ишимск. уѣзда, березовый лѣсъ на слабой восточной покатости. $A+A=8"$, сѣрый суглинокъ.

№ 307. Въ 1-й на В отъ Чашинскаго, Курган. уѣзда, окраина березового колка; $A'+A=5^{1/2}"$, сѣрый; $B=9"$, болѣе свѣтлый, крупичато-орѣховатый, съ пепельносѣрыми примазками.

№ 309. Въ 2 в. отъ Чимѣевскаго, по дор. въ Першино, Курган. уѣзда, опушка березняка; $A'+A=9$, темносѣрый, $B=6"$ —комковато-орѣховатый; желтовато-бурый подпочвенный суглинокъ не вскипаетъ еще на глубинѣ 25".

№ 487. Сѣверная часть такъ наз. Вохринской дубровы въ Лопатинской вол., Курган. уѣзда, гдѣ находятся выработки бѣлой глины. $A'+A+B=9$, черно-сѣрый, черноземовидный, крупичатый; въ подпочвѣ имѣется нетолстый (до 12") слой бураго элювія подлежащей бѣлой глины: какъ въ нижнемъ горизонте элювіального слоя, такъ и въ коренновой породѣ гибѣзда кристалловъ гипса; въ послѣдней дюймовъ съ 30 отъ поверхности появляются крупные округленные конкреции углекислой извести, но вскипаніе начинается уже съ 24".

№ 322. Второй островъ на соленомъ озерѣ Медвѣжьемъ въ 10 в. къ С отъ с. Пѣтуховскаго, Ишимск. уѣзда. Мелкій березнякъ, крупная береза и осина. $A+A=8"$, сѣрый суглинокъ, болѣе свѣтлаго оттенка, чѣмъ у предыдущихъ; $B=7"$ —слабо орѣховатъ.

№ 340. Въ 3 в. отъ Тюкалинска, по дор. въ Андронкину, березнякъ со многими степными формами. $A'+A=8$, черносѣрый, черноземовидный; $B=5$ —крупичато-орѣховатый.

№ 360. Въ 6 в. отъ Ситниковой, по дорогѣ въ Серебрянку, Тюкалин. уѣзда, опушка березняка; преобладаютъ лугово-льсныя формы. $A'+A=8$, темносѣрый суглинокъ, $B=7"$ —крупичато-орѣховатый; С—бурый, желѣзющій по мѣрѣ углубленія суглинокъ.

№ 598. Въ 13 в. отъ Оконишникова, по дор. въ Лагушкину, Тюкалинскаго уѣзда, опушка березового колка. $A'+A+B=8"$ —темносѣрый суглинокъ.

№ 483. Въ Вохринской дубровѣ близъ СЗ границы Сорочьей степи; рѣдкій и мелкій березнякъ со множествомъ степныхъ формъ. $A+B=5"$ —тонкозернистая сѣрая супесь на элювіи плотнаго сѣробѣлаго супесчанаго суглинка; вскипанія вѣтъ еще и на 28".

№ 488. На Рѣткинской гривѣ, къ Ю отъ с. Лопатинскаго, Курганскаго уѣзда, мелкій березнякъ со многими степными формами. $A+A+B=10"$ темносѣрая супесь на желтобуромъ супесчаномъ суглинокъ.

№ 503. Въ 18 в. отъ с. Лебяжьяго, по дор. въ Кривинское, Курганскаго уѣзда, осиново-березовый лѣсокъ на гривѣ. $A+B=11$, сѣрая супесь; гориз. В—болѣе свѣтлаго цвѣта, можетъ быть, оподзоленъ.

№ 550. Въ 9 в. къ В отъ Сладковского, Ишимск. уѣзда, близъ опушки такъ наз. Китайской рощи (приблизительно въ 1 в. къ ЮЗ отъ № 535); растительность луговольсная. $A' + A + B = 7$, каштаново-сѣрая супесь; въ подпочвенномъ желтобуромъ суглинкѣ вскипаніе и выцвѣты углесолей—съ 27".

№ 362. Въ 10 в. отъ Сибирской Саргатки, по дор. въ Посельскую, Тюкал. уѣзда, мелкій березнякъ рядомъ съ полемъ. $A + B = 10^{1/2}"$, тонкая сѣрая супесь.

№ 357. На 14-й в. отъ Юрьевского, по дор. въ Кибурлинское, Тюкал. уѣзда, клумбы кустарного ивняка, окруженные солонцомъ. Растительность изъ болотныхъ формъ съ примѣсью солонцовыхъ. $A' + A + B = 12"$. Сѣрий иловатый суглинокъ; въ подпочвѣ стоитъ вода.

№ 364. Въ 25 в. отъ Баженовского, по дор. въ Нагибино, Тюкалин. уѣзда, опушка лѣска изъ березы, осины и ивы; растительность состоитъ главн. образ. изъ луговольсныхъ формъ. $A' + A = 6"$ —сѣрий иловатый; $B = 9"$, болѣе темный и связный; въ подпочвенномъ сѣромъ суглинкѣ много зеренъ болотной руды; вскипанія нѣть еще на 28" (образецъ этотъ взять всего въ 8 саж. отъ чернаго солонца № 363 и залегаетъ ниже его; можетъ быть, онъ представляетъ оподзоленный болотный суглинокъ).

№ 566. Окраина займища Дичиннаго, въ 6 в. къ С отъ д. Лагушкиной, Тюкал. уѣзда, посреди клумбъ ивняка; растительность изъ смѣси луговольсныхъ и степныхъ видовъ. Кругомъ солонцы. $A' + A + B = 10"$ —сѣрий иловатый суглинокъ.

№ 529. Въ 7 в. отъ Аѳонина, по дор. въ Пелевину, Ишимского уѣзда, сырватый лугъ рядомъ съ березнякомъ; *Molinia coerulea*, *Parnassia palustris*, *Alopecurus arundinaceus*. $A + B = 13"$, темносѣрий, супесчаный. Въ подпочвѣ охристыя пятна и зерна болотной руды. Вскипаніе—уже съ 12".

№ 530. Въ 10 в. отъ Пелевиной, по дор. въ Сладковское, много *Filipendula Ulmaria*. $A = 6$, $B = 8$, темносѣрий суглинокъ; въ С—гнѣзда болотной руды.

№ 558. Въ 4 $^{1/2}$ в. къ С отъ Большепесчанского, Тюкал. уѣзда, и въ 30 саж. отъ солонца № 556, въ еще болѣе низкомъ мѣстѣ; рѣдкая береза и осина; солонцеватыхъ формъ почти нѣть. $A = 7$, черносѣрий, $B = 7$, сѣрѣ, со многими охристыми подпалинами, которые переходятъ и въ почвенный сѣребурый суглинокъ.

№ 383. Въ 2 в. отъ Копотиловой, Тобольск. уѣзда, по дор. въ сл. Черную. Высокій берегъ Вагая, рядомъ съ пашней, кругомъ ивняки. $A = 10$, черносѣрий, съ слабо выраженной круничатостью. $B = 6"$ сѣрий, орѣховатый. С—свѣтлосѣрий плотный суглинокъ съ многочисленными

бурыми подпалинами. Почва эта въ данномъ пункте погребена песчанымъ наносомъ въ 11".

н° 382 В. На 12-й в. отъ сл. Черной, Тобольск. уѣзда, къ Индерскимъ юртамъ, рядомъ съ пашней, сырватый лугъ, кругомъ группы ивняка. Черная съ вивіанитовымъ отѣнкомъ и бурыми подпалинами почва выше 26" мощностью.

ПЕСЧАНЫЯ ПОЧВЫ

въ южной части губ. встречаются лишь въ Курганскомъ уѣздѣ по Тоболу и его притокамъ; кое-гдѣ, какъ напр., около В. Алабуги, благодаря истребленію рошааго на нихъ бора, пески стали уже летучими. Въ Тобольскомъ уѣздѣ значительная песчаная пространства имѣются около Индерскихъ и Истяцкихъ юртъ и заняты здѣсь обширными борами. Почвы эти отличаются отъ всѣхъ прочихъ почвъ губерніи крупнозернистостью, малой мощностью и слабой окраской.

н° 385. Верстахъ въ 5—6 отъ Индерскихъ юртъ, Тобольского уѣзда, участокъ старого сосноваго бора. $A' = 2"$ — моховой покровъ. $A + B = 3 - 7$ — сѣрая песчаная почва.

н° 302. Въ 3 в. отъ Ялымы по дор. въ В. Алабугу, Курганского уѣзда, сосновый боръ. $A + B = 5"$.

н° 305. Въ 14 в. отъ г. Кургана, по дорогѣ въ Кошкину, мелкій березнякъ со степной растительностью; $A + B = 9"$.

н° 0. Въ 13 в. отъ с. Введенского, Курган. уѣзда, въ Илецко-Иковской казенной дачѣ. Поляна въ бору, покрытая *Stipa pennata*, *Koeleria cristata* и многими степными. $A + B = 5\frac{1}{2}"$, свѣтлосѣрый песокъ; въ подпочвенномъ желтомъ пескѣ вскипанія нѣть еще на 36".

В. О химическомъ составѣ почвъ южной части Тобольской губерніи.

До 90-хъ годовъ настоящаго столѣтія (XIX) имѣлось весьма мало свѣдѣній о химическомъ составѣ почвъ Тобольской губ., да и тѣ были вообще мало надежны, ибо имѣли чисто случайный характеръ. Въ 90-хъ годахъ было положено начало болѣе систематического изученія почвъ Западно-Сибирской равнины, когда сформированная подъ руководствомъ г. Краснопольского западно-сибирская горная партия произвела геологическія, а отчасти и почвенные изслѣдованія вдоль Великаго Сибирскаго пути между Челябинскомъ и Канскомъ. Хотя эти изслѣдованія имѣли характеръ попутный, однако, благодаря имъ, сталъ извѣстенъ общій характеръ почвенного покрова юга Тобольской губ., а также и нѣкоторыя химическія свойства черноземовъ и подзоловъ этой местности.

Не входя въ разборъ всѣхъ относящихся сюда показаній гг. Краснопольского и Высоцкаго¹⁾, я считаю нужнымъ остановиться лишь на нѣкоторыхъ пунктахъ. Изъ работы г. Высоцкаго видно, что черноземы въ изслѣдованной имъ мѣстности небогаты гумусомъ (4—7,7%); это показаніе не совсѣмъ сходится, напр., съ показаніями проф. Докучаева въ статьѣ: «Къ вопросу о сибирскомъ черноземѣ», гдѣ изъ четырехъ анализированныхъ г. Шешуковымъ (который дѣлалъ анализы и для г. Высоцкаго) почвъ въ трехъ содержаніе гумуса 10—13%; и изъ данныхъ, приводимыхъ ниже, тоже слѣдуетъ заключить, что столь незначительное содержаніе гумуса не является типичнымъ для тобольскихъ черноземовъ.

Далѣе, г. Высоцкій отличаетъ два типа черноземовъ: первый, увалльные черноземы, соотвѣтствуетъ моимъ лессовымъ; на основаніи неполныхъ химическихъ анализовъ авторъ счѣлъ возможнымъ сопоставить эти черноземы съ нѣкоторыми изъ «долинныхъ» черноземовъ Нижегородской и Полтавской губ. Второй типъ черноземовъ г. Высоцкій называетъ «переходными тяжелыми суглинками». Почвы эти превосходить почвы первого типа и по мощности, и по содержанію гумуса, цеолитныхъ основаній и глины. Тѣмъ не менѣе, авторъ признаетъ ихъ худшими, «что обусловливается ихъ большей глинистостью, структурой и гумусомъ водного происхожденія». Поэтому, г. Высоцкій находитъ возможнымъ параллелизовать ихъ уже не съ черноземами, а переходными къ чернозему тяжелыми суглинками. Такая параллелизациѣ основана, однако, главнымъ образомъ на ошибочномъ сопоставленіи аналитическихъ данныхъ; что же касается сухопутно-болотного генезиса этихъ почвъ, то и въ пользу его г. Высоцкій не приводить никакихъ убѣдительныхъ доводовъ. Если основываться только на данныхъ автора, то надо было бы заключить, что тобольские черноземы значительно уступаютъ европейскимъ. Такой выводъ, однако, становится мало убѣдительнымъ въ виду заключенія гг. Выдрина и Ростовскаго о томъ, что барабинскія почвы (въ районѣ, прилегающемъ къ району изслѣдованій западно-сибирской партии) «далеко оставляютъ за собою россійскіе черноземы по содержанію главнѣйшихъ почвенныхъ элементовъ»²⁾. Изъ данныхъ, которыя приводятся ниже, читатель можетъ убѣдиться, что и тобольские черноземы безъ натяжки выдерживаютъ сопоставленіе съ лучшими изъ европейскихъ.

Въ заключеніе слѣдуетъ отмѣтить еще, что г. Агафоновъ изслѣдовалъ нѣсколько образцовъ чернозема изъ Старосидоровой, Курганскаго уѣзда, доставленныхъ ему А. А. Балакшинымъ. Его опредѣленія каса-

¹⁾ Горн. Журн., 1894, т. 2.

²⁾ Выдринъ и Ростовскій. «Предвар. отчетъ по изслѣд. почвъ сѣв. части Алтайскаго окр.». Барнаулъ, 1896.

ются содержанія гумуса, механическаго состава и въкоторыхъ физическихъ свойствъ¹⁾).

Когда, послѣ первыхъ моихъ изслѣдованій въ Тобольской губерніи, выяснилась возможность ихъ продолженія въ 1896 г., было рѣшено часть экскурсионныхъ денегъ употребить на химическіе анализы почвъ. Изъ этого источника, однако, нельзя было затратить достаточно большихъ средствъ для производства полныхъ анализовъ, а потому пришлось ограничиться девятью неполными анализами (шести почвъ и трехъ подпочвъ) и пятнадцатью опредѣленіями перегноя, каковая работа и была исполнена М. И. Шешуковымъ въ лабораторіи Костромскаго Техническаго училища. Такъ какъ въ то время я еще не зналъ, что получу возможность произвести и болѣе полные анализы, то для работы г. Шешукова я отобралъ почти исключительно черноземы, при чемъ выбралъ ихъ такимъ образомъ, что взялъ три чернозема (глинистый, лессовый и солонцеватый) изъ западной половины района, изъ Куреинской волости Курганскаго уѣзда, а два другихъ—съ крайняго юговостока, изъ волости Покровской въ Тюкальскомъ уѣзде, изъ которыхъ одинъ взять на типичной степи, а второй—несомнѣнно былъ подъ лѣсомъ.

Уже позднѣе, Ученый Комитетъ Министерства Земледѣлія призналъ возможнымъ произвести анализы нѣкоторыхъ изъ тобольскихъ почвъ въ Лабораторіи Министерства, завѣдуемой проф. П. С. Коссовичемъ. Подъ его руководствомъ были произведены полные анализы десяти почвъ и (неполные) четырехъ подпочвъ; кроме того, были сдѣланы опредѣленія перегноя въ 15 другихъ образцахъ.

При выборѣ материала для анализовъ въ Лабораторіи М. З. я руководствовался тѣми же соображеніями, какъ и при выборѣ образцовъ для анализовъ г. Шешукова. Въ виду невыясненности химическихъ особенностей западно-сибирскаго чернозема, а также въ виду весьма значительного распространенія его на югъ Тобольской губ. и главной роли въ мѣстномъ земледѣліи, и для анализовъ Лабораторіи М. З. было предназначено преобладающее количество образцовъ чернозема, при чемъ опять таки были взяты по 2 образца изъ наиболѣе изученныхъ волостей—западной (Куреинской) и восточной (Покровской); кроме того, были подвергнуты анализу еще два образца черноземовъ изъ промежуточныхъ мѣсть—черноземъ Большепесчанскаго и Замираловой; изъ этихъ 6 образцовъ два образца Куреинской волости въ природѣ наблюдались въ очень небольшомъ разстояніи др. отъ др., на одной и той же Сорочьей степи, и отличаются другъ отъ друга главнымъ образомъ по характеру

¹⁾ Материалы по изученію русскихъ почвъ Совѣтова и Докучаева, вып. 10, 1896.

подпочвы. Образцы Покровской волости представляютъ: одинъ—чисто «степной» черноземъ, съ высокимъ горизонтомъ вскипанія, а другой—черноземъ «лѣсной», болѣе мощный и темный, съ пониженнымъ горизонтомъ вскипанія, залегающій въ близкомъ сосѣдствѣ съ первымъ; такой выборъ сдѣланъ былъ главнымъ образомъ потому, что старожильское населеніе Покровской волости распахиваетъ главнымъ образомъ участки такого «лѣсного» чернозема, оставляя почти совершенно въ культуры чистыя степи. Изъ двухъ промежуточныхъ образцовъ, относящихся къ междурѣчью Ишимъ-Иртышъ, одинъ (Большепесчанское) представляется собою «лѣсной» черноземъ съ ослабленной окраской и сравнительно небольшой мощности; такие черноземы, часто окрашенные интенсивнѣе и болѣе мощные, довольно значительно распространены въ волостяхъ Сладковской, Большепесчанской и аналогичныхъ мѣстностяхъ между Ишимомъ и Иртышемъ въ предѣлахъ южной части Тобольской губерніи. Другой образецъ изъ того же междурѣчья взятъ ближе къ Иртышу на типичной черноземной степи, начинаящейся въ нѣсколькихъ верстахъ къ ЮЮВ отъ Бекишева.

Далѣе, желая положить хотя начало изученію сибирскихъ солонцеватыхъ почвъ, я выбралъ три образца ихъ для анализа Лабораторіи М. З.; изъ нихъ 2 взяты въ нѣсколькихъ верстахъ другъ отъ друга въ Сладковской волости, но рѣзко различаются по структурнымъ особенностямъ; одинъ изъ нихъ, безструктурный, интересенъ былъ еще и потому, что находился подъ пашней; другой безструктурный былъ взятъ изъ Покровской волости и представлялъ собою «злой» солонецъ, съ большимъ количествомъ солей.

Наконецъ, для анализа въ Лаб. М. З. былъ выбранъ подзолъ изъ той же мѣстности, откуда былъ анализированъ подзолъ и г. Шешуковымъ; эти два образца въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ разнились другъ отъ друга.

Такимъ образомъ, было подвергнуто химическому анализу всего 11 образцовъ чернозема, 3 солонцеватыхъ почвы и 2 подзола. Можно было надѣяться, что на основаніи полученнаго такимъ путемъ материала удастся ознакомиться со свойствами почвъ южной части Тобольской губ. болѣе подробно, чѣмъ это было возможно раньше; надежда эта оправдалась, хотя, къ сожалѣнію, не въ полной мѣрѣ. Дѣло въ томъ, что аналитический материалъ, полученный мною отъ различныхъ аналитиковъ, не достаточно однороденъ. Неоднородность эту можно было бы, конечно, счесть за выраженіе дѣйствительно существующихъ различій въ почвахъ, если бы не препятствовали этому слѣдующія обстоятельства. Прежде всего, какъ отмѣчено выше, для обоихъ рядовъ анализовъ были отчасти выбраны параллельные образцы черноземовъ изъ вол. Куреинской и Покровской; относительно такихъ образцовъ можно было ожидать значи-

тельного совпадения данныхъ анализа; но, конечно, не исключена возможность, что отсутствіе совпаденія въ данныхъ случаяхъ обусловлено различіемъ въ анализированныхъ почвахъ, недоступнымъ прямому наблюдению. Болѣе важнымъ является постоянное несовпаденіе въ размѣрахъ однихъ и тѣхъ же величинъ въ обоихъ рядахъ анализовъ: по одному ряду одни величины постоянно оказываются больше, чѣмъ соответственныя величины по другому ряду. И, къ сожалѣнію, это явленіе наблюдается относительно весьма важныхъ «почвенныхъ моментовъ». Чтобы не быть голословнымъ, приведу данные, касающіяся содержанія гумуса, цеолитовъ¹⁾, глинозема, извлекаемаго сѣрной кислотой, и общаго содержанія фосфорной кислоты въ черноземахъ.

	по даннымъ Л. М. З.	по Шешукову
Среднее содержаніе въ 16 образцахъ —	9,4	8,0
Колебанія	6,6—12,3	4,5—11,3
<i>Цеолиты:</i>		
Средн. содерж. въ 6 resp. 5 образцахъ —	31,9	21,9
Колебанія	27—38	18—27
<i>Al₂O₃:</i>		
Средн. содерж. въ 6 resp. 5 образцахъ —	10,4	8,4
Колебанія	9—12	7—11
<i>P₂O₅:</i>		
Средн. содерж. въ 6 resp. 5 образцахъ —	0,155	0,343
Колебанія	0,114—0,194	0,153—0,413

Несомнѣнно, что было бы натяжкой считать всѣ эти несогласія, иногда столь значительныя, за выраженіе дѣйствительно существующихъ различій въ химическомъ составѣ почвъ и принимать, безъ дальнѣйшихъ разсужденій, напр., что содержаніе фосфорной кислоты въ тобольскихъ черноземахъ варьируетъ отъ 0,114 до 0,413 или что количество цеолитовъ въ нихъ измѣняется отъ 18 до 38%. Очевидно, причина этихъ несогласій кроется въ различіи аналитическихъ пріемовъ, усвоенныхъ разными аналитиками. Что такое различіе имѣло мѣсто, явствуетъ уже изъ описанія аналитическихъ пріемовъ, употреблявшихся въ Лабораторіи М. З., при чемъ, какъ пишетъ мнѣ проф. Коссовичъ, «выработано было сознательное отношение къ общепринятымъ методамъ, болѣе ясный на нихъ взглядъ, и намѣчено то направлениe, въ которомъ желательно дальнѣйшее усовершенствованіе ихъ». Не мнѣ высказываться по поводу пред-

1) Подъ этимъ именемъ здѣсь приводятся всѣ вещества, извлекаемыя 10% HCl, безъ вычета углесолей; анализы Л. М. З. показываютъ, что количество этихъ послѣднихъ въ верхнемъ слоѣ черноземовъ—ничтожно.

почтеннія однихъ аналитическихъ пріемовъ другимъ: дѣло самихъ аналитиковъ выяснить существующія несогласія и выработать однообразіе аналитическихъ методовъ, безъ котораго сравненіе результатовъ, полученныхъ въ различныхъ лабораторіяхъ, рискуетъ сдѣлаться безплодной игрой съ числами. Думаю, что всякий, имѣвшій необходимость сопоставлять между собою анализы русскихъ почвъ, долженъ будеть въ концѣ концовъ согласиться, что существующій по этой части материалъ не только малъ по объему, но еще и крайне неоднороденъ. Миѣ лично приходится характеризовать тобольскія почвы, конечно, главнымъ образомъ на основаніи полныхъ анализовъ, подкрепляя ихъ ссылками на неполные анализы г. Шешукова или указывая на несовпаденія, которые должны быть разъяснены впослѣдствіи.

Переходя теперь къ изложению аналитическихъ данныхъ, мы прежде всего остановимся на содержаніи перегноя. Наибольшее количество анализовъ на перегной падаетъ на черноземныя почвы, подзолы и солонцы, а почвы другихъ типовъ, сѣрые суглинки и супеси, мало распространенные въ южной части Тобольской губ., почти совсѣмъ не анализировались. Разсмотримъ сначала данные относительно содержания перегноя въ черноземныхъ почвахъ.

Таблица 7.
Содержание перегноя
въ черноземахъ юга Тобольской губерніи.

№	ХАРАКТЕРЪ ПОЧВЫ	Гигроск. вода.	Перегной.	Химич свя- занная вода	Общая погре- ни при проакти- вации.	Аналитикъ.
485	Глинистый черноземъ	7,10	8,27	4,32	12,59	Лабор. М. З
482	тоже	5,67	6,65	4,20	10,85	—
315	тоже	5,87	6,61	4,32	10,93	—
332	тоже	4,92	7,19	4,79	11,98	—
372	тоже	5,11	11,18	4,20	15,38	—
505	тоже	4,36	3,72	—	13,77	Шешуковъ
370	тоже	5,11	4,89	—	14,86	—
520	тоже	3,52	11,00	—	16,91	—
523	Лессновый черноземъ	5,78	8,07	3,67	11,74	Лабор. М. З.
507	тоже	4,90	11,79	2,34	14,13	—

nº	ХАРАКТЕРЪ ПОЧВЫ	Гигроск. вода.	Перегной.	Химич. свя- занная вода	Общая потеря при прокали- вании.	Аналитикъ.
537	Лессовой черноземъ	3,59	7,64	2,19	9,83	Лабор. М. З.
552	тоже	5,12	9,59	2,27	11,85	—
562	тоже	5,48	10,82	3,41	14,23	—
582	тоже	5,03	10,82	3,30	14,12	—
583	тоже	5,42	10,21	3,34	13,55	—
586	тоже	5,39	11,66	3,53	15,19	—
587	тоже	5,54	12,28	3,31	15,59	—
568	тоже	4,65	9,98	2,53	12,52	—
569	тоже	4,57	7,58	3,16	10,74	—
516	тоже	3,23	9,03	—	17,07	Шешуковъ
526	тоже	3,41	9,88	—	17,84	—
314	тоже	4,88	4,46	—	14,25	—
329	тоже	3,72	8,15	—	14,72	—
538	тоже	1,88	9,15	—	13,06	—
548	тоже	4,17	11,26	—	18,21	—
560	тоже	2,13	7,60	—	10,76	—
563	тоже	4,10	6,58	—	13,27	—
575	тоже	3,95	6,60	—	11,87	—
595	тоже	4,87	11,22	—	20,01	—
577	тоже	4,02	7,55	—	15,67	—

Въ этой таблицѣ не вычислено содержаніе химически связанной воды для образцовъ, анализированныхъ г. Шешуковымъ, потому что для меня осталось неяснымъ значение чиселъ, приводимыхъ имъ для общей потери при прокаливаніи. Г. Шешуковъ на вопросъ мой по этому поводу пишетъ мнѣ лишь, что всѣ анализы высчитаны на почву сухую, т.-е. безъ гигроскопической воды. Думаю однако, что именно относительно общей потери произошло некоторое недоразумѣніе и числа, даваемыя этимъ авторомъ, означаютъ не гумусъ плюсъ химически связанную воду, а гумусъ плюсъ химически связанную и плюсъ гигроскопическую воду, ибо въ противномъ случаѣ числа для химически связанной воды достигали бы въ анализахъ г. Шешукова 10%, лишь въ видѣ исключенія падая до 5%, тогда какъ въ анализахъ Лабор. М. З. максимальное содержаніе химически связанной воды не достигаетъ и 5%. Наставивать на этомъ объясненіи я однако не считаю возможнымъ въ

виду того, что общая потеря при прокаливании въ двухъ подпочвахъ (пп^о 554 и 595), по даннымъ г. Шешукова, все же очень велика, такъ что и за вычетомъ гигроскопической воды на долю воды химически связанной остается еще 9,5 и 8,4% (изъ четырехъ анализовъ подпочвъ, сдѣланныхъ въ Лабор. М. З., лишь въ одномъ содержаніе химически связанной воды достигаетъ 5,1%). Далѣе, при составленіи этой таблицы не приведены два анализа г. Шешукова, относящіеся къ образцамъ, анализированнымъ въ Лабор. М. З.

Изъ чиселъ, приведенныхъ въ таблицѣ, видно прежде всего, что содержаніе перегноя варьируетъ наиболѣе сильно въ глинистыхъ черноземахъ; это явленіе можетъ обусловливаться случайными причинами: выше было говорено, что въ глинистыхъ черноземахъ почти до самой поверхности доходятъ мало измѣненная почвообразовательнымъ процессомъ глинистая партия; ясно, что и содержаніе перегноя въ такихъ почвахъ можетъ значительно измѣняться въ горизонтальномъ направлении въ зависимости отъ того, какая попадетъ случайно для анализа порція почвы. Для насъ важны здѣсь не столько низкія цифры сколько высокія, показывающія, что и въ глинистыхъ черноземахъ содержаніе перегноя можетъ быть весьма значительно, такъ что въ этомъ отношеніи нѣть особенной разницы между ними и черноземами па лессовидныхъ подпочвахъ, въ которыхъ содержаніе перегноя подвержено вообще менѣшимъ колебаніямъ. Изъ лессовыхъ черноземовъ сравнительно бѣдны гумусомъ чисто-степные черноземы Покровской волости (пп^о 575, 577, 569), отличающіеся и по мощности, и по окраскѣ отъ близлежащихъ черноземовъ легкихъ котловинокъ (п^о 595, 568), въ которыхъ селится уже береза. Въ большинствѣ же черноземовъ южной части Тобольской губерніи содержится 8—10% перегноя, при чемъ образцы съ максимальнымъ содержаніемъ въ 11—12% встрѣчаются на всей территоріи. Отсюда видно, что тобольские черноземы по содержанію гумуса не бѣднѣе лучшихъ черноземовъ Европ. Россіи.

Этотъ выводъ не согласуется съ приведенными выше данными г. Высоцкаго, при чемъ оказывается, что среднее содержаніе гумуса въ моихъ образцахъ тобольскихъ черноземовъ—глинистыхъ и лессовыхъ—даже по анализамъ г. Шешукова выше, чѣмъ въ черноземахъ г. Высоцкаго, относя сюда его почвы I и II типовъ. А именно, изъ 16 опредѣленій гумуса, сдѣланныхъ г. Шешуковымъ въ почвахъ моего сбора, среднее около 8 процентовъ, а для 22 почвъ г. Высоцкаго (за исключеніемъ черноземовъ Тургайской обл.)—среднее около 6%; эта средняя понизилась бы значительно, если исключить образцы, относимые г. Высоцкимъ къ II типу¹). Такую разницу въ среднемъ содер-

¹⁾ Данными г. Краснопольского (см. Горн. Ж., 1894, стр. 70) я не

жаніи гумуса нельзя уже отнести насчетъ аналитическихъ приемовъ, ибо и для г. Высоцкаго анализы сдѣланы тоже г. Шешуковымъ; чѣмъ бы однако эта разница не обусловливалась, приведенный данныя во всякомъ случаѣ подкрепляютъ сдѣланный выше выводъ, что содержание гумуса въ черноземахъ г. Высоцкаго значительно ниже типичнаго.

Таблица 8.

Содержание гумуса въ нечерноземныхъ почвахъ юга Тобольской губ.

№	ХАРАКТЕРЪ ПОЧВЫ	Гигроск. вода.	Гумусъ.	Химиц. свя- занная вода	Общая потеря при прокали- вании.	Аналитикъ
322	Сѣрый суглинокъ	2,91	4,10	—	8,08	Шешуковъ
488	Сѣрая супесь	2,14	3,55	—	6,17	—
554	Подзолъ типичный	1,57	1,85	—	4,40	—
557	тоже	0,75	0,75	0,50	1,25	Лабор. М. З.
349	тоже	1,09	0,54	—	2,70	Шешуковъ
514А	Подзолъ съ темн. гориз. В.	1,78	1,26	—	4,40	—
514В	—	3,43	2,04	—	8,39	—
324А	—	0,45	0,25	0,33	0,58	Лабор. М. З.
324В	—	3,05	1,99	2,30	4,29	—
534	Солонецъ структурный	3,29	4,68	1,39	6,07	—
551	Солонецъ безструктурный	4,13	8,63	1,73	10,36	—
571	тоже	5,33	9,94	2,77	12,71	—
531	тоже	5,53	7,93	2,67	10,60	—
497	тоже	6,84	8,00	5,75	13,75	—
337	тоже	7,21	19,64	3,30	22,94	—

Чтобы сдѣлать заключеніе о содержаніи перегноя въ сѣрыхъ (не-подзолистыхъ) суглинкахъ и супесяхъ, необходимо, разумѣется, распо-

пользуюсь изъ-за того, что въ большинствѣ онъ имѣютъ довольно неопределенный характеръ, какъ напр.: «хорошія супеси» съ 5 и 4,8% гумуса, «черноземные суглинки» съ 5—7%, «супесь, переходящая въ черноземъ», и иѣсколько «тяжелыхъ глинистыхъ болотнаго происхожденія» съ 3—5% гумуса; относительно послѣднихъ лишь одна показана взятой изъ «сухого болота», остальные собраны на степи. Въ какомъ отношеніи находятся эти почвы къ I и II типу г. Высоцкаго—неизвѣстно, да и мощность большей части изъ нихъ показана незначительная, напр. для «супесчанистаго чернозема» № 106—0,2 м.=8 дюймовъ.

лагать большимъ количествомъ анализовъ. Изъ 5 приведенныхъ въ таблицѣ анализовъ подзоловъ видно, что верхній горизонтъ ихъ бѣдне гумусомъ, чѣмъ верхніе горизонты всѣхъ прочихъ типовъ почвъ юга Тобольской губ. Два изъ анализированныхъ подзоловъ относятся къ той болѣе рѣдкой ихъ разности, которая имѣетъ темноокрашенный переходный горизонтъ; изъ таблицы видно, что перегноя въ этомъ горизонте на 1—2 процента больше, чѣмъ въ горизонтѣ верхнемъ.

Въ почвахъ солонцеватыхъ содержаніе перегноя варьируетъ въ широкихъ предѣлахъ; всего менѣе (около 5%) оно въ солонцѣ структурномъ; въ солонцеватомъ черноземѣ № 526 оно таково же, какъ и въ черноземахъ не солонцеватыхъ; наконецъ въ солонцахъ безструктурныхъ оно измѣняется отъ 8 до 20 процентовъ.

Остальная аналитическая данныя относительно почвъ юга Тобольской губ. сгруппированы въ слѣдующихъ таблицахъ.

Примѣчаніе. Во время печатанія настоящей работы получилъ я отъ проф. П. С. Коссовича «Отчетъ сельскохоз. химич. Лабораторіи М. З.» (Спб., 1899) за первый годъ ея существования. Въ «Отчетѣ» опубликованы таблицы анализовъ тобольскихъ почвъ, соответствующія ниже приводимымъ 9—14 и 16—18. Въ объясненіи къ таблицамъ изложены и пріемы, коими пользовалась Лабораторія при анализахъ моихъ почвъ. Такъ какъ Лабораторіи были сообщены весьма краткія свѣдѣнія о мѣстѣ выемки образцовъ (при томъ не всѣхъ), то интересующіеся болѣе подробной ихъ характеристикой найдутъ таковую въ данной моей работе. Можно замѣтить, что въ указаніяхъ относительно мѣста выемки моихъ образцовъ въ «Отчетѣ» вкраилось нѣсколько опечатокъ, которыхъ слѣдуетъ исправить (напр. Курманское вмѣсто Куреинское и т. д.). Слѣдуетъ указать еще на неточность на стр. 4 «Отчета»: анализъ водной вытяжки былъ сдѣланъ и для подпочвы № 551, а не одного только № 534.

Т а б л
Валовой

нº	ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОЧВЫ.	Гигроскопический воды.	В о в с ъ хъ 1 0 0 ча с т я х :					
			Потеря отъ прокаливания.	Минераль. вещества.	Гумус.	Азотъ.	Химически свя- занная вода.	CO ₂
485	Сорочья степь, глинистый черноземъ, гориз. А + В	7,100	12,594	87,406	8,272	0,349	4,322	0,05
—	тоже, гориз. С	5,340	7,405	92,595	2,266	0,129	5,139	9,65
523	Сорочья степь, лессовой черноземъ, гориз. А	5,784	11,744	88,256	8,072	0,373	3,672	0,05
552	Большепесчанское, лессовой черно- земъ, гориз. А	5,120	11,854	88,146	9,585	0,395	2,269	0,06
562	Замираловка, лессовой черноземъ, гориз. А	5,480	14,221	85,779	10,815	0,475	3,406	0,05
568	Оконишниково, лессовой черноземъ, гориз. А	4,646	12,518	87,482	9,984	0,446	2,534	0,05
569	Оконишниково, лессовой черноземъ, гориз. А	4,568	10,738	89,262	7,577	0,330	3,161	0,02
—	тоже, гориз. С	3,370	5,903	94,097	2,400		3,503	3,715
557	Осина, подзолъ, гориз. А + В	0,748	1,254	98,746	0,751	0,041	0,503	0,02
—	тоже, гориз. С	4,910	4,623	95,377	0,830		3,793	0,031
534	Малиновая, структ. солонецъ, гориз. А	3,292	6,068	93,932	4,678	0,214	1,390	0,056
—	тоже, гориз. С	2,100	3,728	96,272	0,980		2,748	4,081
551	Малиновая, безструктурный солонецъ, гориз. А	4,128	10,365	89,635	8,631	0,404	1,734	0,038
—	тоже, гориз. С	3,860	4,767	95,233	0,930		3,837	0,441
571	Крестики, безструктурный солонецъ, гориз. А	5,332	12,705	87,295	9,936	0,467	2,762	3,646

a. 9.

оставъ.

у х о й почв ы с од ер ж и т с я:

УХОЙ почвы содержится:											%	
O ₂ O ₅	SO ₃	Cl	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	K ₂ O	Na ₂ O	Сумма минеральных веществ.	NaCl	
,114	0,095		61,523	14,089	5,167	1,941	2,068	1,262	1,043	87,353		4,219
,065	0,098											5,690
,123	0,120		65,373	12,771	4,388	1,706	1,976	1,344	0,976	89,130		4,621
,194	0,079		64,565	11,967	4,520	1,895	1,620	1,741	1,227	87,869		4,121
,161	0,119		59,024	13,303	4,969	2,111	2,068	1,905	1,464	85,175		4,395
,187	0,112		62,203	12,382	4,767	1,843	1,880	2,152	1,641	87,224		4,467
,148	0,113		64,277	13,612	4,747	1,530	1,778	1,772	1,604	89,604		4,342
,150			61,102	12,688	4,787	6,506	2,378	1,546	1,275	94,147		
,023	0,015		83,394	8,539	1,084	1,098	1,021	1,453	2,065	98,714		5,460
,139			66,108	15,544	6,407	1,529	2,310	2,254	2,013	96,335		
,066	0,148	0,011	77,474	7,420	2,786	1,120	1,666	1,193	1,194	93,134	0,018	4,574
,162		0,040	72,754	6,594	2,821	6,397	1,552	1,026	0,885	96,312	0,065	
,114	0,113	0,083	71,144	8,861	3,252	1,716	1,450	1,255	1,327	89,353	0,137	4,684
,142		0,265	72,342	10,761	4,618	1,631	2,191	1,679	1,228	95,294	0,439	
,241	0,693	0,398	55,855	10,181	3,976	6,720	2,544	1,531	1,886	87,671	0,654	4,698

Таблица 10.

Вытяжка кръпкой сърной кислотой.

n ^o	ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОЧВЫ.	Въ 100 ч. сухой почвы:						Изъ 100 частей сухой почвы перешло въ растворъ:						
		H ₂ O ₂	CO ₂	SiO ₂	P ₂ O ₅	Al ₂ O ₃	Fe ²⁺	CaO	MgO	K ₂ O	O ₂	N ₂ O	Cyana.	
485	Сорочья степь, глинистый черноземъ, гориз. А + В	87,406	43,020	44,386	0,051	22,831	0,114	11,771	5,037	1,667	1,767	0,739	0,253	44,230
523	Сорочья степь, лесовой черноземъ, гориз. А	88,256	47,246	41,010	0,053	22,071	0,123	10,780	4,509	1,476	1,613	0,830	0,295	41,756
552	Болышеевская лесовая, лесовъ, черноземъ, гориз. А	88,146	46,591	41,555	0,061	23,017	0,194	9,300	4,356	1,583	1,367	0,987	0,344	41,209
562	Заморадово, лесовъ, черноzemъ, гориз. А	85,779	42,237	43,542	0,051	21,750	0,161	10,833	4,821	1,843	1,741	1,247	0,366	42,813
568	Оконинниково, лесовой черноземъ, гориз. А	87,482	47,920	40,562	0,057	20,262	0,187	9,291	4,624	1,515	1,483	1,432	0,351	39,202
569	Оконинниково, лесовъ, черноземъ, гориз. А	89,262	49,779	39,483	0,023	20,504	0,148	10,552	4,488	1,147	1,472	1,031	0,373	39,738
557	Осина, подзолъ, гориз. А + В	98,746	76,330	22,416	0,022	15,092	0,023	4,139	0,865	0,658	0,668	0,357	0,274	22,098
534	Малиновая, структ. солончакъ, гориз. А	93,932	69,822	24,110	0,056	12,346	0,066	4,818	2,571	0,857	1,386	0,537	0,510	23,147
551	Малиновая, безструктур. солонецъ, гориз. А	89,635	58,513	31,192	0,038	17,351	0,114	6,378	3,010	1,396	1,240	0,640	0,489	30,656
571	Крестники, безструктур. солонецъ, гориз. А + В	87,295	43,910	43,305	3,646	17,414	0,241	7,324	3,831	6,331	2,229	0,851	0,803	42,670

Таблица 11.

Вытяжка 10-процентной соляной кислотой.

№	ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОЧВЫ.	Въ 100 ч. сухой почвы:						Изъ 100 частей сухой почвы перешло въ растворъ:							
		CO ₂	SiO ₂	SO ₃	P ₂ O ₅	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	K ₂ O	N ₂ O	C _{йнн.}			
485	Сорочья степь, глинистый черноземъ, гориз. А + В тоже, гориз. С	87,406	49,255	38,151	0,051	20,360	0,095	0,101	8,892	4,792	1,467	1,463	0,716	0,234	38,171
—	Сорочья степь, лесовой	92,595	41,004	51,591	9,650	16,558	0,098	0,065	7,110	4,045	12,365	1,576	0,562	0,333	52,362
523	Сорочья степь, лесовой	88,256	57,585	30,671	0,053	15,028	0,120	0,114	6,846	4,347	1,354	1,296	0,802	0,271	30,231
552	Большесинанское, лесово.	88,146	60,784	27,362	0,061	14,154	0,079	0,176	5,503	3,758	1,344	1,034	0,700	0,264	27,073
562	Черноземъ, гориз. А	85,779	52,505	33,274	0,051	17,106	0,119	0,146	7,010	4,616	1,428	1,394	1,056	0,306	33,232
568	Оконинниково, лесово.	87,482	56,949	30,533	0,057	16,494	0,112	0,176	5,695	3,828	1,204	1,078	1,061	0,241	29,946
569	Оконинниково, лесово.	89,262	57,822	31,440	0,023	16,592	0,113	0,125	6,620	4,292	1,059	1,247	0,995	0,248	31,314
557	Осиновая, подзолъ, гориз.	98,746	88,765	9,981	0,022	6,715	0,015	0,015	1,380	0,808	0,315	0,329	0,226	0,209	10,034
534	Малиновая, структ. соло-	93,932	76,136	17,796	0,056	9,099	0,148	0,058	3,365	2,393	0,514	1,084	0,492	0,507	17,716
551	Малиновая, безструктур.	89,635	68,934	20,701	0,038	11,511	0,113	,098	3,477	2,600	1,073	0,827	0,419	0,414	20,570
571	Крестки, безструктур.	87,295	56,051	31,244	3,649	9,672	0,693	0,177	4,427	3,479	6,040	1,740	0,692	0,732	31,298

Таблица 12.

Вытяжка однопропиентной соленной кислотой.

№	ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОЧВЫ	Вз 100 ч. сухой почвы:		И.ч. 100 ч. сухой почвы перешло в раствор:		Сумма.								
		CO ₂	SiO ₂	SO ₃	Al ₂ O ₃ + Fe ₂ O ₃		CaO	MgO	K ₂ O	N ₂ O				
485	Сорочья степь, глинист. черноз., гориз. А + В	87,406	83,033	4,373	0,051	1,057	0,006	0,017	1,459	1,366	0,420	0,100	0,088	4,564
523	Сорочья степь, лесов. черноз., гориз. С	92,595	67,861	24,734	9,650	1,183	0,048	0,029	1,418	12,265	1,075	0,096	0,070	25,834
552	Большепесчанское, лесов. черноземь, гориз. А	88,256	84,468	3,788	0,053	0,781	0,007	0,015	1,284	1,177	0,298	0,131	0,080	3,826
562	Замирово, лесовой черноз., гориз. А	88,146	84,032	4,114	0,061	0,775	0,001	0,061	1,047	1,191	0,299	0,131	0,056	3,622
568	Оконинниково, лесовой черноземь, гориз. А	85,779	81,358	4,421	0,051	0,823	0,015	0,026	1,180	1,270	0,340	0,163	0,089	3,957
569	Оконинниково, лесовой черноземь, гориз. А	87,482	84,418	3,064	0,057	0,765	0,007	0,035	1,151	1,089	0,228	0,211	0,054	3,597
557	Осиновская, подзолъ, гориз. А + В	89,262	86,408	2,854	0,023	0,827	0,005	0,029	1,081	0,925	0,334	0,141	0,080	3,445
534	Малиновая, структур. солонецъ, гориз. А	98,746	97,984	0,762	0,022	0,177	0,002	0,007	0,131	0,085	0,033	0,058	0,029	0,544
551	Малиновая, безструктурный солонецъ, гориз. А	93,932	90,866	3,066	0,056	0,589	0,005	0,016	0,860	0,434	0,464	0,069	0,209	2,732
571	Крестики, безструктурный солонецъ, гориз. А + В	89,635	86,167	3,468	0,038	0,675	0,055	0,036	1,218	0,969	0,363	0,087	0,217	3,658
		87,295	73,338	13,457	3,646	1,036	0,554	0,083	1,539	5,803	0,891	0,162	0,618	14,332

ВОДНАЯ ВЫТЯЖКА

Таблица 13.

№	ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОЧВЫ.	Изъ 100 частей сухой почвы перешло въ растворъ						Реакція водной вытяжки.
		SO ₃	CaO	MgO	K ₂ O	Na ₂ O	Cl	
485	Сороцкая степь, глин. черн., гориз. A+B	0,073						Нейтральная со слаб. оттѣнкомъ щелочности.
—	— гориз. C	0,087						Нейтральная со слаб. оттѣнкомъ щелочности.
523	Сороцкая степь, лессов. черн., гориз. A	0,102						Нейтральная со слаб. оттѣнкомъ щелочности.
552	Большесечанское, лессов. черн., гориз. A	0,058						Нейтральная со слаб. оттѣнкомъ щелочности.
562	Замиралово, лессов. черноз., гориз. A	0,093						Нейтральная со слаб. оттѣнкомъ щелочности.
568	Оконинниково, лессов. черн., гориз. A	0,063						Нейтральная.
569	Оконинниково, лессов. черн., гориз. A	0,061						Нейтральная со слаб. оттѣнкомъ щелочности.
557	Основная, подзолъ, гориз. A+B	0,041						Нейтральная.
534	Малиновая, структ. солонецъ, гориз. A	0,203	0,005	0,016	0,045	0,028	0,086	0,011 0,191 Щелочная.
—	— гориз. C	0,248	0,037	0,003	0,002	0,010	0,138	0,040 0,232 Нейтральная.
551	Малиновая, беструкт. солон., гориз. A	0,270	0,048	0,025	0,011	0,005	0,109	0,083 0,281 Нейтральная.
—	— гориз. C	0,645	0,117	0,029	0,034	0,011	0,279	0,265 0,735 Нейтральная.
571	Крестки, беструкт. солон., гориз. A+B	1,329	0,345	0,132	0,084	0,014	0,467	0,398 1,440 Нейтральная.

T a b l e

*Количество веществъ, послѣдовательно извлек
сухо:*

ХАРАКТЕРЪ ПОЧВЫ.	НАЗВАНИЕ КИСЛОТЫ.	SiO ₂	SO ₃	P ₂ O ₅	Al ₂ O ₃ – Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	K ₂ O	Na ₂ O	СУММ.
485, А глин. черноземъ Сорочьей степи.	HCl 1%	1,057	0,006	0,017	1,459	1,366	0,420	0,100	0,088	4,51
	HCl 10%	19,303	0,089	0,084	12,225	0,101	1,043	0,616	0,146	33,60
	H ₂ SO ₄	2,471		0,013	3,124	0,200	0,304	0,023	0,019	6,15
	HF	38,692			2,448	0,274	0,301	0,523	0,790	43,02
523, А лессов. черно- земъ Сорочьей степи.	HCl 1%	0,781	0,007	0,015	1,284	1,177	0,298	0,131	0,080	3,77
	HCl 10%	14,247	0,113	0,099	9,909	0,177	0,998	0,671	0,191	26,40
	H ₂ SO ₄	7,043		0,009	4,096	0,122	0,317	0,034	0,024	11,64
	HF	43,302			2,169	0,230	0,363	0,508	0,681	47,25
552, А лессов. черно- земъ Большеве- счанского.	HCl 1%	0,775	0,001	0,061	1,047	1,191	0,299	0,131	0,056	3,56
	HCl 10%	13,379	0,078	0,115	8,214	0,153	0,735	0,569	0,208	23,45
	H ₂ SO ₄	8,863		0,018	4,395	0,239	0,333	0,287	0,080	14,21
	HF	41,548			2,831	0,312	0,253	0,754	0,883	46,58
562, А лессов. черно- земъ Замира- лова.	HCl 1%	0,823	0,015	0,026	1,180	1,270	0,340	0,163	0,089	3,90
	HCl 10%	16,283	0,104	0,120	10,446	0,158	1,054	0,893	0,217	29,27
	H ₂ SO ₄	4,644		0,015	4,028	0,415	0,347	0,191	0,060	9,70
	HF	37,274			2,618	0,268	0,327	0,658	1,098	42,24
568, А лессов. черно- земъ Окониш- никова.	HCl 1%	0,765	0,007	0,035	1,151	1,089	0,228	0,211	0,054	3,53
	HCl 10%	15,729	0,105	0,141	8,372	0,115	0,850	0,850	0,187	26,34
	H ₂ SO ₄	3,768		0,011	4,392	0,311	0,405	0,371	0,110	9,36
	HF	41,941			3,234	0,328	0,397	0,720	1,290	47,91

и а 14.

емыхъ различными кислотами изъ 100 частей почвы.

ХАРАКТЕРЬ ПОЧВЫ.	НАЗВАНИЕ КИСЛОТЫ.	SiO ₂	S0 ₃	P ₂ O ₅	Al ₂ O ₃ — Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	K ₂ O	Na ₂ O	С у м м а.
569, А лессов. черно- земъ Окониш- никова.	HCl 1% HCl 10% H ₂ SO ₄ HF	0,827 15,765 3,912 43,773	0,005 0,108 0,023 —	0,029 0,096 — —	1,081 9,831 4,128 3,319	0,925 0,134 0,088 0,383	0,334 0,913 0,225 0,306	0,141 0,854 0,036 0,741	0,080 0,168 0,125 1,231	3,422 27,869 8,537 49,753
557, А подзолъ Оси- новой.	HCl 1% HCl 10% H ₂ SO ₄ HF	0,177 6,538 8,377 68,302	0,002 0,013 0,008 —	0,007 0,008 0,008 —	0,131 2,057 2,816 4,619	0,085 0,230 0,343 0,440	0,033 0,296 0,339 0,353	0,058 0,168 0,131 1,096	0,029 0,180 0,065 1,791	0,522 9,490 12,079 76,334
534, А структур. соло- ненъ Малино- вой.	HCl 1% HCl 10% H ₂ SO ₄ HF	0,589 8,510 3,247 65,128	0,005 0,143 0,008 —	0,016 0,042 0,008 —	0,860 4,898 1,634 2,814	0,464 0,050 0,343 0,263	0,464 0,620 0,302 0,280	0,069 0,423 0,045 0,656	0,209 0,298 0,003 0,684	2,676 14,984 5,582 69,825
551, А безструктур. со- лонецъ Малиновой.	HCl 1% HCl 10% H ₂ SO ₄ HF	0,675 10,836 5,840 53,793	0,055 0,058 0,016 —	0,036 0,062 0,016 —	1,218 4,859 3,311 2,725	0,969 0,104 0,323 0,320	0,363 0,464 0,413 0,210	0,087 0,332 0,221 0,615	0,217 0,197 0,075 0,838	3,620 16,912 10,199 58,501
571, А безструктур. со- лонецъ Брестикова.	HCl 1% HCl 10% H ₂ SO ₄ HF	1,036 8,636 7,742 38,441	0,554 0,139 0,064 —	0,083 0,094 0,064 —	1,539 6,367 3,249 3,002	5,803 0,237 0,291 0,389	0,891 0,849 0,489 0,315	0,162 0,530 0,159 0,680	0,618 0,114 0,071 1,083	10,686 16,966 12,065 43,910

Таблица

**Послѣдовательная растворимость различныхъ
каждаго**

n ^o почвы.	SiO ₂				P ₂ O ₅			Al ₂ O ₃ +Fe ₂ O ₃			
	HCl 1%	HCl 10%	H ₂ SO ₄	HFl	HCl 1%	HCl 10%	H ₂ SO ₄	HCl 1%	HCl 10%	H ₂ SO ₄	HFl
485	1,7	31,4	4,0	62,9	14,8	73,7	11,5	7,6	63,5	16,2	12,7
523	1,2	21,7	10,7	66,4	12,2	80,5	7,3	7,3	56,7	23,4	12,6
562	1,4	27,5	7,8	63,3	16,1	74,5	9,4	6,4	57,2	22,0	14,4
552	1,2	20,7	13,7	64,4	31,4	59,2	9,4	6,3	49,8	26,7	17,2
568	1,2	25,2	6,1	67,5	18,7	75,4	5,9	6,7	48,8	25,6	18,9
569	1,3	24,5	6,1	68,1	19,5	64,8	15,6	5,9	53,5	22,5	18,1
557	0,2	7,8	10,0	82,0	30,4	34,8	34,8	1,3	21,4	29,2	48,1
534	0,8	10,9	4,2	84,1	24,2	63,6	12,2	8,4	47,9	16,1	27,6
551	0,9	15,2	8,2	75,7	31,5	54,4	14,1	10,5	40,1	27,3	22,1
571	1,8	15,4	13,8	69,0	34,4	39,0	26,6	10,9	44,9	22,9	21,3

Примѣчаніе. Въ таблицѣ 14 числа въ рубрикахъ: HCl 1% и HFl послѣдовательная растворимость данного вещества, напр. въ H₂SO₄, получится отъ суммы же величины даны въ процентахъ.

табл. 15.

**окисловъ въ процентахъ общаго содержания
изъ нихъ.**

CaO				MgO				K ₂ O				Na ₂ O			
HCl 1%	HCl 10%	H ₂ SO ₄	HFl	HCl 1%	HCl 10%	H ₂ SO ₄	HFl	HCl 1%	HCl 10%	H ₂ SO ₄	HFl	HCl 1%	HCl 10%	H ₂ SO ₄	HFl
70,3	5,2	10,3	14,2	20,3	50,4	14,7	14,6	6,9	49,7	1,8	41,4	7,6	14,7	1,8	75,7
68,9	10,3	7,1	13,7	15,1	50,5	16,0	18,4	9,8	50,0	2,5	37,7	8,2	19,5	2,4	69,9
60,1	7,5	19,6	12,8	16,4	51,2	16,7	15,7	8,5	47,0	10,0	34,5	6,8	14,0	4,1	75,1
62,8	8,1	12,6	16,5	18,4	45,4	20,5	15,7	7,5	32,6	16,4	43,5	4,5	17,0	6,5	72,0
58,9	6,2	16,9	18,0	12,1	45,2	21,5	11,2	9,8	39,5	17,2	33,5	3,2	11,4	6,7	78,7
60,4	8,7	5,6	25,3	18,7	51,3	12,6	17,4	7,9	48,2	2,0	41,9	4,9	10,4	7,8	76,9
7,7	20,9	31,2	41,2	3,2	28,9	33,2	34,7	3,9	11,5	9,0	75,6	1,0	9,0	3,0	87,0
41,4	4,5	30,6	23,5	27,8	37,2	18,1	16,9	5,8	35,5	3,7	55,0	17,5	24,9	0,2	57,4
56,5	6,1	18,8	18,6	25,0	32,0	28,5	14,5	6,9	26,4	17,6	49,1	16,3	14,8	5,6	63,3
86,3	3,5	4,3	5,9	35,0	33,4	19,2	12,4	10,5	35,2	10,3	44,0	32,7	6,0	3,7	57,6

чены путемъ непосредственнаго определенія, остальные вычислены; дѣйстви-
рованія чиселъ въ рубрикахъ H₂SO₄, HCl 10% и HCl 1%. Въ таблицѣ 15

Приоблизительный минералогический составъ.

Таблица 16.

n ^o	ХАРАКТЕРЪ ПОЧВЪ.	CaCO ₃	Лесокъ силикатный.				Сырья.
			Глинист.	Лесокъ хлоритово- магнезиальный	Лесокъ хлоритово- магнезиальный	Лесокъ хлоритово- магнезиальный	
485	Глинист. черноз. Сорочьей степени, гор. А	0,116	37,962	6,235	3,091	6,683	1,363 1,010 31,070 0,073 87,603 87,406
523	Лесовый черноземь Сорочьей степени	0,120	30,449	10,339	3,008	5,761	1,141 1,218 36,369 0,102 88,507 88,256
552	Лесов. черноземь Большепесчанского	0,139	27,165	14,193	4,464	7,470	1,552 0,849 32,487 0,058 88,377 88,146
562	Лесовый черноземь Замиралова	0,115	33,066	10,268	3,896	9,289	1,333 1,097 27,317 0,093 86,474 85,779
568	Лесов. черноземь Оконишникова, гор. А	0,129	30,341	10,029	4,263	10,914	1,622 1,332 30,401 0,063 89,094 87,482
569	Лесов. черноземь Оконишникова, гор. А	0,052	31,321	8,043	4,387	10,414	1,905 1,027 32,510 0,061 89,720 89,262
557	Поздоль Осиновой, гориз. А	0,050	9,890	12,435	6,489	15,152	2,189 1,184 52,236 0,041 99,666 98,746
534	Структ. солонецъ Малиновой, гориз. А	0,127	17,466	6,314	3,884	5,787	1,308 0,940 57,662 0,203 93,691 93,932
551	Безструктурт. солонецъ Малиновой, гориз. А	0,086	20,345	10,421	3,641	7,089	1,592 0,704 45,573 0,270 89,721 89,635
571	Безструктурт. солонецъ Крестиковъ	8,287	21,628	12,141	4,026	9,162	1,935 1,057 28,244 1,329 87,809 87,295

П р и мѣ ч а н і е. Иль объяснительной записи проф. Коссовича видно, что числа рубрики «глина», получены путемъ вычитания всего количества, растворившагося въ 10% соляной кислотъ, изъ количества, перешедшаго въ растворъ при обраткѣ сѣрной кислотой. Основания, растворяющіяся только во фтористоводородной кислотѣ, приняты входящими въ составъ полевошпатовыхъ минераловъ, количества которыхъ вычислены по формуламъ. Содержание кварцеваго песка вычислено путемъ вычитания того количества SiO₂, которое входитъ въ составъ этихъ минераловъ, изъ всей кремнекислоты, оставшейся въ части почвы, не растворившейся въ сѣрной кислотѣ.

Таблица 17.

Процентный состав цеолитной части.

№	ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОЧВЫ.	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	K ₂ O	Na ₂ O
1	Глинистый чернозем Сорочьей степи, № 485 гориз. А+В	53,78	23,49	12,66	3,71	3,86	1,89	0,62
2	тоже	54,70	23,49	13,36	0,28 ¹⁾	5,21	1,86	1,10
3	Лесовой чернозем Сорочьей степи № 523	50,30	22,91	14,55	4,31	4,34	2,68	0,91
4	Структурный солонец № 534	52,34	19,36	13,77	2,55	6,24	2,83	2,92
5	Беструктурный солонец № 551	56,78	17,15	12,82	5,06	4,08	2,07	2,04
6	Лесовой чернозем Задиралова № 562	52,07	21,34	14,05	4,15	4,24	3,21	0,93
7	Лесовой чернозем Большесечинского № 552	53,05	20,63	14,09	4,75	3,88	2,62	0,99
8	Лесовой чернозем Оконинникова № 568	55,86	19,29	12,96	3,83	3,65	3,59	0,82
9	Лесовой чернозем Оконинникова № 569	53,48	21,34	13,83	3,32	4,02	3,21	0,80
10	Беструктурный солонец Крестикова № 571	43,69	20,00	15,72	6,31	7,86	3,13	3,31
11	Пороль Осиновой № 557	67,46	13,86	8,12	2,88	3,31	2,27	2,10

¹⁾) Следует неначальное содержание цеолитной части въ образцах 0485 С может быть объяснено условностью вычисления, при котором принимается, что вся углекислота соединена съ известкомъ между тѣмъ всыпка извроятио, что она отчасти связана съ магнезиемъ.

Таблица 18.

Механический состав

Таблица 19.

Неполные анализы тобольских почв, произведенные**г. Шемуковский.**

— 87 —

№	ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОЧВЫ.	Въ 100 частях сухой почвы содержится:					Вытяжка, събранный кислотой.				
		Al ₂ O ₃	CaO	CO ₂	P ₂ O ₅	SiO ₂	Перешло въ растворъ.	Al ₂ O ₃ Fe ₂ O ₃			
505	Привольная, глинистый черноземъ, гориз. А	4,36	13,77	86,23	3,72	—	0,153	61,98	10,78	4,77	68,04
516	Куринское, лесовой черноземъ, гориз. А	3,23	17,07	82,93	9,03	—	0,407	64,04	9,51	3,40	69,03
526	Мартина, лесов. черн., солонцеватый, гор. А	3,41	17,84	82,16	9,88	—	0,358	61,88	7,69	4,21	68,46
595	Камышная, лесовой черноземъ, гориз. А	4,87	20,01	79,99	11,22	—	0,384	57,06	7,15	3,07	68,16
—	тоже,	—	гор. С	3,93	13,25	86,75	0,88	—	0,242	61,90	13,58
577	Крестки, лесовой черноземъ, гориз. А	4,02	15,67	84,33	7,55	—	0,413	51,75	7,41	3,88	69,51
—	тоже,	—	гор. С	4,51	12,87	87,13	2,73	3,52	0,320	60,24	8,91
554	Большесчанское, подзолъ, гориз. А . . .	1,57	4,40	95,60	1,85	—	0,044	79,89	3,38	2,19	88,27
—	тоже,	—	гор. С	3,36	13,60	86,40	0,74	—	0,104	67,64	5,57
										3,22	76,18

Таблица 20.

Неполные анализы тобольских почвъ, произведенные

г. Шепукоўмъ.

н°	ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОЧВЪ.	Въ 100 ч. сухой почвы:			Изъ 100 ч. сухой почвы десятипроцентная соляная кислота извлекается:		
		SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	K ₂ O
505	Привольная, глинистый черноземъ, гориз. А	86,23	62,48	23,75	12,05	6,113	3,832
516	Куринское, лесовой черноземъ, гориз. А	82,93	55,98	26,95	13,56	6,677	2,932
526	Марина, лесов. черн., солонцеватый, гор. А	82,16	64,53	17,63	7,07	4,585	3,147
595	Камышная, лесовой черноземъ, гориз. А	79,99	59,49	20,50	9,66	5,566	2,515
—	—	86,75	59,68	27,07	11,42	9,808	3,052
577	Крестки, лесовой черноземъ, гориз. А	84,33	63,62	20,71	10,56	5,250	3,044
—	—	87,13	60,63	26,50	8,07	5,852	4,546
554	Большесчанское, подзолъ, гориз. А	95,60	85,37	10,23	4,84	2,185	1,704
—	—	86,40	69,03	17,37	8,90	4,449	2,523

Изъ приведенныхъ таблицъ видно, прежде всего, что общее количество всей глины, т.-е. веществъ, извлекаемыхъ изъ минеральной части почвъ горячей сърной кислотой, за вычетомъ CaCO_3 , въ черноземахъ весьма значительно и въ нѣкоторыхъ образцахъ равняется количеству всего песка, кварцеваго и силикатнаго; въ другихъ типахъ почвъ отношеніе это мѣняется въ пользу песка, а именно:

Таблица 21.

№	Характеръ почвы.	Глина.	Песокъ.	Отношеніе.
485	Глин. черноземъ Сорочьей степи . . .	44,2	43,2	50:50
523	Лессов. черноземъ Сорочьей степи . . .	40,8	47,5	46:54
552	— Большепесчанскаго . . .	41,4	46,8	47:53
562	— Замирадовой	43,3	42,9	50:50
568	— Оконишникова	40,4	48,5	45:55
569	— Оконишникова	39,4	50,2	44:56
557	Подзолъ Осиновой	22,3	77,2	22:78
534	Структ. солонецъ Малиновой . . .	23,8	69,6	25:75
551	Безструктур. солонецъ Малиновой . . .	30,8	58,6	34:66
571	— Крестиковъ	33,8	44,4	43:57

Такимъ образомъ минеральная основа вѣкоторыхъ черноземовъ, какъ глинистыхъ, такъ и лессовыхъ, на половину состоитъ изъ глины; въ минеральной основе другихъ образцовъ черноземовъ содержаніе глины не падаетъ ниже 44 процентовъ, откуда видно, что черноземы Тобольской губерніи вообще сильно глинисты; этого впрочемъ и слѣдовало ожидать въ странѣ со столь спокойными условіями рельефа. Во всѣхъ остальныхъ, не черноземныхъ, образцахъ абсолютное содержаніе глины значительно меньше; любопытно, что и отношеніе глины къ песку лишь въ одномъ безструктурномъ солонцѣ Крестиковъ приблизительно такое же, какъ въ черноземныхъ почвахъ, а въ остальныхъ не черноземныхъ почвахъ глина образуетъ всего $1/4$ — $1/3$ минеральной ихъ основы. Факты эти любопытны уже потому, что и подзолистыя, и солонцеватыя почвы залегаютъ въ низинахъ, гдѣ можно было бы, пожалуй, ожидать относительного преобладанія глинистыхъ частицъ. Въ дѣйствительности же, повидимому, чаще бываетъ, что въ низинахъ относительное содержаніе глины является уменьшеннymъ, и лишь иногда, какъ въ солонцѣ Кре-

стиковъ, образовавшемся на бывшемъ днѣ теперь усохшаго озера Горькаго, отношеніе между пескомъ и глиной приблизительно таково же, какъ на степи (см. образцы чернозема № 568 и 569). Относительно двухъ остальныхъ солонцовъ можно было бы предположить, что они образовались на породахъ, въ которыхъ нормальное отношеніе между пескомъ и глиной было уже измѣнено, когда эти породы отлагались въ пониженіяхъ рельефа, образуясь насчетъ болѣе древнихъ отложенийъ. Отсутствіе подробныхъ анализовъ подпочвъ не позволяетъ высказаться за или противъ такого предположенія. Но предположеніе это очевидно не примѣнимо къ подзолу Осиновой, который залегаетъ на лессовидной подпочвѣ и въ которомъ тѣмъ не менѣе относительное количество глины является наименьшимъ. Факту этому мы однако можемъ найти объясненіе, если сравнимъ между собою хотя бы только валовое содержаніе различныхъ веществъ въ почвѣ и подпочвѣ подзоровъ и черноземовъ. Для этой цѣли мы располагаемъ анализами подпочвъ подзола № 557 и чернозема № 569.

Таблица 22.

Характеръ почвы.	P ₂ O ₅	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	K ₂ O	Na ₂ O
Подзолъ, почва, съ глуб. не болѣе 6"	0,023	83,4	8,5	1,1	1,1	1,0	1,4	2,1
Подзолъ, подиоч., съ глуб. не бол. 20"	0,139	66,1	15,5	6,4	1,5	2,3	2,2	2,0
Черноз., почва, съ глуб. не бол. 6"	0,148	64,3	13,6	4,7	1,5	1,8	1,8	1,6
Черноз., подпоч., съ глуб. около 20"	0,150	61,1	12,7	4,8	6,5	2,4	1,5	1,3

Изъ этого сопоставленія мы видимъ, что по составу минеральной части почва и подиочва чернозема разнятся другъ отъ друга больше всего содержаніемъ окиси кальція. Если однако мы вычтемъ всю CaO, связанную съ углекислотой, то получимъ и здѣсь болѣе полное совпаденіе: поверхностный горизонтъ чернозема бѣдае подпочвы лишь углекислой известью. Не то мы видимъ относительно подзола, въ которомъ почва утратила значительную долю металлическихъ окисловъ и P₂O₅; эта утрата произошла путемъ химического разрушенія цеолитныхъ соединеній и выноса металлическихъ окисловъ въ болѣе глубокіе слои, вслѣдствіе чего собственно почвенный горизонтъ сталъ значительно богаче кремнеземомъ.

Еще яснѣе выступаютъ указанныя соотношенія, если вычислить

въ предыдущей таблицѣ вѣ числа на 100 частей минеральной основы почвъ и подпочвъ; тогда мы получимъ слѣдующее сопоставленіе:

Таблица 23.

Характеръ почвы.	Въ 100 ч. минеральной основы:									
	CaCO ₃	P ₂ O ₅	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	K ₂ O	Na ₂ O	
Подзолъ, почва . .	0,06	0,023	84,5	8,6	1,1	1,0	1,0	1,4	2,1	
Подзолъ, подпочва . .	0,04	0,145	69,2	16,2	6,7	1,5	2,4	2,2	2,0	
Черноземъ, почва . .	0,05	0,166	71,9	15,2	5,3	1,6	2,0	2,0	1,8	
Черноземъ, подпочва . .	9,0	0,159	64,9	13,5	5,1	1,9	2,5	1,6	1,4	

Если мы примемъ въ расчетъ, что значительное содержаніе CaCO₃ въ подпочвѣ чернозема понижаетъ процентное содержаніе другихъ веществъ, то придемъ къ заключенію о весьма большой близости валового состава силикатныхъ соединеній почвы и подпочвы данного степного чернозема. Въ подзолѣ же лишь Na₂O содержится въ одинаковомъ количествѣ и въ почвѣ, и въ подпочвѣ; это обусловливается, безъ сомнѣнія, тѣмъ, что больше $\frac{4}{5}$ всей Na₂O извлекаются изъ почвы лишь фтористоводородной кислотой, т.-е. Na₂O входитъ главнымъ образомъ въ составъ безводныхъ силикатовъ почвенного скелета. Относительно всѣхъ остальныхъ металлическихъ окисловъ почва бѣднѣе подпочвы приблизительно вдвое, и если бы не знать отношеній между почвой и подпочвой въ полѣ, то можно было бы предположить, что между ними вѣтъ никакой генетической связи. Любопытнымъ въ данномъ сопоставленіи является, дающе, большая близость валового состава подпочвѣ чернозема и подзола: подпочва подзола отличается отъ подпочвы чернозема главнымъ образомъ малымъ содержаніемъ CaCO₃. Это указываетъ на близость состава лессовидныхъ породъ въ мѣстностяхъ, удаленныхъ другъ отъ друга на значительныя разстоянія.

Что въ подзолахъ дѣйствительно существуетъ процессъ разрушенія цеолитовъ, можно заключить и изъ данныхъ относительно подзола № 554, анализированаго г. Шешуковымъ: изъ чиселъ, относящихся къ этому анализу, видно, что хотя въ почвенномъ горизонте подзола общее количество SiO₂ значительно увеличено (въ почвѣ 79,9, въ подпочвѣ — 67,6%), тѣмъ не менѣе количество кремнезема цеолитнаго (извлекаема-

го содой послѣ обработки почвы соляной кислотой) въ почвѣ (4,8%) почти вдвое меныше, чѣмъ въ подпочвѣ (8,9%); соответственно этому и количество нѣкоторыхъ окисловъ въ почвѣ значительно меныше, чѣмъ въ подпочвѣ. Къ тому же заключенію приводитъ и разсмотрѣніе таблицы, въ которой данъ приблизительный минералогическій составъ; изъ нея обнаруживается, что наиболѣе прочная часть почвенной глины, не извлекаемая уже 10% соляной кислотой (см. рубрику «глина»), въ подзолѣ № 557 достигаетъ почти той же величины, какъ и въ черноземѣ № 552 (изъ той же мѣстности); во количество собственно цеолитовъ въ подзолѣ почти втрое меныше, чѣмъ въ черноземѣ. Напротивъ, изъ анализа вытяжки 10% HCl почвы и подпочвы чернозема № 485 видно, что цеолитныхъ веществъ въ почвѣ содержится даже больше, чѣмъ въ подпочвѣ.

Все это доказываетъ, что минеральная основа почвенного горизонта сибирскихъ подзоловъ подверглась весьма значительному химическому разрушеннію, при чѣмъ вымытыя изъ почвы вещества перенесены въ болѣе или менѣе глубокіе горизонты подпочвы, а почва стала относительно богаче лишь кремнеземомъ. Какъ известно, въ томъ же направленіи идетъ процессъ подзолообразованія и въ Европейской Россіи, почему и сибирские подзолы должны быть признаны гомологами европейскихъ.

Въ черноземахъ степныхъ такого процесса разрушеннія наиболѣе подвижной части почвенной глины, очевидно, не происходитъ, вслѣдствіе чего и почва, и подпочва здѣсь имѣютъ близкій минеральный составъ.

Принимая въ расчетъ сказанное о подзолѣ, намъ нужно посмотретьъ, не объясняется ли и въ солонцахъ бѣдность ихъ глиной наличностью процессовъ, аналогичныхъ подзолообразованію.

Данныя относительно валового состава минеральной части подпочвъ и почвъ структурнаго и безструктурнаго солончаковъ могутъ быть сопоставлены слѣдующимъ образомъ:

Таблица 24.

Въ 100 ч. минеральн. основы.	Na ₂ CO ₃	CaCO ₃	P ₂ O ₅	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	K ₂ O	Na ₂ O
Структ. солон. 534, почва	0,14	—	0,07	82,5	7,8	2,9	1,2	1,8	1,2	1,1
— подпочва . .	—	9,6	0,15	75,5	6,8	2,9	1,2	1,6	1,0	0,9
Безструктур. солон. 551, почва	—	0,10	0,12	78,2	9,9	3,5	1,8	1,5	1,2	1,3
— подпочва . .	—	1,00	0,15	75,9	11,3	4,8	1,1	2,3	1,8	1,4

Отсюда прежде всего можно видеть, что подпочвы обоихъ солонцовъ богаче кремнекислотой, чѣмъ лессовидные суглинки, образующіе подпочву подзоловъ и черноземовъ; но при этомъ отношенія между кремнекислой и суммой металлическихъ окисловъ въ почвѣ и подпочвѣ обоихъ солонцовъ не одинаковы, а именно: въ структурномъ солонцѣ эти отношенія очень близки (въ почвѣ 5,1, въ подпочвѣ 5,2), а въ безструктурномъ почва богаче кремнекислой (4,1), чѣмъ подпочва (3,3), хотя не такъ рѣзко, какъ это наблюдается для подзола, гдѣ эти отношенія 5,6 и 2,2. Приведенные данные указываютъ съ иѣкоторой вѣроятностью на существование и въ безструктурномъ солонцѣ процесса, аналогичного подзолообразованію; это не представляется удивительнымъ послѣ работы г. Козловскаго¹⁾. Подобнаго заключенія нельзя сдѣлать относительно структурного солонца, въ которомъ почва и подпочва весьма близки по составу, такъ что изъ аналитическихъ данныхъ можно было бы вывести, что структурный солонецъ образовался на породѣ, богатой кварцевымъ пескомъ, при чемъ процессъ почвообразованія здѣсь, какъ и въ черноземахъ, не привелъ къ серьезнымъ измѣненіямъ въ составѣ минеральной части. Думаю однако, что подобный выводъ едва ли оказался бы вѣрнымъ, если бы мы располагали болѣе обширными аналитическими данными. Ясно, что на основаніи предыдущаго анализа мы не могли бы прійти къ правильнымъ заключеніямъ, если бы подзолообразовательный процессъ въ данномъ солонцѣ, вообще болѣе слабый, чѣмъ въ подзолѣ, охватилъ материнскую породу на значительную глубину: только анализъ болѣе глубокаго слоя подпочвы могъ бы решить этотъ вопросъ. Однако, если допустить даже, что анализъ собраннаго горизонта С даетъ совершенно вѣрное представление о составѣ минеральной части материнской породы данной почвы, изъ разсмотрѣнія морфологическихъ ея особенностей становится вѣроятнымъ вымываніе иѣкоторыхъ соединеній въ болѣе глубокихъ слояхъ: именно, дневной горизонтъ почвы представляетъ сѣрую супесчанистую корку въ 3" толщиною, подъ которой уже начинается анализированный столбчатый горизонтъ; столбы съ поверхности по трещинамъ, т.-е. въ мѣстахъ наибольшаго проникновенія растворовъ, представляются обсыпанными мелкимъ пескомъ, тогда какъ ни внутри ихъ, ни въ подпочвѣ супесчаный характеръ не замѣтенъ. Поверхностная корка представляетъ, безъ сомнѣнія, горизонтъ, который испыталъ наиболѣе разрушеніе; глинистыхъ частицъ въ немъ осталось уже весьма мало; соединенія глины отчасти вынесены въ подпочву, отчасти несомнѣнно отложились въ ближайшемъ горизонте, который пріобрѣлъ столбчатую структуру. Тождественность минерального состава столбчатаго горизонта

¹⁾ «Къ вопросу о растворимости перегноя», 8 вып. «Материалы по изуч. русск. почвъ», 1893 г., стр. 79.

и подпочвы, очевидно, могла бы при этомъ сохрачиться, если бы одновременно въ столбчатомъ горизонѣ происходилъ процессъ разрушенія и вынесенія вглубь части минеральныхъ веществъ. Нѣкоторое указаніе на такой выносъ извѣстныхъ соединеній изъ столбчатаго горизонта даетъ содержаніе въ немъ фосфорной кислоты, уменьшенное по сравненію съ подпочвой, какъ и въ подзолѣ.

Поэтому, даже и относительно данного структурнаго солонца есть вѣроятность существованія въ немъ процесса, аналогичнаго подзолообразованію; выше было указано, что между структурными солонцами попадаются такие, гдѣ этотъ процессъ выражается весьма ясно и въ наружныхъ признакахъ.

Любопытнымъ, далѣе, является то обстоятельство, что во всѣхъ анализированныхъ солонцеватыхъ почвахъ, не исключая и солонцеватаго чернозема № 526, содержаніе цеолитныхъ веществъ меньше, чѣмъ въ черноземахъ не солонцеватыхъ; мы увидимъ, что и въ этихъ послѣднихъ какъ будто происходитъ уменьшеніе въ содержаніи цеолитовъ, разъ на нихъ поселяется лѣсъ. Приведенныхъ данныхъ, конечно, недостаточно для рѣшенія этого вопроса, но они даютъ указаніе, что можетъ быть, только при комплексѣ условій, господствующихъ въ степи, содержаніе въ почвѣ цеолитовъ не уменьшается по сравненію съ подпочвой, а иногда даже и увеличивается; при повышеніи влажности, происходящемъ въ лѣсахъ, а тѣмъ болѣе въ котловинкахъ, гдѣ застаивается вода, наоборотъ, начинается обѣденіе почвы цеолитными соединеніями. Эти же данные заставляютъ меня недовѣрчиво относиться къ мнѣнію о сухопутно-болотномъ происхожденіи разныхъ «черноземовъ». Во всякомъ случаѣ нельзѧ не пожелать скорѣйшей разработки вопросовъ, здѣсь затронутыхъ, именно относительно Сибири, гдѣ еще растительная физіономія страны не слишкомъ измѣнена культурой. Необходимо только, чтобы будущія изслѣдованія производились лицами, достаточно ориентированными и въ почвахъ, и въ растительности, и слѣдовательно могущими отличить слабые солонцы и солонцеватые черноземы отъ черноземовъ обычныхъ. Безъ соблюденія этого условія можно получить результаты, которыми вопросъ о происхожденіи чернозема будетъ еще болѣе затмненъ.

Если оцѣнивать содержаніе въ почвахъ глины лишь приблизительно (умножая на 4 количество Al_2O_3 , извлекаемаго сѣрной кислотой), то для черноземовъ, анализированныхъ Лабораторіей М. З., получается вариаціи отъ 37 до 47%, а для черноземовъ, анализированныхъ г. Шешуковымъ—отъ 29 до 43; такимъ образомъ, и по анализамъ г. Шешукова сибирскіе черноземы оказываются сильно глинистыми.

Песчаная часть тобольскихъ почвъ состоитъ преимущественно изъ кварцеваго песка: этого послѣдняго въ черноземахъ въ 2—3 раза больше,

чѣмъ песка силикатнаго, состоящаго изъ неразложенныхъ безводныхъ силикатовъ; приблизительно таковы же отношенія между пескомъ кварцевымъ и силикатнымъ и въ черноземныхъ почвахъ, кромѣ структурнаго солонца № 534, въ которомъ кварцеваго песка значительно больше, какъ можно убѣдиться изъ слѣдующей таблицы, въ которой содержаніе цеолитовъ, всей глины и песка вычислено въ процентахъ минеральной основы почвъ.

Таблица 25.

Въ 100 частяхъ минеральной основы почвъ содержащихся:	Черноземы.						Солонцы.			Под- золъ.
	485	523	562	552	568	569	534	551	571	
цеолитовъ . . .	43,4	34,4	38,5	30,9	34,6	35,0	18,6	22,6	24,7	10,0
всей глины . . .	50,4	46,0	50,5	47,0	46,0	43,9	25,3	34,2	38,5	22,5
песка силикатнаго	13,8	12,6	18,1	16,2	20,6	19,8	12,6	14,5	18,5	25,3
песка кварцеваго .	35,5	41,1	38,1	36,8	34,7	36,4	61,4	50,9	32,3	52,8

Изъ этой таблицы можно видѣть, что минеральная основа черноземовъ не бѣднѣе силикатнымъ пескомъ, чѣмъ таковая же у почвъ солонцеватыхъ, что должно было бы быть, если бы при превращеніи солонцеватыхъ почвъ въ черноземные безводные силикаты первыхъ превращались въ водные, о чёмъ уже была рѣчь выше.

По содержанію невывѣтрѣлыхъ силикатовъ тобольскіе черноземы едва ли уступаютъ нижегородскимъ «черноземамъ плато»: такъ напр., Ключищепскій и Пермѣевскій черноземы содержать по 4,5% полуторныхъ окисловъ, извлекаемыхъ только фтористоводородной кислотой, т.-е. 23—26% общаго ихъ количества, тогда какъ въ ту же кислоту изъ тобольскихъ черноземовъ переходитъ только 2,1—3,2% полуторныхъ окисловъ, т.-е. 13—19% общаго количества; тоже относится и къ K₂O, по щелочно-земельныхъ окисловъ, извлекаемыхъ только фтористоводородной кислотой, въ сибирскихъ черноземахъ больше, чѣмъ въ нижегородскихъ.

Высокое содержаніе «глины» въ общемъ составѣ тобольскихъ черноземовъ свидѣтельствуетъ о большой растворимости различныхъ окисловъ въ сѣрной кислотѣ. И въ самомъ дѣлѣ, въ вытяжку сѣрной кислотой изъ черноземовъ не переходитъ: K₂O 33—43, CaO 13—25, MgO

11—18 и полуторныхъ окисловъ 13—19 процентовъ общаго количества (см. табл. 15). Окись Na представляетъ въ этомъ отношеніи исключеніе, ибо изъ общаго ея количества въ сѣрной кислотѣ нерастворимо: въ черноземахъ 70—79, а въ подзолѣ — 87%; зато въ солонцеватыхъ почвахъ растворимость Na_2O въ сѣрной кислотѣ значительно выше (37—43%).

Изъ разсмотрѣнія данныхъ относительно вытяжки десятипроцентною соляною кислотою обнаруживается, что глинистая часть тобольскихъ черноземовъ состоитъ главнымъ образомъ изъ цеолитныхъ соединеній: на долю цеолитовъ изъ общаго количества глины приходится отъ 66 до 86 процентовъ (послѣднее — въ глинистомъ черноземѣ № 485); въ подзолѣ рѣзко уменьшено именно количество цеолитовъ (44% общаго количества глины), тогда какъ наиболѣе прочныхъ соединеній, входящихъ въ составъ глины и разлагаемыхъ лишь сѣрной кислотой, содержится въ немъ приблизительно столько же, сколько и въ черноземѣ изъ той же мѣстности (№ 552). Отсюда слѣдуетъ, что и десятипроцентная соляная кислота извлекаетъ изъ тобольскихъ черноземовъ различные окислы въ количествахъ весьма значительныхъ, такъ что на долю одной сѣрной кислоты остается обыкновенно лишь небольшой процентъ даниаго основанія. Въ этомъ отношеніи наблюдаются однако значительныя вариаціи, указывающія на неодинаковый составъ наиболѣе прочной части почвенной глины въ различныхъ образцахъ: изъ таблицы 15 видно, что въ этой части наибольшими колебаніями, въ черноземахъ, отличается содержаніе K_2O , CaO и полуторныхъ окисловъ. Составъ цеолитныхъ соединеній глины въ черноземахъ отличается напротивъ значительнымъ постоянствомъ, какъ можно видѣть изъ таблицы, въ которой данъ процентный составъ цеолитной части. Любопытно, что въ двухъ изъ солонцеватыхъ почвъ содержаніе полуторныхъ окисловъ въ цеолитной части, по сравненію съ черноземами, не увеличено, а уменьшено (злой солонецъ № 571 и въ этомъ отношеніи представляетъ исключеніе). Въ подзолѣ сразу бросается въ глаза максимальное содержаніе кремнекислоты въ составѣ цеолитной части. Если вычислить отношеніе SiO_2 къ Al_2O_3 въ цеолитахъ, то получимъ, что для черноземовъ степныхъ это отношеніе измѣняется отъ 2,2 до 2,5, для черноземовъ лѣсныхъ — 2,6 и 2,9, для злого солонца № 571 — 2,2, для структурного соловца — 2,7, для слабаго безструктурнаго — 3,3 и для подзола — 4,9. Можно предположить, что въ подзолѣ максимальное отношеніе обусловливается тѣмъ, что часть кремнезема изъ разрушенныхъ почвообразовательнымъ процессомъ цеолитовъ не теряетъ еще способности растворяться въ углекислой щелочи¹⁾; вѣроятно, тѣмъ же

¹⁾ Проф. В. И. Сорокинъ нашелъ, что и въ казанскихъ подзолахъ содержится «водный кремнеземъ, растворимый въ содѣ». Тр. Каз. О. Ест., XXXI, вып. 5, стр. 20.

обуславливается и величина данного отношения въ безструктурномъ слабомъ солонцѣ, для которого наличие подзолообразовательного процесса пришлось допустить изъ сравненія минерального состава почвы и подпочвы.

По поводу растворимости различныхъ веществъ въ десятипроцентной соляной кислотѣ надлежитъ указать еще разъ, что между анализами разныхъ аналитиковъ не существуетъ согласія какъ относительно общаго количества окисловъ, извлекаемыхъ 10% HCl, такъ и относительно отдѣльныхъ составныхъ частей вытяжки; такъ, напр., по анализамъ г. Шешукова, содержаніе K₂O въ верхнемъ горизонте черноземовъ варьируетъ отъ 0,211 до 0,461, по анализамъ же Лабораторіи М. З.—отъ 0,700 до 1,056; тоже замѣчается и относительно нѣкоторыхъ другихъ окисловъ, кроме Na₂O, абсолютные количества которой въ обоихъ рядахъ анализъ приблизительно одинаковы (0,180—0,308 въ анализахъ Шешукова и 0,234—0,306 въ анализахъ Лаб.).

Въ вытяжку горячей соляной кислотой изъ тобольскихъ черноземовъ переходятъ весьма значительныя количества различныхъ металлическихъ окисловъ: MgO—57—70, CaO—65—75, Al₂O₃+Fe₂O₃—55—71 и K₂O—40—60% общаго количества; по растворимости въ этомъ реагентѣ окиси калия тобольские черноземы превосходятъ даже нижегородскіе, а тѣмъ болѣе полтавскіе, изъ которыхъ переходитъ въ этотъ реагентъ всего 13—27 процентовъ K₂O¹⁾.

Изъ подзола въ десятипроцентную соляную кислоту переходятъ лишь незначительныя количества вышеупомянутыхъ оснований; нѣсколько большие извлекаются ихъ изъ солонцеватыхъ почвъ, въ которыхъ является повышенной, сравнительно съ черноземами, лишь растворимость въ 10% HCl окиси натрія (31—42% общаго количества).

Принимая во вниманіе высокую растворимость различныхъ составныхъ частей сибирскихъ черноземовъ въ десятипроцентной соляной кислотѣ, можно было бы ожидать, что и общее количество веществъ, извлекаемыхъ болѣе слабой кислотой (HCl 1%), будетъ для нихъ не ниже, чѣмъ для черноземовъ нижегородскихъ и полтавскихъ. Анализы показываютъ однако, что только изъ трехъ образцовъ чернозема извлекается однопроцентной соляной кислотой свыше 4% различныхъ веществъ, для остальныхъ же образцовъ чернозема эта величина ниже 4% (3,8—2,8), тогда какъ въ нижегородскихъ черноземахъ плато она около 6%, да и для большинства полтавскихъ не ниже 4,6%. Въ нижегородскихъ черноземахъ вещества, извлекаемыя однопроцентной соляной кислотой, образуютъ большую частью около 20% всѣхъ веществъ, переходящихъ въ горячую соляную кислоту, а въ подзолистой почвѣ Работокъ даже выше

¹⁾ «Мат. къ оцѣнкѣ земель Полт. губ.», XVI, 252.

20%. Въ тобольскихъ черноземахъ это отношеніе всегда меныше (9—15, а для подзола Осиновой—8%); можно думать, что эта особенность представляетъ явленіе постоянное для черноземовъ изслѣдованного района.

Наименьшее абсолютное количество веществъ, растворимыхъ въ слабой соляной кислотѣ, приходится на подзолъ—0,76%, при чемъ оказывается, что изъ нижегородскихъ почвъ къ подзолу Осиновой, по величинѣ этой вытяжки, подойдутъ лишь нѣкоторыя песчаныя почвы.

Растворимость K_2O въ однопроцентной HCl не особенно велика (0,1—0,2% или 7—10% общаго количества въ черноземахъ), хотя въ общемъ больше, чѣмъ въ черноземахъ нижегородскихъ, гдѣ она въ нѣкоторыхъ образцахъ едва достигаетъ 0,1, а въ другихъ падаетъ до 0,03; поэтому, въ нижегородскихъ черноземахъ K_2O образуетъ отъ 0,8 до 2,3% всѣхъ веществъ, извлекаемыхъ однопроцентной HCl , а въ тобольскихъ — отъ 2,3 до 6,8%. Наименьшее содержаніе K_2O въ данной вытяжкѣ приходится на подзолъ и на два изъ анализированныхъ солонцовъ. Иныхъ отношеній обнаруживаетъ окись натрія: въ вытяжкахъ слабой кислотой изъ черноземовъ и подзола она содержится вообще лишь въ сотыхъ доляхъ процента, въ почвахъ же солонцеватыхъ растворимость ся въ данномъ реактивѣ сильно повышается. Такимъ образомъ, въ тобольскихъ черноземахъ и солончакахъ K_2O входитъ въ составъ главнымъ образомъ болѣе прочныхъ соединеній, разлагаемыхъ лишь крѣпкою соляною кислотою (въ этомъ видѣ содержаніе K_2O колеблется въ предѣлахъ 32—50% общаго количества); приблизительно въ такомъ же положеніи находится и Na_2O въ черноземахъ и подзолахъ, образуя лишь 1—8% легкорастворимыхъ соединеній; въ солончакахъ же въ видѣ такихъ соединеній находится 16—33% общаго количества Na_2O . Изъ таблицы относительно водной вытяжки видно, что значительная часть Na_2O приходится на растворимая въ водѣ соли; если принять въ расчетъ соответственныя числа, то окажется, что въ одной слабой соляной кислотѣ изъ солонцовыхъ почвъ растворяется 0,108—0,151 Na_2O , т.-е. 8—10% общаго ея количества; такъ какъ несомнѣнно и въ черноземахъ часть Na_2O находится въ видѣ растворимыхъ въ водѣ солей, то оказывается, что въ солончакахъ растворимость Na_2O въ слабой кислотѣ сравнительно повышена.

Больше половины общаго содержанія CaO изъ всѣхъ почвъ, за исключеніемъ подзола и структурнаго солонца, извлекается однопроцентной соляной кислотой, такъ что въ видѣ болѣе прочныхъ цеолитныхъ соединеній остается лишь $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{14}$ часть всей CaO . Окись магнія, наоборотъ, въ черноземахъ и подзолѣ существуетъ въ видѣ болѣе прочныхъ соединеній, въ составъ которыхъ въ черноземахъ входитъ 45—51% всей MgO , тогда какъ слабой соляной кислотой извлекается всего 12—20% этого основанія. Солонцеватыя почвы, по общему содержанію MgO ,

извлекаемой крѣпкой соляной кислотой, не отличаются отъ черноземовъ, но изъ нихъ однопроцентная соляная кислота извлекаетъ окисимагнія значительно больше, чѣмъ изъ черноземовъ (приблизительно 25—35% общаго содержанія); за вычетомъ отсюда MgO, входящей въ составъ растворимыхъ въ водѣ солей, остаются все же такія количества MgO, которые показываютъ, что растворимость этого окисла, какъ и Na₂O, въ солонцеватыхъ почвахъ повышена по сравненію съ почвами черноземными.

Главная масса полуторныхъ окисловъ, извлекаемыхъ крѣпкою соляною кислотою, находится въ тобольскихъ почвахъ въ видѣ болѣе прочныхъ цеолитныхъ соединеній (въ черноземахъ 49—63, въ солончакахъ 40—48 и въ подзолѣ — 21% общаго содержанія), а на долю однопроцентной соляной кислоты приходится лишь небольшія ихъ количества (1—10%).

Общее количество кремнезема для тобольскихъ черноземовъ варьируетъ отъ 65 до 59%, опускаясь, по анализамъ г. Шешукова, до 57%; въ солонцеватыхъ почвахъ валовое содержаніе SiO₂ то приблизительно таково же (56% въ безструктур. солонцѣ № 571), то значительно больше (до 77% въ структурномъ солонцѣ); наконецъ, въ подзолахъ содержатся наибольшія количества кремнезема — 83 и 80%.

Сообразно съ тѣмъ, что было сказано относительно растворимости металлическихъ окисловъ въ соляной кислотѣ разной крѣпости, оказывается, что послѣ обработки крѣпкой соляной кислотой извлекается изъ глинистаго чернозема около 1/3, а изъ прочихъ черноземовъ 1/4—1/5 всей кремнекислоты; въ почвахъ солонцеватыхъ и въ подзолѣ содержаніе цеолитной кремнекислоты, и абсолютное и относительное, значительно меньше. Въ одной сѣрной кислотѣ (за вычетомъ цеолитной кремнекислоты) растворяется SiO₂ вообще меньше, чѣмъ въ соляной, и наконецъ большая часть SiO₂ (въ черноземахъ около 2/3, въ остальныхъ почвахъ еще больше) сосредоточена въ почвенномъ скелете.

Общее содержаніе фосфорной кислоты въ тобольскихъ почвахъ, по анализамъ Лабораторіи М. З., варьируетъ въ черноземахъ отъ 0,11 до 0,19, наибольшее число получено для безструктурнаго солонца № 571 — 0,24, а наименьшія — для верхнихъ горизонтовъ подзола и структурнаго солонца: 0,02 и 0,07, при чѣмъ въ подпочвахъ этихъ почвъ содержаніе P₂O₅ значительно возрастаетъ: 0,14 и 0,16. Было уже отмѣчено, что анализы г. Шешукова даютъ въ среднемъ болѣе высокое содержаніе P₂O₅ въ тобольскихъ черноземахъ; минимальное число (0,15) получено г. Шешуковымъ, какъ и Лабораторіей М. З., для глинистаго чернозема, для лессовыхъ же черноземовъ опредѣлено значительно больше P₂O₅ (до 0,41). Для подзола и г. Шешуковымъ констатировано возрастаніе количества P₂O₅ въ подпочвѣ (0,10) по сравненію съ почвой (0,04).

Что касается до растворимости Р₂O₅ въ разныхъ реактивахъ, то лишь изъ подзола и безструктурного солонца № 571 растворяются приблизительно одинаковыя количества въ кислотахъ сърной, крѣпкой соляной и слабой соляной. Для остальныхъ почвъ максимальная растворимость падаетъ на десятипроцентную соляную кислоту (86—93 процента валового содержанія Р₂O₅ переходитъ въ эту кислоту), въ слабой же соляной растворяется изъ черноземовъ 12—20 и maximum—31% всей Р₂O₅, т.-е. большая часть фосфорной кислоты въ тобольскихъ черноземахъ содержится въ видѣ болѣе прочныхъ соединеній. Такимъ образомъ, при меньшемъ валовомъ содержаніи (принимая въ расчетъ лишь анализы Лабораторіи М. З.) изъ тобольскихъ черноземовъ переходитъ въ слабую соляную кислоту столько же, или даже больше Р₂O₅, чѣмъ изъ черноземовъ плато полтавскихъ, и гораздо менѣе, чѣмъ изъ черноземовъ и нѣкоторыхъ суглинистыхъ почвъ Нижегородской губ., отличающихся вообще очень высокой растворимостью Р₂O₅ въ слабой соляной кислотѣ¹⁾.

Переходя теперь къ разсмотрѣнію данныхъ относительно водной вытяжки, слѣдуетъ прежде всего замѣтить, что опредѣленіе хотя бы только общаго количества солей, извлекаемыхъ водой изъ данной почвы, заслуживаетъ самаго широкаго примѣненія при почвенныхъ анализахъ. Признаки, по которымъ уже въ полѣ опредѣляется систематическое мѣсто данной почвы, нерѣдко являются недостаточно рѣзко выраженнымъ, а возможность примѣнять для данной цѣли указанія со стороны растильности не особенно распространена у лицъ, занимающихся почвовѣдѣніемъ, ибо таковыя—чаще геологи, чѣмъ ботаники. Съ другой стороны, обыкновенные приемы анализа—опредѣленіе гумуса, цеолитовъ и глины—не даютъ никакихъ матеріаловъ для заключеній о солонцеватости почвы, и потому несомнѣнно возможны случаи смѣщенія черноземовъ съ солонцами. Для примѣра стоитъ привести данные относительно соловецватой почвы № 551: почва эта была взята на неясно выраженной грибѣ, возвышающейся надъ солонцеватой переймой, притомъ на полѣ, гдѣ росла пшеница; ростъ послѣдней былъ неудовлетворителенъ, но на это могло быть не обращено вниманія; структурные особенности могли быть разрушены обработкой; тонъ окраски, темносѣрый, самъ по себѣ не очень важенъ, тѣмъ болѣе, что гумуса въ этой почвѣ опредѣлено свыше 8%; содержаніе цеолитовъ (около 21%) и глины (около 31%) довольно значительно. Руководствуясь только этими данными, можно было бы отнести эту почву и къ черноземамъ. Такой ошибки конечно можно было избѣжать, ибо солонцеватость почвы выдавали росшія въ пшеницѣ формы (*Plantago Cornuti*, *Saussurea amara*), но не всякий почвовѣдъ умѣетъ

¹⁾ «Мат. къ оцѣнкѣ зем. Полт. губ.», XVI, 254; «Мат. къ оц. зем. Нижег. губ.», XIV, 149.

ихъ отличать; въ данномъ случаѣ опредѣленіе общаго количества растворимыхъ въ водѣ солей могло бы открыть глаза на истинную природу почвы и избавило бы отъ ошибочныхъ сопоставлений. Мы видѣли уже, что въкоторымъ авторамъ удавалось находить корневища болотныхъ травъ въ подпочвѣ «черноземовъ»; едва ли можно повѣрить, что въ такихъ случаяхъ не происходило смѣшанія солонцовъ съ черноземами. Какъ бы то ни было, нельзя отрицать возможности подобныхъ ошибокъ и потому слѣдуетъ настоятельно рекомендовать опредѣленіе хотя бы только общаго количества растворимыхъ солей въ почвахъ изъ степныхъ мѣстностей.

Изъ таблицъ видно, что количество извлекаемыхъ водою солей въ подзолѣ — наименьшее (0,041); въ черноземахъ оно вообще больше и въ двухъ образцахъ изъ 6 достигаетъ 0,1% ; едва ли случайнымъ является то, что наибольшее содержаніе солей въ среднемъ приходится на черноземы «степные». Къ сожалѣнію, нѣтъ материала для сравненія по вопросу о количествѣ легкорастворимыхъ солей въ различныхъ черноземахъ¹⁾; кромѣ того, въ моихъ примѣрахъ неизвѣстенъ и составъ этихъ солей, между тѣмъ этотъ составъ можетъ быть въ значительной степени различенъ въ черноземахъ близкихъ. Относительно въкоторыхъ образцовъ я могу лишь указать, что между растворимыми въ водѣ солями хлористымъ принадлежитъ весьма скромное мѣсто, ибо водная вытяжка изъ нихъ (нº 485, 568 и 569) даетъ лишь слабую муть съ растворомъ AgNO_3 .

Въ солонцеватыхъ почвахъ содержаніе легко растворимыхъ солей значительно больше, чѣмъ въ черноземахъ. Даже въ поверхностномъ горизонтѣ структурного солонца оно достигаетъ 0,2%, въ слабомъ солонцѣ безструктурномъ повышается почти до 0,3 и въ «зломъ» солонцѣ № 571 доходитъ до 1,3 процента; этотъ послѣдній случай не представляетъ однако крайняго максимума въ содержаніи легко растворимыхъ солей, ибо, напр., въ воздушно-сухомъ поверхностномъ горизонтѣ злого солонца изъ Арлагуля (нº 312) одного только хлора опредѣлено 1,038%. Въ солонцахъ № 534 и 551 было сдѣлано опредѣленіе солей и въ верхнемъ горизонтѣ ихъ подпочвы, при чемъ обнаружилось, что въ обоихъ содержаніе солей съ глубиной возрастаетъ.

1) Въ настоящее время опредѣленіе валового содержанія растворимыхъ солей въ почвахъ въ Америкѣ производится, повидимому, весьма просто уже прямо на экскурсіи при помощи особаго электрическаго прибора; см. Whitney and Means «The alcali soils of the Yellowstone Valley», въ № 14 «Bull. Depart. of Agriculture, Div. of Soils». 1898, стр. 20. Этотъ способъ применимъ, однако, скорѣе для стационарныхъ изслѣдований въ мѣстностяхъ, уже изученныхъ, чѣмъ въ нашей экскурсионной практикѣ.

О характерѣ и составѣ этихъ солей даетъ понятіе таблица, въ которой сопоставлены данные относительно водной вытяжки. Изъ этой таблицы видно, что изъ безструктурныхъ солонцовъ № 551 и 571 вода извлекаетъ значительныя количества хлора и сѣрной кислоты, и реакція вытяжки имѣеть нейтральный характеръ. Совсѣмъ другое замѣчается относительно верхняго столбчатаго горизонта структурнаго солонца № 534: вода извлекаетъ изъ него весьма небольшія количества Cl и SО₃, которыхъ по расчету не хватить для насыщенія всей окиси натрія, содержащейся въ томъ же горизонтѣ, не говоря уже о другихъ основаніяхъ. Нельзя разсчитывать, что въ этой почвѣ избыточныя основанія нашли для своего насыщенія достаточныя количества кислотъ фосфорной или азотной; также мало вѣроятно и насыщеніе ихъ кислотами органическими; все это, вмѣстѣ съ щелочной реакцией вытяжки, приводить къ заключенію, что въ поверхностномъ горизонтѣ структурнаго солонца по крайней мѣрѣ часть Na₂O связана съ СО₂, которой содергится здѣсь не меныше, чѣмъ въ поверхностномъ горизонтѣ черноземовъ. Любопытно, что въ подпочвѣ того же солонца количество Na₂O возрастаетъ въ водной вытяжкѣ приблизительно въ полтора раза, но сильно уменьшается количество всѣхъ другихъ основаній; зато содержаніе хлора увеличивается въ три съ половиною, а сѣрной кислоты—даже въ семь разъ, при чёмъ и реакція вытяжки дѣлается уже нейтральной: въ подпочвѣ данного солонца, какъ и въ солонцахъ безструктурныхъ, очевидно, нѣть углекислой щелочи (такое измѣненіе реакціи съ щелочной въ почвѣ на нейтральную въ подпочвѣ замѣчено мною и еще въ нѣкоторыхъ солонцахъ, напр. № 607, а въ нѣкоторыхъ другихъ щелочная реакція наблюдалась и въ верхнемъ горизонтѣ подпочвы, напр. № 615). Такимъ образомъ, весьма характерной чертой химической природы структурнаго солонца № 534 является присутствіе въ его столбчатомъ горизонтѣ углекислой щелочи; въ немъ, слѣдовательно, мы имѣемъ гомолога тѣхъ щелочныхъ солонцовъ, которые описаны въ извѣстной работѣ проф. Hilgard'a для Калифорніи; структурные особенности сибирскаго солонца соотвѣтствуютъ тому, что говоритъ Hilgard о структурѣ калифорніскихъ щелочныхъ солонцовъ¹⁾.

Имѣя въ виду вышеуказанное совпаденіе между структурными особенностями и содержаніемъ углекислого натрія въ столбчатомъ горизонтѣ № 534-го, было любопытно прослѣдить, не совпадаетъ ли данная структура съ этой химической особенностью и въ другихъ структурныхъ солонцахъ, довольно распространенныхъ какъ въ Тобольской губерніи, такъ, вѣроятно, и въ другихъ мѣстностяхъ, гдѣ имѣются солонцеватыя

1) «Contributions à l'étude du salant», Annales agronom., 1893, 109—110.

почвы. Если бы это совпадение оправдалось, то по характерной структурѣ уже въ полѣ можно бы дѣлать заключенія и о нѣкоторыхъ химическихъ свойствахъ даннаго солонца. Литературныхъ показаній по этой части для Россіи мнѣ неизвѣстно, ибо до недавняго времени, по справедливому замѣчанію К. Д. Глинки, углекислаго натрія «не находили и даже не искали въ нашихъ солонцахъ»¹⁾). Нѣсколько косвенныхъ указаній по этому предмету получилъ я, пробуя реакцію водныхъ вытяжекъ изъ разныхъ солонцеватыхъ почвъ. Изъ этихъ пробъ выяснилось, что ясная щелочная реакція не свойственна солонцамъ безструктурнымъ: изъ 10 образцовъ она была констатирована лишь въ одномъ солонцѣ изъ Атбасарскаго уѣзда, другіе же давали либо совсѣмъ нейтральную реакцію, либо лишь намеки на щелочность, подобно многимъ черноземамъ, какъ солонцеватымъ, такъ и не солонцеватымъ. Зато въ 10 образцахъ изъ 13 солонцовъ структурныхъ реакція была болѣе или менѣе сильно щелочная, а въ остальныхъ трехъ—слабо щелочная. Поэтому, до болѣе подробныхъ и точныхъ наблюденій, приходится считать вѣроятнымъ, что структурные солонцы суть именно солонцы щелочные.

Въ связи съ содержаніемъ углекислой щелочи стоитъ и окрашиваніе водной вытяжки изъ такихъ солонцовъ, иногда очень интенсивное, въ бурый цвѣтъ. Можно прибавить еще, что при приготовленіи водныхъ вытяжекъ изъ столбчатыхъ горизонтовъ съ пятерымъ по вѣсу количествомъ воды образовалась въ нѣсколькихъ случаяхъ вязкая, не отстывающаяся масса, переливающаяся съ трудомъ; очевидно, въ нѣкоторыхъ изъ структурныхъ солонцовъ образуются съ водой какіе то студенистые гидраты.

Кромѣ вышеуказанной особенности—присутствія углекислой щелочи—структурный солонецъ № 534 отличается отъ двухъ безструктурныхъ высокимъ содержаніемъ K_2O и MgO въ водной вытяжкѣ, что особенно странно при небольшомъ количествѣ въ немъ легко растворимыхъ солей вообще. По абсолютному содержанію MgO его превосходитъ лишь «злой» солонецъ № 571, а содержаніе K_2O въ структурномъ солонцѣ является наибольшимъ (0,028, тогда какъ въ верхнихъ горизонтахъ двухъ другихъ солонцовъ—0,005 и 0,014).

Очень рѣзко эти различія въ составѣ водной вытяжки солонца структурного выступаютъ, если принять въ верхнемъ его горизонте общее содержаніе солей за 100 и сообразно съ этимъ вычислить общее содержаніе солей и отдельныхъ окисловъ въ другихъ солонцахъ.

¹⁾ «Мат. къ оцѣнкѣ земель Полт. губ.», XVI, 287.

Таблица 26.

№	CaO	MgO	K ₂ O	Na ₂ O	Cl	SО ₃	Сумма
Структ. солон. 534, гор. А	8,4	23,6	14,6	45,0	5,8	2,6	100,0
— гор. С .	2,6	1,0	5,2	72,2	20,7	19,4	121,1
Безструктур. сол. 551, гор. А	13,1	5,8	2,6	57,1	43,4	25,1	147,1
— гор. С .	15,2	17,8	5,8	146,1	138,7	61,2	384,8
Безструктур. сол. 571, гор. А	69,0	44,0	7,3	244,5	208,4	180,6	753,9

Изъ этого сопоставлениі видно, что увеличеніе солонцеватости въ рѣзкихъ солонцахъ происходитъ насчетъ хлористыхъ и сѣрнокислыхъ солей, главнымъ образомъ натрія, а затѣмъ уже и щелочноземельныхъ металловъ. Калій въ рѣзкихъ солонцахъ роли не играетъ и, при увеличеніи общаго содержанія солей въ $7\frac{1}{2}$ разъ, содержится въ зломъ солонцѣ въ количествѣ вдвое меньшемъ, нежели въ бѣдномъ солями солонцѣ структурномъ.

Дальнѣйшимъ аналитическимъ изслѣдованіямъ предстоитъ рѣшить, насколько другимъ структурнымъ солонцамъ присущи особенности, о которыхъ было говорено раньше: высокое содержаніе песка, уменьшенное сравнительно съ подпочвой содержаніе Р₂О₅, присутствіе углекислой щелочи въ водной вытяжкѣ и относительное богатство ея окисью калія; пока вѣтъ особыхъ оснований предполагать, что всѣ эти свойства окажутся присущими и солонцамъ безструктурнымъ, а потому слѣдуетъ признать, что отдѣленіе солонцовъ структурныхъ въ особую группу оправдывается и съ точки зрѣнія ихъ состава.

Намъ нужно еще остановиться на аналитическихъ данныхъ Лаб. М. З. относительно поглотительной способности и гигроскопичности тобольскихъ почвъ; соотвѣтственные данные сгруппированы въ прилагаемой таблицѣ.

Таблица 27.

Гориз. А № почвы.	485	523	562	552	568	569	557	534	551	571
Поглотительная способность ¹⁾	145,81	122,63	112,97	108,17	102,11	107,86	28,52	114,39	103,71	110,06
Гигроскопичн ²⁾	18,13	14,57	16,23	12,04	13,39	13,25	2,12	8,58	11,42	24,45

¹⁾ По отношенію къ амміаку, по Кнопу, см. König, Unters. landw. wichtiger Stoffe, 2. Aufl., 51.

²⁾ Т.-е. количество вѣсовъ частей воды, поглощенной изъ насыщенного водянымъ паромъ пространства 100 частями сухой почвы.

Изъ этой таблицы видно, что поглотительная способность тобольскихъ почвъ, выраженная въ к. см. азота, поглощенного изъ раствора NH_4Cl 100 gr почвы, оказалась вообще очень значительной: почвы черноземный и солончаковый поглотили не меньше половины всего азота, бывшаго въ растворѣ, и только подзолъ удержалъ немногимъ больше $1/7$, какъ и слѣдовало ожидать. Изъ черноземныхъ почвъ громадной поглотительной способностью обладаетъ глинистый черноземъ Сорочьей степи (больше 70% всего азота), значительно превосходящій въ этомъ отношеніи лессовый черноземъ изъ той же мѣстности (60 съ небольшимъ % N); остальные лессовые черноземы удерживаютъ 51—56% N, какъ и почвы соловцеватыя, при чмъ не обнаруживается зависимости между величиной поглощенія и опредѣленными факторами, съ которыми обыкновенно ставятъ въ связь поглотительную способность. Особенно убѣдителенъ въ этомъ отношеніи структурный солонецъ № 534, въ которомъ содержится гораздо меньше, чмъ въ черноземахъ, и гумуса, и цеолитовъ, и глинозема, извлекаемаго сѣрной кислотой, и, наконецъ, цеолитной извести, и который несмотря на это обладаетъ поглотительной способностью не меньшей, чмъ у четырехъ изъ изслѣдованныхъ черноземовъ.

Гигроскопичность тобольскихъ почвъ, вообще значительная, также не обнаруживается вполнѣ опредѣленной зависимости отъ тѣхъ или иныхъ факторовъ. Такъ, напр., максимальная гигроскопичность присуща злому солонцу № 571 и, можетъ быть, обусловливается здѣсь высокимъ содержаниемъ растворимыхъ въ водѣ солей. Два другие солонца, несмотря на повышенное количество этихъ солей по сравненію съ черноземами, оказываются гигроскопичными менѣе, чмъ эти послѣдніе. Изъ черноземовъ наибольшую гигроскопичность проявляетъ глинистый черноземъ, выдающійся изъ всѣхъ прочихъ лишь высокимъ содержаніемъ глины. Подзолъ оказывается менѣе всѣхъ прочихъ почвъ способнымъ поглощать водяной паръ.

Въ заключеніе, нужно будетъ остановиться на анализахъ механическихъ, каковые были сдѣланы въ Лабор. М. З. для тѣхъ же 10 почвъ, которыхъ были подвергнуты и полнымъ химическимъ анализамъ. При этомъ 5 изъ нихъ (глинистый и три лессовыхъ чернозема и структурный солонецъ) анализированы по способу Шёне, а остальные пять—по способу Фадѣева-Вильямса. Числа, полученные въ обоихъ рядахъ анализовъ, разумѣется, весьма несходны: количество частицъ менѣе 0,01 по способу Фадѣева-Вильямса даже въ подзолѣ весьма значительно (57,11%). Если ограничиться только анализами по способу Шёне, то окажется, что крупныхъ частицъ (больше $1/4$ мм. въ диаметрѣ) въ тобольскихъ почвахъ содержится весьма мало—0,6—2,5%; частицъ отъ 0,25—0,05 мм. въ 4 черноземахъ содержится 29—43%, а въ струк-

турномъ солонцѣ—52%; частицъ съ діаметромъ 0,05—0,01 въ черноземахъ—22—34%, въ солонцѣ—11%; всей же крупной пыли (0,25—0,01 мм.) въ этихъ почвахъ 58—65%; частицъ меньше 0,01 въ глинистомъ черноземѣ содержится 40, а въ остальныхъ четырехъ почвахъ 32—36%; въ среднемъ же изъ четырехъ черноземовъ элементовъ чисто механическихъ имѣется въ нихъ 64,3, а элементовъ меньше 0,01—35,7; отношение между первыми и вторыми=1,8:1, т.-е. таково же, какъ въ долинныхъ черноземахъ Нижегородской губ.¹⁾; въ черноземахъ Старосидоровой, анализированныхъ г. Агаѳоновымъ, это отношение въ 6 образцахъ равно 16—22:1 и лишь въ одномъ—3,8:1. Чѣмъ можетъ обусловливаться столь крайнее несходство въ этихъ данныхъ, я не знаю. Къ сожалѣнію, г. Агаѳоновъ не сообщаетъ, какимъ методомъ онъ пользовался при опредѣлѣніи механическаго состава; но изъ сопоставленій, имъ дѣлаемыхъ, можно заключить, что и онъ работалъ съ приборомъ Шёне.

Среди полтавскихъ черноземовъ по химическому составу подходитъ къ вышеупомянутымъ тобольскимъ лишь первая подгруппа черноземовъ плато (глинистые черноземы)²⁾ съ 29—42% частицъ меньше 0,01 мм.; въ остальныхъ группахъ и содержаніе илистыхъ частицъ и отношеніе ихъ къ чистомеханическимъ элементамъ ниже, чѣмъ въ тобольскихъ черноземахъ.

Просматривая аналитическія данныя, нельзя не замѣтить, что шесть анализированныхъ черноземовъ изъ различныхъ мѣстностей, отстоящихъ другъ отъ друга на значительныя разстоянія, тѣмъ не менѣе весьма близки другъ къ другу по химическому составу: варіаціи въ содержаніи отдельныхъ составныхъ частей совершаются въ довольно тѣсныхъ предѣлахъ. Глинистый черноземъ Сорочьей степи (п^o 485) отличается отъ прочихъ черноземовъ, образовавшихся на лессовидной подпочвѣ, максимальнымъ содержаніемъ глины и цеолитовъ; онъ же превосходить ихъ по размѣрамъ вытяжки однопроцентной соляной кислотой, поглотительной способностью и количествомъ илистыхъ частицъ, зато по содержанію гумуса, азота и Р₂О₅ опъ уступаетъ большинству черноземовъ на лессовидной подпочвѣ. Можно прибавить къ этому, что и глинистый черноземъ Привольной превосходитъ лесковые черноземы, анализированные г. Шешуковымъ, по общему содержанію глины (Al₂O₃, извлекаемый съроною кислотою), а по размѣрамъ вытяжки десятипроцентной соляной кис-

¹⁾ См. работу Яковлева въ XIV вып. «Мат. къ оцѣнкѣ зем. Нижег. губ.», стр. 4.

²⁾ «Мат. къ оцѣнкѣ зем. Полт. губ.», вып. XVI, стр. 308—309.

лотой уступаетъ лишь одному изъ нихъ. Насколько постоянны отличія глинистыхъ черноземовъ отъ лесовыхъ, предстоитъ окончательно рѣшить будущимъ изслѣдованіямъ, теперь же довольно вѣроятно лишь то, что отличія эти не будутъ особенно глубоки, ибо и между анализированными лесовыми черноземами обнаружены такие, которые по содержанію глины близки къ № 485. Этимъ свойствомъ обусловливается и образованіе трещинъ на лесовыхъ черноземахъ нѣкоторыхъ степныхъ участковъ, хотя всегда менѣе обильное, чѣмъ на рядомъ лежащихъ участкахъ глинистаго чернозема.

Въ виду существованія такихъ представителей лесовыхъ черноземовъ, какъ № 562 или 523, нельзя выдѣлить глинистые черноземы въ самостоятельную группу; правильнѣе считать ихъ лишь за подгруппу, отличающуюся отъ лесовыхъ черноземовъ по характеру подпочвы и по наружнымъ признакамъ; оставить за ними преимущественно эпитетъ «глинистыхъ» слѣдуетъ еще и потому, что даже наиболѣе богатые содержаніемъ глины лесовые черноземы по консистенціи и наружному виду представляются всегда болѣе или менѣе супесчаными.

Итакъ, черноземы южной части Тобольской губ. съ точки зреіня химического состава довольно однородны. Эта однородность обнаруживается и въ составѣ черноземовъ изъ одной и той же мѣстности, различающихся другъ отъ друга по морфологическимъ свойствамъ. Такъ, напримѣръ, образцы 568 и 569 взяты другъ отъ друга всего въ 30 саженяхъ, но первый залегалъ въ едва замѣтномъ понижениіи съ Calamagrostis Eri-gejos и мелкой березой, а второй собранъ посреди ковыльной степи; при этомъ второй имѣлъ меньшую мощность и былъ окрашенъ слабѣе, чѣмъ первый, подъ которымъ вскипающій съ кислотами горизонтъ оказался значительно пониженнымъ. Аналитическій матеріалъ обнаруживаетъ почти полное тождество химического состава этихъ двухъ черноземовъ; «лѣсной» (№ 568) черноземъ превосходитъ «степной» только по содержанію гумуса (на 2%), но уступаетъ ему, хотя весьма немного, по растворимости полуторныхъ окисловъ въ 10% HCl. Любопытно, что и второй изъ изслѣдованныхъ «лѣсныхъ» черноземовъ (№ 552, Большепесчанское) отличается тоже меньшею противъ степныхъ образцовъ растворимостью Al_2O_3 въ крѣпкой соляной кислотѣ. Можетъ быть, это совпаденіе — не случайность, ибо мыслимо, что цеолиты и въ черноземахъ будутъ разрушаться и вымываться въ болѣе глубокіе слои, разъ на черноземѣ поселяется лѣсъ. Анализъ вытяжки 10% HCl изъ почвы и подпочвы лѣсного чернозема № 595, сдѣланный г. Шешуковымъ, обнаруживаетъ содержаніе полуторныхъ окисловъ и цеолитной кремнекислоты болѣе богатое въ подпочвѣ, чѣмъ въ почвѣ, какъ будто и въ лѣсномъ черноземѣ имѣть мѣсто тотъ же процессъ, что въ подзолѣ; на противъ, анализъ почвы и подпочвы степного чернозема № 577 не об-

наруживаетъ такихъ соотношений: почва степного чернозема, какъ мы это видѣли раньше, можетъ быть даже богаче цеолитами, чѣмъ подпочва. Для иллюстраціи къ сказанному можно сопоставить данные анализа относительно вытяжки 10% HCl въ слѣдующей таблицѣ.

Таблица 28.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОЧВЫ.	Al ₂ O ₃ +Fe ₂ O ₃	SiO ₂	Всѣхъ цеолитовъ.
п° 554, подзолъ, горизонтъ А . . .	3,90	4,84	10,23
— горизонтъ С . . .	6,97	8,90	17,37
п° 595, лѣсной черноз., гориз. А	8,08	9,66	20,50
— горизонтъ С . . .	12,86	11,42	27,07
п° 577, степной черноз., гориз. А	8,29	10,56	21,21
— горизонтъ С . . .	10,40	8,07	22,05

Какъ и въ анализахъ Лабораторіи М. З., степной черноземъ п° 577 бѣднѣе гумусомъ, чѣмъ лѣсной. Это отношеніе обусловливается однако лишь тѣмъ, что и данная пара черноземовъ происходитъ изъ Покровской волости, въ южной части которой степные черноземы постоянно имѣютъ ослабленную окраску. Въ другихъ мѣстностяхъ содержаніе гумуса въ степныхъ черноземахъ могло бы оказаться болѣе значительнымъ. Какъ бы то ни было, въ анализированныхъ лѣсныхъ черноземахъ не замѣтно уменьшенія пергноя и интенсивности окраски; въ нѣкоторыхъ другихъ случаяхъ я замѣчалъ и въ Тобольской губ. ослабленіе тона окраски чернозема подъ лѣсомъ по сравненію съ рядомъ лежащимъ степнымъ черноземомъ, иногда же лѣсной черноземъ кажется еще болѣе темнымъ, чѣмъ степной.

Выше, при описаніи черноземныхъ почвъ, вытяжки сѣрной и соляной кислотами изъ черноземовъ лѣсного и степного были вычислены въ процентахъ къ общему количеству минеральныхъ веществъ, при чемъ было видно, что именно въ лѣсномъ черноземѣ п° 595 почва содержитъ цеолитовъ меньше, чѣмъ подпочва. Любопытны также отношенія цеолитной кремнекислоты ко всему ея количеству въ трехъ данныхъ почвахъ: въ подзолѣ цеолитная кремнекислота образуетъ всего 6%, а въ его подпочвѣ—13%, въ лѣсномъ черноземѣ—17, въ его подпочвѣ 18,4%, въ степномъ черноземѣ—17, въ его подпочвѣ 13,4%.

Въ виду вышеизложенныхъ фактовъ представляется вѣроятнымъ, что поселеніе на черноземѣ лѣса сказывается прежде всего на цеолитовыхъ соединеніяхъ, количество коихъ въ почвѣ уменьшается; и лишь, можетъ быть, позднѣе уменьшается въ ней содержаніе перегноя и фосфорной кислоты; любопытно было бы провѣрить эти заключенія на болѣе обширномъ аналитическомъ материалѣ.

Несмотря на это, я не рѣшаюсь присоединиться къ высказанному г. Краснопольскимъ предположенію, что сибирскіе подзолы «произошли изъ чернозема подъ вліяніемъ поросшаго на немъ лѣса»¹⁾). Противъ такого предположенія можно возразить, что часто встрѣчаются на одной и той же лессовидной подпочвѣ почти рядомъ черноземы въ 20 слишкомъ дюймовъ мощностью и подзолы всего въ 6—7" (нар. въ окрестностяхъ Ишима); столь тонкіе подзолы едва ли могли образоваться на счетъ бывшихъ на ихъ мѣстѣ черноземовъ. Болѣе же мощные подзолы юга Тобольской губ., притомъ съ темноокрашеннымъ переходнымъ горизонтомъ, залегаютъ на своеобразныхъ суглинкахъ, въ которыхъ застаивается вода; всколько они могутъ считаться оподзоленными черноземами, я теперь, еопреки мѣсму мнѣнію, выраженному въ отчетѣ 1897 г., сказать не могу. Кроме того, процессъ подзолообразованія весьма распространенъ въ природѣ, такъ что почти все неболотныя почвы къ себѣ веру отъ области чернозема являются въ большей или меньшей степени подзолистыми; невозможно допустить, чтобы все такія почвы возникли вторично—изъ черноземовъ или какихъ либо другихъ почвъ. Поэтому мнѣ представляется болѣе вѣроятнымъ, что по крайней мѣрѣ типичные подзолы южной части Тобольской губ. суть почвы первичные, образовавшіяся на тѣхъ же лессовидныхъ породахъ, что и рядомъ лежащіе черноземы. Какія причины обусловили въ конечномъ итогѣ своего воздействиа на одну и ту же породу столь различный эффектъ, неизвѣстно, очевидно лишь, что при созданіи подзоловъ не остались безъ вліянія условія влажности, отличная отъ господствующихъ на черноземахъ. Извѣстно, между прочимъ, что въ подзолистыхъ котловинкахъ съ весны застаивается вода, которая въ такъ называемые «смочные» годы не уходитъ все лѣто, такъ что погибаютъ березовые лѣса, росшіе въ такихъ котловинкахъ. Мало вѣроятія, чтобы такой временный застой воды самъ по себѣ могъ обусловить то направленіе химическихъ процессовъ, которое приводить къ образованію подзола; вліяніе его скорѣе заключается лишь въ томъ, что при условіяхъ затрудненной вентиляціи въ почвѣ начинаютъ размножаться по преимуществу лишь извѣстные микроорганизмы, отъ которыхъ уже зависитъ то или иное направленіе процесса

¹⁾ 1. с., 71.

разложењія органическихъ остатковъ и связанное съ нимъ воздействіе на минеральную основу почвы.

Существование особаго и своеобразнаго населенія микроорганизмовъ въ подзолахъ доказывается чрезвычайно распространенными въ нихъ очень мелкими желѣзистыми конкреціями, относительно которыхъ едва ли можно сомнѣваться, что онъ произошли путемъ дѣятельности специальныхъ микроорганизмовъ. Перифразируя извѣстное выраженіе академика Рупрехта, слѣдовало бы сказать, что и черноземъ и подзолъ суть вопросы по преимуществу микро-ботаническіе.

Нельзя не остановиться на вопросѣ о томъ, въ какихъ отношеніяхъ отличаются черноземы юга Тобольской губ. отъ наилучше изученныхъ черноземовъ Европейской Россіи, т.-е. нижегородскихъ и полтавскихъ. Изъ полныхъ анализовъ слѣдуетъ прежде всего, что тобольские черноземы могутъ быть сопоставляемы лишь съ такъ наз. «черноземами плато» этихъ губерній. Даље, благодаря неполнотѣ аналитического матеріала по губерніи Полтавской, изъ соотвѣтственныхъ черноземовъгодны для сравненія лишь два образца (Карловка и Филоновщина); два же образца имѣются и для губ. Нижегородской; но благодаря значительной близости ихъ химического состава, для сравненія можно взять лишь одинъ, наиболѣе глинистый (Ключищи). Если изъ тобольскихъ образцовъ взять тоже лишь наиболѣе глинистый (Сорочья степь, № 485), то можно сравнить вѣс эти образцы по отношеніямъ трехъ главнѣйшихъ вытяжекъ ко всей минеральной части, принявъ эту послѣднюю въ каждомъ данномъ случаѣ за 100. Такъ какъ, однако, абсолютныя величины минеральной части въ сравниваемыхъ черноземахъ не равны, то намъ придется дать, кроме относительныхъ, и абсолютныя числа. Прибавивъ сюда еще содержаніе гумуса и Р₂О₅, мы выяснимъ вопросъ о сравнительномъ богатствѣ данныхъ почвъ глиной, цеолитами, наилегче доступными для растеній соединеніями и наконецъ органическими веществами и фосфорной кислотой.

Таблица 29.

Черноземы.	Минеральн. веществъ.	Въ Н ₂ SO ₄ растворимо.	Въ HCl 10% растворимо.	Въ HCl 1% растворимо.	Гумусъ.	P ₂ O ₅
№ 485, Тобольской губ.	87,41=100	44,39=51	38,15=44	4,37=5	8,27	0,114
Ключищи, Нижег. губ.	83,22=100	43,36=52	31,99=38	5,87=7	10,30	0,257
Карловка и Филоновщина, Полт. губ.	83,87=100	30,11=36	16,94=20	4,86=6	8,30	0,251
Среднее изъ 6 тобол. черн.	87,72=100	41,76=48	32,90=37	3,77=4	9,05	0,154

Такимъ образомъ, по содержанію всей глины черноземъ Сорочьей степи не уступаетъ чернозему Ключищъ, значительно превосходя полтавскіе черноземы. По размѣрамъ вытяжки десятипроцентной соляной кислотой онъ далеко оставляетъ за собою не только полтавскіе образцы, но и ключищенскій, и лишь легко растворимыми соединеніями онъ бѣднѣе нижегородскаго глинистаго чернозема. Содержаніе перегноя во всѣхъ сравниваемыхъ образцахъ не представляетъ особенно большихъ различій, но по общему количеству фосфорной кислоты сибирскій черноземъ значительно отстаетъ отъ европейскихъ. Если бы для сравненія былъ взятъ не глинистый черноземъ Сорочьей степи, а нѣкоторые изъ черноземовъ лесовыхъ, то разница въ содержаніи P_2O_5 была бы не столь значительна. Этому отличію нельзя придавать большого значенія, ибо, напр., по анализамъ г. Шешукова сибирскіе черноземы оказываются уже не бѣднѣе, а значительно богаче фосфорной кислотой, чѣмъ европейскіе.

Въ послѣдней графѣ вышеприведенной таблицы даны среднія изъ всѣхъ 6 тобольскихъ черноземовъ; оказывается, что и эти среднія по размѣрамъ вытяжекъ сѣрной и крѣпкой соляной кислотами далеко превосходятъ полтавскіе черноземы плато 1-й группы, которымъ г. Глинка даетъ название «глинистыхъ»¹⁾; напротивъ, въ этихъ отношеніяхъ они очень близки къ лучшему изъ нижегородскихъ черноземовъ, а также къ наиболѣе богатымъ глинистымъ черноземамъ имѣнія Пады въ Балашовскомъ у., Сарат. губ., съ содержаніемъ цеолитовъ отъ 29 до 35% и глины до 40%, и къ черноземамъ Мензелинского, Бугульминского и Бугурусланскаго уу., анализированнымъ проф. Шмидтомъ²⁾. Этотъ выводъ заслуживаетъ вниманія особенно въ виду тѣхъ заключеній, которыхъ были сдѣланы по тому же предмету г. Высоцкимъ. Тотъ фактъ, что сибирскіе черноземы уступаютъ нижегородскимъ и полтавскимъ по содержанію веществъ, извлекаемыхъ слабой соляной кислотой, едва ли можетъ имѣть большое значеніе.

Разумѣется, было бы заманчиво объяснять этой особенностью тобольскихъ черноземовъ ихъ легкую истощаемость, но при теперешнемъ состояніи нашихъ знаній такое объясненіе слѣдуетъ признать весьма гадательнымъ. Самое мнѣніе о томъ, что россійскіе черноземы—вѣковѣчные, а сибирскіе—легко выщахиваются, не должно быть принимаемо безъ провѣрки. Я лично знаю на сѣверѣ Ишимскаго у. такие лесовые черноземы, которые пашутся уже много лѣтъ подрядъ, при чемъ крестьяне не замѣчаютъ уменьшения производительной ихъ способности. Гг. Ба-

¹⁾ И по анализамъ г. Шешукова въ четырехъ не солонцеватыхъ тобольскихъ черноземахъ содержится цеолитовъ значительно больше, чѣмъ въ имъ же анализированныхъ черноземахъ полтавскихъ, гдѣ содержаніе цеолитовъ иногда (7,4%) меньше, чѣмъ даже въ сибирскихъ подзолахъ.

²⁾ См. «Пады» Спб. 1894, стр. 145; Физико-химич. изсл. почвы и подпочвы черноз. полосы Евр. Россіи, вып. 2.

лакшины, ведущие въ Старосидоровой хозяйство уже издавна и при томъ въ такомъ районѣ, гдѣ уже давно брошена залежная система, сообщили мнѣ нѣсколько цѣнныхъ фактовъ по вопросу объ истощаемости мѣстныхъ почвъ. Такъ напр., А. А. Балакшинъ пишетъ мнѣ: «Здѣшние увалы распахиваются уже много лѣтъ (100—150 л.—достовѣрная давность), до сихъ поръ почти никто не употребляетъ удобрений, и однако, при извѣстномъ количествѣ осадковъ, урожай хлѣбовъ и картофеля хороши; такъ у насъ картофель на неудобренныхъ поляхъ родился до 950 четвериковъ съ десятины, урожай пшеницы доходилъ до 150 пудовъ... Въ планахъ 1847 г. значатся распаханными тѣ мѣста, гдѣ и теперь мы садимъ картофель и сбѣмъ хлѣбъ безъ удобрений». Приведенные факты во всякомъ случаѣ свидѣтельствуютъ, что нѣкоторые изъ лесовыхъ черноземовъ Тобольской губ. едва ли менѣе прочны, чѣмъ лучшіе изъ черноземовъ Европейской Россіи, какъ впрочемъ и слѣдуетъ ожидать по ихъ химическому составу. Несомнѣнно однако, что есть въ Тобольской губ. и такие черноземы, которые истощаются сравнительно легко. Между прочимъ, у крестьянъ около Старосидоровой сложилось убѣжденіе въ легкой истощаемости щельниковъ, т. е. глинистыхъ черноземовъ; мѣстами (Моршиха) эти почвы приравниваются даже къ солонцовымъ, съ которыми ониъ однако не имѣютъ ничего общаго. Насколько вѣрно мнѣніе о легкой истощаемости глинистыхъ черноземовъ, и какіе факты лежать въ его основѣ, я не знаю. Такое мнѣніе не является, однако, общеизвестнымъ; лѣтомъ 1900 года я встрѣтилъ небольшой островокъ глинистаго чернозема около Песчанаго Таволжана, на югѣ Шадринскаго у.; по отзывамъ мѣстныхъ крестьянъ, этотъ участокъ отличается постоянной высокой урожайностью: «даже въ худыѣ годы (т.-е. въ началѣ 90-хъ годовъ) здѣсь хлѣбъ родился». Между тѣмъ, ни по наружнымъ признакамъ ни по уцѣльвшемъ еще степной растительности этотъ глинистый черноземъ не отличается отъ одноплеменныхъ почвъ около Старосидоровой. Мне кажется довольно вѣроятнымъ, что такое различіе въ мнѣніяхъ относительно глинистаго чернозема разныхъ мѣстъ обусловлено причинами случайными. Рѣзкій неурожай въ теченіе ряда засушливыхъ лѣтъ можетъ создать убѣжденіе въ малой надежности любыхъ земель; и надо принять въ расчетъ, что засухи особенно страшны для растеній на такихъ глинистыхъ почвахъ, какъ глинистые черноземы, гдѣ почвенные растворы должны быть мало подвижны. Кроме того, вѣроятно, что черноземы, въ томъ числѣ глинистые, будутъ при неперемѣжующихся поставахъ, отчасти и теперь практикующихся въ Сибири, истощаться стночательно азотомъ усвоемой формѣ, но весьма трудно допустить, чтобы культивируя растенія на почвахъ со столь большимъ запаснымъ капиталомъ могли ощущать недостатокъ въ другихъ питательныхъ веществахъ.

Если върно, что тобольские черноземы вообще могутъ легко истощаться лишь относительно азота въ усвоеной формѣ, то дѣйствіе азотистыхъ удобрений на нихъ должно бы оказываться весьма сильно. Къ сожалѣнію, надлежаще поставленныхъ опытовъ въ этомъ направлениі мнѣ неизвѣстно: производство таковыхъ могло бы быть исполнено настоящимъ образомъ лишь на соотвѣтственно организованныхъ станціяхъ, въ которыхъ Западная Сибирь нуждается, можетъ быть больше, чѣмъ Европейская Россія. На необходимость ихъ здѣсь неоднократно уже указывалось въ литературѣ, и нельзѧ не пожелать, чтобы станціи эти были наконецъ организованы.

Мнѣ извѣстны лишь опыты, произведеные А. А. Балакшинымъ въ 1892 году около Старосидоровой, съ цѣлью выяснить вліяніе различныхъ удобрений на урожайность пшеницы и картофеля на лессовомъ черноземѣ. Постановка ихъ въ некоторыхъ отношеніяхъ была неудовлетворительна, и кромѣ того разныя условия (засушливое лѣто, отчасти размноженіе кобылки) были неблагопріятны, а потому и выводовъ сдѣлать изъ нихъ нельзѧ; любопытно однако, что для обоихъ растеній, по мнѣнію А. А. Балакшина, обнаружилась бѣдность почвы относительно перегноя и азота. Бѣдность относительно перегния выведется изъ значительного повышенія урожайности при сильномъ унаваживаніи, т.-е. опять-таки при введеніи въ почву значительнаго количества азота; малый качественный эффектъ при удобреніи одной сѣрвоамміачной солью, можетъ быть, объясняется недостаточной нитрификаціей. Удобрение навозомъ черноземныхъ почвъ Старосидоровой, по отзыву А. А. Балакшина, не только въ этихъ опытахъ, а и въ постоянной практикѣ, «дѣйствуетъ крайне благотворно... Такъ на земляхъ, удобренныхъ навозомъ года 2—3 назадъ, урожай картофеля нынѣ (1899 г.) былъ до 1000 и выше четвериковъ (съ десятинами), тогда какъ на неудобренныхъ поляхъ — 500 четв.».

Несомнѣнно однако, что сибирскіе черноземы въ среднемъ представляютъ почвы менѣе надежныя, чѣмъ черноземы Европейской Россіи. Но нельзѧ не ставить этого обстоятельства въ связь съ тѣми метеорологическими условіями, погрѣди которыхъ находятся тѣ и другіе. Такъ напр., тобольские черноземы лежать къ полосѣ, где годовое количество осадковъ всего 300—400 мм., при чёмъ въ некоторые годы эта величина опускается ниже 200 мм.; между тѣмъ, европейскіе черноземы, даже изъ болѣе южныхъ мѣстностей (напр. Воронежъ— $51^{\circ}40'$ и Лугань— $48^{\circ}35'$ с. ш.), находятся въ болѣе благопріятныхъ условіяхъ, чѣмъ черноземъ Барнаула ($53^{\circ}20'$): изъ данныхъ работы Вильда¹⁾ можно вывести, что многолѣтнія среднія осадковъ для этихъ трехъ пунктовъ относятся, какъ

¹⁾ Зап. Акад. Наукъ, VIII сер., т. III, № 1.

100 (Барнаулъ) къ 130 (Лугань) и 190 (Воронежъ), а амплитуды пятилетнихъ среднихъ достигаютъ: для Барнаула 34, а для Лугани и Воронежа—только 19 см. Ясно, что даже и при тождественномъ химическомъ составѣ черноземовъ, рискъ земледѣльца будетъ больше въ Западной Сибири, чѣмъ въ Европейской Россіи; ясно также, что въ Тобольской губ. наименьшимъ постоянствомъ должны отличаться урожаи на черноземѣ безлѣсныхъ степей, гдѣ и *à priori* нельзя ожидать обильныхъ и равномерныхъ изъ года въ годъ осадковъ.

При засушливомъ лѣтѣ, въ тобольскихъ черноземахъ содержаніе воды падаетъ, вѣроятно, очень визко и почвенный растворъ дѣлается весьма мало доступнымъ для растеній; при этомъ, концентрація его близъ поверхности можетъ возрасти значительно между прочимъ и вслѣдствіе капиллярного поднятія тѣхъ растворенныхъ веществъ, которыя въ нормальные годы остаются въ болѣе глубокихъ слояхъ; и дѣйствительно, въ Покровской волости мнѣ пришлось слышать, что въ періоды засухъ «солонецъ» образовывался въ такихъ пунктахъ, которые издавна распахивались; въ «смочныхъ» годы такие солонцы вновь исчезаютъ, и земля становится удобна для обработки.

Думаю, что именно условія вообще небогатаго и при томъ капризно-непостоянаго водоснабженія дѣлаютъ изъ культуры на тобольскихъ черноземахъ нечто вродѣ азартной игры; по химическому же составу почвы эти должны быть признаны дѣйствительно богатыми.

Такъ какъ въ настоящее время на югѣ Тобольской губ. лишь два типа почвъ—черноземы и подзолы—имѣютъ значеніе въ земледѣліи, то было бы любопытно для сравненія ихъ попытаться вывести среднія изъ имѣющагося аналитического материала. Къ счастью, показанія различныхъ аналитиковъ относительно химического состава подзоловъ зауральской равнины сходны другъ съ другомъ и потому сравнимы. Для вывода среднихъ можно употребить полный анализъ подзола Осиновой и неполный—Большепесчанскаго, а также два неполныхъ анализа, приведенныхъ г. Краснопольскимъ въ его отчетѣ, а для черноземовъ можно взять анализы 5 образцовъ на лессовидной подпочвѣ (н^о 523—569), ибо и подзолы образовались на той же подпочвѣ¹). Благодаря неполнотѣ анализовъ, сравненіе можетъ коснуться лишь слѣдующихъ пунктовъ: гумуса, общаго количества основаній въ вытяжкѣ 10% HCl, глины, вычисленной по содержанию Al₂O₃ въ сѣрнокислой вытяжкѣ, фосфорной кис-

¹⁾ Анализомъ «бѣлака», произведеннымъ г. Высоцкимъ (I. c., 89), я не счелъ возможнымъ воспользоваться изъ-за весьма значительныхъ отличий его отъ другихъ подзоловъ (содержаніе глины, P₂O₅ и Na₂O въ цеолитной части).

лоты и общаго количества кремнекислоты. Всъ эти данные сопоставлены въ слѣдующей таблицѣ, въ которой, кромѣ того, приведено выраженіе каждого изъ указанныхъ выше «моментовъ» въ цѣлыхъ числахъ, принявъ соотвѣтственныя данныя для лессовыхъ черноземовъ за 100.

Таблица 30.

Характеръ почвъ.	Гумусъ.	P ₂ O ₅	Цеолитная основанія.	Глина.	Весь кремнеземъ.
<i>Черноземы</i> (сред. изъ 5)	9,2—100	0,163—100	14,18—100	40,6—100	63,09—100
<i>Подзолы</i> (сред. изъ 4)	1,0—11	0,051—31	4,32—30	13,8—34	81,6—129

Числа, приведенные въ этой таблицѣ, интересны еще и потому, что они выражаютъ собою два крайнихъ направлениія въ измѣненіи наиболѣе распространенныхъ материнскихъ породъ при образованіи на нихъ почвы. Черноземы, какъ мы видѣли выше, по минеральному составу очень близки или тождественны со своей подпочвой; при образованіи чернозема минеральная основа лессовидныхъ суглинковъ не претерпѣваетъ существенныхъ измѣненій. Измѣненія эти начинаются, можетъ быть, и въ черноземахъ, когда на нихъ поселяется лѣсъ, и состоятъ въ обѣденіи почвенного горизонта цеолитами. Крайнюю стадію этого процесса мы имѣемъ въ подзалахъ, гдѣ количество цеолитовъ въ почвѣ—наименьшее. Несомнѣнно, что для суглинистыхъ почвъ не очень рѣзкаго подзолистаго характера при анализахъ должны быть получены для тѣхъ же почвенныхъ моментовъ величины среднія, приближающіяся къ той или другой изъ пограничныхъ величинъ, данныхъ въ таблицѣ, въ зависимости отъ большей или меньшей подзолистости почвы.



НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ.

Первый опыт собирания народныхъ примѣтъ по числамъ мѣсяцъ сдѣланъ былъ нами въ 1896 году, когда вопросъ о примѣтахъ введенъ былъ въ программу по текущей сельскохозяйственной статистикѣ для добровольныхъ корреспондентовъ Тобольского губернского статистического комитета. Полученные свѣдѣнія были обработаны и напечатаны въ IX выпускѣ «Ежегодника Тобольского Губернского Музея».

Въ 1900 году собирание этихъ же матеріаловъ и тѣмъ же путемъ было повторено. Сводка этихъ свѣдѣній ниже и помѣщается. При этой сводкѣ, чтобы не повторяться, были пропущены все примѣты, уже вошедшия въ предыдущую публикацію, такъ что прилагаемая статья содержитъ дополнительный матеріалъ.

Продолжая разсыпку программъ, мы надѣемся въ будущемъ еще дополнить тобольский народный календарь. Къ сожалѣнію, до сего времени у насъ совершенно не затронуты примѣты инородцевъ—остяковъ, vogуль, татаръ, между тѣмъ несомнѣнно отъ нихъ можно было бы получить интереснѣйшія указанія, такъ какъ они еще ближе, чѣмъ русскіе крестьяне, стоятъ къ природѣ. Было бы очень желательно, чтобы на тобольскомъ сѣверѣ нашлись лица, которые обратили бы на это вниманіе.

Разработанный здѣсь матеріалъ доставленъ 28-ю лицами, списокъ которыхъ приводится. Цифры въ скобкахъ, стоящія въ календарѣ, указываютъ номера, подъ которыми въ этомъ спискѣ можно отыскать, кто давшую примѣту сообщилъ.

1. Имдаровъ Ив. (с. Демьянское, Тобольского уѣзда).
2. Камышевъ З. М. (с. Яровское, Тюменского уѣзда).
3. Гордѣевъ Н. В. (с. Успенское, Тюменского уѣзда).
4. Ирорвишъ Б. А. (с. Велижанское, Тюменского уѣзда).
5. Катаевъ Ѳ. В. (с. Усть-Ницинское, Тюменского уѣзда).
6. Шавринъ М. Г. (д. Каргинская, Туринского уѣзда).
7. Путиловъ А. А. (д. Путилова, Табаринской в., Туринского у.).

8. Вишневский П. Е. (с. Коркинское, Туринского уезда).
9. Коротковъ (с. Жуковское, Туринского уезда).
10. Гусельниковъ А. И. (с. Гаринское, Туринского уезда).
11. Зоновъ В. В. (д. Зонова, Юргинской вол., Ялуторовского у.).
12. Мяспиковъ И. В. (д. Карагужева, Суерской в., Ялутор. у.).
13. Мазуний П. В (д. Могильный Яръ, Верхне-Бешкильской вол., Ялуторовского уезда).
14. Ноповъ В. М. (с. Томиловское, Ялуторовского уезда).
15. Муллашевъ И. М. (юрты Сингульская, Ялуторовского уезда).
16. Первухинъ И. В. (с. Заводоуковское, Ялуторовского уезда).
17. Макаровъ А. И. (с. Сычевское, Курганского уезда).
18. Сарашкихъ И. Ф. (д. Нокровка, Курипинской в., Курган. уезда).
19. Садовникъ М. М. (Большая Тава, Слободчиковской вол., Тарского уезда).
20. Никулинъ (выс. Босмаковский, Слободчиковской в., Тарского у.).
21. Усовъ С. С. (д. Серебрянка, Каргалинской вол., Тарского у.).
22. Торговкинъ (юрты Цигалинская, Надцинской в., Тобольск. у.).
23. Тимофеевъ Г. Я. (д. Кондрахина, Благовещенской вол., Туринского уезда).
24. Шумиловъ И. Л (с. Нахачевское, Тобольского уезда).
25. Малышевский И. К. (с. Соколовское, Ишимского уезда).
26. Воробьевъ В. И. (д. Баирова, Кобырдакской вол., Тюкалинского уезда).
27. Шимовъ В. А. (д. Петрова, Гаринской вол., Туринского у.).
28. Ужепцевъ И. А. (д. Блиникова, Каракинской вол., Тобольского уезда).

Всемъ названнымъ лицамъ приносимъ глубокую благодарность за ихъ трудъ по сообщению свѣдѣй.

Тобольскъ.
30 января 1901 года.

П. Скализубовъ.

* * *

ЯНВАРЬ. 1. Если на Новый Годъ тихая и ясная ночь, то, говорить, будетъ маловодье, а—насмурная, то — большая вода. (10). Если день былъ насмурный и на лѣсу иной,— хороший будетъ урожай хлѣбовъ; если день со снѣгомъ, то большая вода будетъ лѣтомъ. Ясная, звѣздная ночь—къ урожаю скота и зѣрей, а если сильная буря, то будутъ болѣзни на людяхъ и скотѣ. (7). Если на Новый Годъ мѣсяцъ молодой, то ленъ нужно сѣять на новые мѣста (залоги), а если мѣсяцъ былъ старый, т.-е. на исходѣ, то и ленъ надо сѣять на старую землю. (6). Васильева ночь звѣздиста—ягодъ будетъ шудовъ триста (8).

6. Снѣгъ на воду пошелъ—къ урожаю рыбы; холодный день—жаркое будетъ лѣто. Сильные крещенскіе морозы—у мужика мерзнетъ рука и нога, а сохатый, бѣгая, потерялъ рога (съ крещенья у лосей отпадаютъ рога) (7). Если на Крещене мѣсяцъ старый, то ловъ рыбы бываетъ на истекѣ луны, а если молодой, то ловъ рыбы бываетъ на молодую луну (23). Вьюга въ Крещене—къ большой водѣ (къ разливу) (1). Въ Крещене метель—и на Святой метель; въ Крещене на полдень синее облако—къ урожаю; когда на водѣ стоять, юрданъ полна воды—къ большому разливу воды (6). На Крещене синяя облака на западѣ—къ урожаю; въ Крещенское водосвятіе пороша—рожь и пшеница будетъ хороша; въ юрдани воды полно—быть хорошему урожаю; на Крещене звѣздная ночь—урожай на ягоды и горохъ (8). Если въ Крещене, во время крестнаго хода на воду, бываетъ пасмурно и морокъ—этотъ годъ урожайный,—и въ которой сторонѣ морокъ или темное облако, въ той сторонѣ и хлѣбъ будетъ, а гдѣ ясно, тамъ хлѣбъ будетъ хуже или совсѣмъ его не будетъ (12). Если въ Крещене день теплый и мрачный, то и хлѣбъ будетъ темный (18). На Крещене во время обѣди снѣгъ—на полѣ хлѣбъ; на Крещене тепло—на полѣ темно (19). Богоявленье подъ полный мѣсяцъ—къ большому урожаю (5).

Всѣ святые вечера въ Слободчиковской волости, Тарского уѣзда, до самаго Крещеня проводятся весело; но вмѣсто того, чтобы быть христіанами и почитать св. вечера по-христіански, изображаютъ изъ себя демоновъ и маскируются во всякихъ звѣрей, отъ 7-тилѣтняго возраста до 60-тилѣтняго, дѣлая такъ, какъ, говорятъ, и прежде дѣлали. Дѣлаютъ это потому, что, какъ говорить преданіе, въ это время, т.-е. въ святые вечера, черти, боясь водосвятія, переходятъ изъ тѣхъ озеръ и рѣкъ, гдѣ будутъ святить воду, въ другія, гдѣ водосвятія не будетъ, и берутъ съ собою всякой скотъ и животъ; въ это время кто выдернетъ полѣно дровъ, у того очутится кусокъ матеріи, кто возьметъ сѣна горсть, вмѣсто него окажется шелкъ (20).

10. На Григорія Нисскаго иней на стогахъ—къ мокрому году (5).

16. Петра полуокорма—вышла половина зимняго корма (5).

18. Съ Аѳанасіева дня полозъ покатится по дорогѣ лучше, скрипѣть не будетъ (6). Отъ воробья стѣна бываетъ мокра (17).

20. На Фимія (Евімія) метель,—всѧ масленица метельница (5).

24. Ксеніи полу зимницы: половина зимы прошло; цыганъ ужъ шубу свою продалъ, а медвѣдь въ берлогѣ легъ на другой бокъ (7).

25. Переломъ зимы. На полу зимницу ведро—весна красна (5).

ФЕВРАЛЬ. Если въ февралѣ нанесло въ сугробы много снѣга, лѣтомъ будетъ много сѣна (7). Февраль—бокогрѣй (8). Февраль мѣсяцъ сердитый (7).

1. На Трифона звѣздистая ночь—поздняя весна (6).

2. На Срѣтеніе утромъ снѣгъ—урожай раннихъ хлѣбовъ, въ полдень—среднихъ, къ вечеру—позднихъ. На Срѣтеніе капель—урежай на пшеницу (5). Зима съ лѣтомъ встрѣтилась и съ дороги не воротить, а лѣто ее въ зубы колотитъ: зубы трещатъ, ребятишки, сбирая ихъ, пищать (съ крыши повисли сосульки) (7).

22. Аѳанасьевъ день. День снѣжный—урожай овецъ (овечій праздникъ) (7).

29. Касьянъ на дерево глянетъ—дерево вянеть (8). Въ какой день пришелся Касьяновъ день, въ тотъ день всѣ три года никакихъ работъ не начинаютъ, считаютъ несчастнымъ днемъ (23).

МАРТЪ. **1.** Евдокія лѣто указываетъ; съ Евдокіей погоже—все лѣто гоже. Пришли Евдокеи—мужику за шеи (?) (8). Евдокія пришла—воды въ горѣкѣ принесла: воробей да курицы пьютъ изъ лужицы. Теплый день—скоро талица (7). Если вѣтеръ большой мететъ, то кормъ съ повѣтей смететъ (значитъ будетъ длинная зима, и весной кормъ весь стравятъ, на повѣтяхъ ничего не останется) (19). Въ Евдокію стужа и вѣтеръ—будетъ поздняя и холодная весна, а если теплая, хорошая погода—будетъ ранняя весна и теплая (17). Если на Евдокію рано утромъ на облокахъ (?) будетъ иной въ видѣ мягкаго снѣга и его рукой можно сдвигать съ оглобель, то надо сѣять рано пшеницу (9).

2. Ѹедота вѣтродуя (11).

4. Коли грачи прямо на гнѣзда летятъ—дружная весна (5).

9. Прилетаютъ 40 птицъ; если утромъ въ тотъ день не заморозить, то нужно ждать сорокъ утреннихъ заморозковъ (17).

17. Съ Алексѣева дня щука ледь лбомъ прошибеть (2).

25. Завертки изъ саней убирай, а то новая вдергивай. Благовѣщеніе—теплый день,—крутая талица, а холодный—снѣгъ долго пролежть (7). Если на Благовѣщеніе снѣгъ на крышахъ есть, такъ будетъ еще на Егорья въ полѣ. На Благовѣщеніе застынетъ—еще 40 утренниковъ застынетъ (6). На Благовѣщеніе гроза—къ теплому лѣту, урожай орѣховъ (5). Если выуга—весна затяжливая; на Благовѣщеніе холодъ—завертки не вывертывай (долго на саняхъ ъздить) (1). Въ какой день Благовѣщеніе случится, тотъ день въ теченіе года считаются неудобнымъ начинать какое-нибудь дѣло.

АПРѢЛЬ. Въ апрѣль земля прѣть, рыба икру выпускаеть (7). Не ломай печей: еще апрѣль у плечей. Если апрѣль съ водою, май съ травою (8). Если въ апрѣль осина хорошо пушится, тогда больше ячменю родится; долгая плетка на осинѣ—долгіе колосья на ячменѣ (23).

1. Хорошая погода—хорошая дружная весна (1). Мары обманщицы. Марья зажги снѣгъ, заиграй овражки (8). Стараться ловить рыбу (сначала нужно кого-нибудь обмануть)—будешь счастливый ловецъ на все лѣто (7). Если разливъ на Марью Египетскую, травы будетъ много (6).

3. Если на Игнату ледъ не прошелъ, уловъ рыбы будетъ плохой 5 и 6).

8. На св. Руфа дорога рухнетъ (8).

11. Антипы водополья,—половода; если вѣды не вскроются—плохое лѣто (6).

16. Прины разсадницы,—сѣй капусту на разсадникъ (6).

23. Съ Егорья принято начинать посѣвъ (3). Если на Егорьевъ день прибудетъ вода въ рѣкѣ, то будетъ большая вода; если по берегамъ во время ледохода остается ледъ, и вода убываетъ, оставляя его таять на берегу, будетъ годъ плохой (12). Въ день Георгія не работаютъ на лошадяхъ, почитая Егорья Храбраго покровителемъ лошадей (17). Юрій весну начинаетъ, Илья лѣто кончаетъ. Коли на Егорья листъ въ полушку, клади хлѣбъ въ кадушку на Успеновъ день (8). На Егорья морозъ—будетъ просо и овесъ (6) Егорій съ пошей, а Николай съ возвѣмъ; сѣй разсаду до Егорья—будетъ капусты довольно (5).

25. На Марка—если пташки летятъ на коношлянникъ, урожай конопли (5).

30. На Якова грѣеть всякаго; затвердила сорока Якова да итвердить про всякаго (8). На Якова звѣздная почь—къ урожаю (5).

МАЙ. Коли въ маѣ дождь—уродится рожь. Май холодный—годъ хлѣбородный (5).

1. Еремей, Еремей про посѣвы разумѣй! На Еремея и лѣвицый съ сохой выѣзжаетъ (6). Если до 1 мая листъ на березахъ не разовьется, а кукушка уже кукуетъ, нужно ожидать неурожайного года; говорять: закуковала кукушка на голое дерево—будетъ бѣда (17).

2. Борисъ и Глѣбъ сѣютъ хлѣбъ (8).

3. Мавры—зеленыя щи—краиву щипли (8).

5. Прины разсадницы: стараются посадить капусты сѣмена въ разсадники, чтобы не было въ капустѣ червяка (19).

6. Іова горошиника. Большая роса—къ урожаю огурцовъ; ясный день—къ тому же (5).

8. На Ивана Богослова сѣй пшеницу безъ слова (8). Сѣва въ этотъ день не производятъ опасаясь, чтобы посѣвы не были выбиты градомъ; называютъ день—днемъ Ивана Градобоя (9).

9. Лягушка квакаетъ—овесь скажетъ (8).

11. На Мокія мокро—все лѣто мокро (8). На Мокія дождики—лѣту быть пенаствому; лепъ можно сѣять па высокихъ мѣстахъ (23).

18. Коли на святого Федота на дубу макушка сѣй опушкой, будуть мѣрить овесъ кадушкой (5). Семь дѣвъ сѣютъ ленъ (8).

20. Фалалея огурешника—сади огурцы (5).

21. На царя Константина и Елены ленъ сѣй (19). Послѣдній сѣвъ (1).

22. Отъ Василиска до соловья близко (8).

24. Если къ Иванову дно земля сырая, то бываетъ урожай на хлѣба, если сухая — къ неурожаю (23).

29. Феодосіи колосницы — хлѣбъ колосится (5).

ЮНЬ. **1.** Конецъ полѣтъя — начало лѣта. Красное утро на Устина — красный паливъ ржи (5, 6 и 8).

3. На св. Лукіана юговой (вѣтеръ съ юга) — урожай яровой (5 и 8); съверо-западный вѣтеръ — къ сырому лѣту (5 и 6).

8. На Федора роса — копопли полоса. Грозы на Федора лѣшаго — плохая уборка тѣна (8). Росы съ Федора — къ урожаю льна и копопли (5).

12. Опушфрія рѣпостъва. Въ этотъ день сѣютъ рѣну, чтобы цѣлу зиму была свѣжая и не дряблая (19).

13. Гречу сѣютъ или за недѣлю до Акулины или черезъ недѣлю посль нея (5).

15. Амосъ дождя прінесъ. Въ с. Каргийскомъ день прор. Амоса чтится жителями особенно: въ сороковыхъ годахъ съ весны была сильная засуха, пересохли рѣчки и болота и даже не было ни одной росы; по этому случаю и установлено ежегодное въ этотъ день богомолье и крестный ходъ по полямъ за Чернью рѣчку, гдѣ сооружена часовня во имя св. Амоса (8).

16. На св. Тихона солнце идеть твіше (6).

24. До Ивана просите, дѣти, дождя у Бога, а посль Ивана я и самъ упрощу (5 и 6). На Иванову ночь звѣздно — много грибовъ будетъ (5 и 6). На Ивана Купала первый покосъ (8). Иванъ — градущій: вѣрять, что если кто будетъ работать въ этотъ день, то у того градомъ хлѣбъ выбьетъ (17).

29. Коли на Петровъ день дождь, то сѣпокосъ будетъ мокрый; на св. Петра дождь — урожай худой, два — хороший, три — богатый (5). Петръ да Навель дни убавилъ (8). Если посль дождя парить сильно, то опять дождь будетъ.

ІЮЛЬ. Макушка лѣта, страдникъ сбить сѣно зорникъ, мужицкую спѣсь, хоть и на печь не лѣзъ. Іюль — припасай пуль, начинай охоту (8). Въ іюль на дворѣ пусто, да на полѣ густо (6).

1. Косма и Даміанъ — праздникъ косарей. Козма и Даміанъ пришли — на покосъ пошли. Въ день Космы и Даміана косить не рапо (8). Макушка лѣта (6).

8. Коли на Казанскую черница поспѣла — поспѣла и рожь (8).

15. Кирика и Іулитты. Въ этотъ день крестьяне не убирають сѣна, такъ какъ день этотъ называютъ грознымъ; если въ этотъ день убираютъ сѣно, то оно непремѣнно сгоритъ огнемъ, потому что Кирика самого на огнь мучили (19).

16. На Аениогена птички задумываются (8).

19. Макрины именинницы. Коли на Макрину мокро, то страда непастная (6 и 8). Макрина мокра — и осень мокра; — суха — и осень тоже (6 и 23).

20. Пророка Иліи. Въ этотъ день крестьяне не работаютъ, такъ какъ старые люди говорятъ, что если работать, то день не проходитъ безъ наказанія; отъ молниі пачинается пожаръ (28). На Илью до обѣда лѣто, а послѣ обѣда осень. До солнца пройти три покоса — ходить бу-дешь не бoso (6). Илья жито зажигаетъ — лѣто кончаетъ (8).

22. На Марию сильныя росы — льны будутъ сѣры и косы, а коли гроза, то сѣна за глаза (8).

25. Если на Анну роса холодна — и зима будетъ холодна (23).

27. Пантелеймонъ цѣлитъ — обѣй болѣзней хранитель. Память Пантелеимона особенно почитается крестьянами съ 1886 г.: въ этотъ годъ къ жатвѣ ржи приступили съ 10 — 15 іюля и вскорѣ замѣтили, что въ суслонахъ появился въ громадномъ количествѣ желтый червякъ около $1/2$ вершка въ длину; червякъ этотъ уничтожалъ не только зерно, но и солому; по этому случаю крестьяне начали молебствовать, обходили поля крестнымъ ходомъ, кропили суслоны святою водой (это было 27 іюля). Послѣ этого стали замѣтать, что на суслоны въ большомъ коли-чествѣ набросились голуби и воробы и начали пожирать червяка; въ концѣ іюля червякъ исчезъ*) (8).

АВГУСТЪ. Въ августѣ серпы грѣютъ, вода холодить (6). Въ ав-густѣ — капуста, а въ мартѣ — осстрѣ (8).

1. Пришелъ Спасъ — бери рукавицы про запасъ. Съ первого Спаса озимь сѣять начинай, а до Флорова дня (18 авг.) кончай (6 и 8). На первый Спасъ лошадей купаютъ (8).

3. Высокіе вихри — къ крутой зимѣ (8).

6. Мужику три работы: нахать, косить и сѣять (27).

10. Коли на Лаврентія вода тиха, осень будетъ тиха и зима безъ вьюгъ (8).

15. Успеніе провожай и осень встрѣчай (27). На Успеніе огур-цы солить, на Сергія капусту рубить (8).

18. Если на Флоровъ день лошади стоять тихо, то будетъ здор-вый годъ на скотъ (23). Въ этотъ день крестьяне не работаютъ на ло-шадяхъ и перѣдко служатъ молебны, считая Флора конскимъ богомъ, сохранившимъ здоровье лошадей (20). Сѣй озимь отъ Преображенія до Флора (8).

23. Муч. Луки; овесъ морозомъ лупить (8). Овесъ вѣтромъ лу-пить (6).

*) Это — гусеница бабочки *Hadena Basilinea*, F. — въ тотъ же годъ сильно вредившая хлѣбамъ и въ Пермской губерніи.

25. Если день веселый, и журавли летаютъ высоко—осень будетъ ведреная (23).

26. Наталы овсянницы—овесь косить (8).

27. Собираютъ для лѣченія головы траву, называемую березкой; вкусы горькій, какъ полынь; пьютъ ее утромъ и вечеромъ по стакану (23).

СЕНТЯБРЬ. Батюшка сентябрь не любить баловать. Въ сентябрѣ и листья на деревѣ не держатся (8).

1. Семеновъ день—журавлямъ срокъ. Съ Семенова дня журавли паужину унесли (6). Съвалка съ плечъ (8). Бабье лѣто (27).

14. Воздвиженіе кафтанъ съ плечъ сдвигаетъ, тулупъ надвигаетъ (8). Не жди—рѣпу рви: Покровъ (?) не дождался—капусту сѣкли (27). Богулы почитаютъ этотъ день: на него медведь въ берлогу ложится (24).

30. На Григорія жги солому изъ постели, набивай другую (8).

ОКТЯБРЬ. Охъ ты, батюшка октябрь, только и добра въ тебѣ, что пивомъ взялъ (8). Въ октябрѣ ни на саняхъ, ни на телѣгѣ (6).

1. Если суббота передъ Покровомъ по голу (безъ снѣгу), то и Дмитріевка тожъ; если со снѣгомъ, то и Дмитріевка со снѣгомъ (6). Если въ Покровъ вѣтеръ дуетъ съ юга, то къ теплой зимѣ, если съ сѣвера —къ холодной (2). Если Покровъ наголѣ и Екатерина наголѣ. На Покровъ вѣтеръ съ востока—зима холодная. Покровъ, натопи хату безъ дровъ (8 и 27).

6. Щома—полна закрома (27).

7. Съ Сергія зима начинается, съ Матрены черезъ 4 семини остановится (27).

22. Кто на Казанскую женихается, тотъ не раскается (27).

26. Праздникъ овипамъ (28). Дмитріевъ день перевоза не ждеть (не кличетъ) (27).

29. Аврамія овчарника. Настасьи стригольницы (27).

НОЯБРЬ. Въ ноябрѣ съ домовымъ, какъ съ роднымъ; или задабривай или выгонай (27).

1. Косма и Даміанъ, попаужнать къ намъ. Журавли паужину унесли (27).

9. Съ Матрены зима встаетъ на ноги (27).

11. Федоръ землю студить (27).

14. Если куржакъ на лѣсу въ Филипповкѣ, то—урожай ярового (8).

21. Въ Введеніе морозъ—всѣ праздники морозны, тепло—всѣ праздники теплы (6). Введеніе ломаетъ леденіе. Въ Введеніе морозы зиму не оставятъ (27).

ДЕКАБРЬ. Годъ кончаетъ, зиму начинаетъ (27).

1. Пророкъ Наумъ наставляетъ на умъ (27).

5. Савва гвозди острить (27).

9. На св. Апну—бабій посты; большой иней, бугры снѣга—къ

урожаю; коли снѣгъ привалитъ вилоть къ изгороди—плохое лѣто, а коли есть промежутокъ—урожайное (8).

25. Какова опока на деревьяхъ, таковъ будетъ и цвѣтъ на хлѣбѣ. Къ Рождеству рубаха сурова да нова. Звѣздное небо къ приплоду скота (8).

Переходящіе дни.

Масленица. Если па масленицу въ понедѣльникъ будетъ снѣгъ—урожай огурцевъ будетъ; во вторникъ—урожай грибовъ; въ среду—урожай хлѣбовъ (17). Замѣчаютъ, въ который день па масленой недѣлѣ бываетъ ведро, солнечный день,—въ понедѣльникъ, вторникъ и пр., чтобы въ тотъ же день во время весеннаго сѣва сѣять пшеницу (9). Какая была погода на масляной, такая будетъ и страдой (7).

Чистый понедѣльникъ. Если въ чистый понедѣльникъ—ненастье, то весной придется долго скотину кормить (10).

Великій четвертокъ. Оставляютъ вѣнокъ, которымъ мези въ этотъ день избу, для поливки имъ огурцовъ и капусты, чтобы овощи не тронула червь. Хорошо также осыпать овощи четверговой золой (7).

Пасха—въ заморозкахъ, значить будетъ ядреная пшеница (26).

Примѣты, по которымъ опредѣляютъ урожай хлѣбовъ и травъ

Изобильный цвѣтъ черемухи обѣщаетъ изобильное лѣто (26).

Въ какой сторонѣ съ весны первый громъ гремѣлъ, тамъ выбьетъ градомъ хлѣбъ. Если громъ гремитъ сухрено, то надо ожидать хорошаго урожая хлѣба и большого умолота, если тучно громъ, то хлѣба не ядrenые будутъ (21).

Если коровушка подъ осень домой запасъ песять, то вѣрный признакъ, что недостатокъ корма будетъ; а если курицы па сѣдало сядутъ, посидятъ да опять слетятъ и начнутъ съ жадностью клевать кормъ.—вѣрный признакъ дороговизны хлѣба (20). Если скотъ осенью, приходя съ поля дѣмой, какъ голодный хватаетъ солому и теребить крыши—къ дорожному корму (12).

Весной во время сѣва, вечеромъ и утромъ, въ болотахъ и займищахъ кричить птица вынь (вынь), издающая по пѣсколько разъ глухіе звуки какъ бы изъ-подъ земли; сколько разъ вскрикнетъ, столько будетъ и овиновъ хлѣба на десятинѣ (12).

Если зимой снѣгъ сѣшивается съ крышъ—къ урожаю хлѣбовъ (?).

Если листъ въ лѣсу спадетъ дочиста—годъ будетъ хороший, а если не дочиста, то плохой (6). Если снѣгъ на рѣкѣ лежитъ струями, то къ большой водѣ; на поляхъ струями—къ урожаю хлѣбовъ. Осень и начало зимы холодныя—весна и начало лѣта жаркія. Осень и

зима буранливая—будетъ лѣто дождливое. Осень теплая—весна холодная. Осень ненастливая—къ хорошему году (12).

Примѣты для опредѣленія времени сѣва, чистки пашни изъ подъ лѣса и истребленія сорныхъ травъ.

Если черемуха расцвѣла—пора сѣять пшеницу (9). Въ апрѣль замѣчаютъ: если лягушка начала квакать—значить сѣвъ поспѣль (12). Если первый лягушій квакъ замерзнетъ, то и первый сѣвъ яровыхъ замерзнетъ (23). Сѣй овесъ въ грязь—будешь князь. Сѣй пшеницу, когда весна стоитъ ясными днями (6). Если коренить для пашни лѣсь подъ молодой мѣсяцъ, поросль одолить; чтобы ея не было, нужно коренить на ущербъ. Если для уничтоженія осота*) на парахъ, запахивать его подъ новый мѣсяцъ—на боку осотъ будетъ лежать, а всетаки расти; чтобы уничтожить его, нужно пахать на ущербъ (д. Почекунина, Бронниковской вол., Тобольского уѣзда).

Примѣты о погодѣ.

Если пройдетъ дождь и на водѣ плаваютъ пузыри, то дождь долженъ быть продолжительный. Куры ошипываются—передъ дождемъ. Кошка лѣзетъ на печь или въ чѣло печи—ожидаютъ холода (11). Лѣто сырое и дождливое—осень хорошая и тихая,—зима холодная и вѣтреная (27). Если поутру или вечеромъ дымъ изъ трубы стелется по землѣ—къ ненастью. Если лѣтомъ не бываетъ поутру росы, то будетъ скоро ненастье. Если земляная лягушка квакаетъ въ (на ?) землѣ, то надо ожидать перемѣны погоды къ ненастью. Въ какихъ мѣсяцахъ зимою морозы, въ такихъ лѣтомъ жара, т.-е. лѣто противъ зимы, а весна противъ осени. Пословица говорится: если зима колотится, то лѣто воротится (21). Если чернотальникъ осенью расцвѣтеть (распустится), то быть скоро снѣгу (6). Если листъ съ березы спалъ чисто—легкій годъ, нечисто—къ суровой зимѣ (8). Низкій полетъ птицъ—къ ненастью. Заходъ солнца въ морокъ—къ дождю ночью (4). Куры носомъ колотять часто—къ морозу. Лошади храпятъ—къ снѣгу. Галки играютъ—къ дождю (28).

Примѣты для опредѣленія высоты воды въ рѣкахъ.

Если при вскрытии рѣкъ дикия утки садятся на берега, а не на

*) *Cirsium arvense*. Scp.

-файл отмены с, так же как и в первом случае, содержит только один файл, то есть, это файл, который не содержит никакой информации о том, что он был создан.

КРАТКАЯ ПРОГРАММА

для сбиранія этнографическихъ свѣдѣній (о религіозныхъ вѣрованіяхъ, домашнемъ и общественномъ бытѣ крестьянъ, народномъ языке и словесности, народной медицинѣ, сельскомъ хозяйствѣ, памятникахъ старины) по Тобольской губерніи.

Тобольская губернія, отличаясь разнохарактерностью населения, несомнѣнно можетъ дать не мало этнографического материала по народной словесности, народной медицине, сельскому хозяйству и т. п. Между тѣмъ для собиранія его до сихъ поръ еще ничего не сдѣлано, если не обращать вниманія на краткія замѣтки и небольшія статейки по данному вопросу, и нѣкоторыя пѣсни, случайно записанныя. Тобольскій губернскій музей, идя на встречу настоятельной нуждѣ въ изученіи быта крестьянъ Тобольской губ., выработалъ предлагаемую программу съ цѣлью, между прочимъ, привлечь къ совмѣстной работе по собиранію этнографического материала всѣхъ интеллигентныхъ лицъ, близко соприкасающихся съ народомъ, или же дать руководство тѣмъ, которые уже имѣютъ нѣкоторый запасъ свѣдѣній и наблюдений. Въ настоящей программѣ намѣченъ рядъ вопросовъ, обнимающихъ почти всѣ стороны народнаго быта. Многимъ, можетъ быть, покажется неспособнымъ отвѣтить на всѣ вопросы, но это и не требуется. Знакомый съ медициной можетъ собрать данные о болѣзняхъ, о способахъ лечения, о лѣкарственныхъ травахъ; интересующійся народной словесностью окажетъ большую услугу музею, если запишетъ нѣсколько пѣсень, пословицъ и т. п. Отъ специалиста по сельскому хозяйству желательно получить свѣдѣнія объ особенностяхъ въ хозяйствѣ мѣстныхъ крестьянъ. Достаточно, если ктонибудь отвѣтить лишь на одинъ изъ предложенныхъ вопросовъ.

Рекомендуется, при собираниі тѣхъ или иныхъ свѣдѣній, кратко, но точно указывать мѣстность, гдѣ производились наблюденія, составъ населенія, отъ котораго получены свѣдѣнія (русскіе, татары, зыряне, остыки и пр.) и при какихъ обстоятельствахъ.

воду, то будетъ большая вода. Въ муравьище втыкаютъ палку, когда оно вытаеть, и если муравей доползть до половины палки и воротится назадъ, то вода будетъ малая, а если вползть на вершину палки и еще будетъ стараться какъ бы встать на заднія ноги, то разливъ будетъ большой (9).



-факт отмены санкций, или же это неизвестно. Один из вариантов — это то, что санкции были отменены в результате политического решения, а не из-за каких-либо конкретных действий со стороны ЕС. Второй вариант — это то, что санкции были отменены в результате политического решения, а не из-за каких-либо конкретных действий со стороны ЕС.

КРАТКАЯ ПРОГРАММА

для собирания этнографическихъ свѣдѣній (о религіозныхъ вѣрованіяхъ, домашнемъ и общественномъ бытѣ крестьянъ, народномъ языке и словесности, народной медицинѣ, сельскомъ хозяйствѣ, памятникахъ старины) по Тобольской губерніи.

Тобольская губернія, отличаясь разнохарактерностью населения, несомнѣнно можетъ дать не мало этнографического материала по народной словесности, народной медицине, сельскому хозяйству и т. п. Между тѣмъ для собиранія его до сихъ поръ еще ничего не сдѣлано, если не обращать вниманія на краткія замѣтки и небольшія статейки по данному вопросу, и нѣкоторыя пѣсни, случайно записанныя. Тобольскій губернскій музей, идя на встречу настоятельной нуждѣ въ изученіи быта крестьянъ Тобольской губ., выработалъ предлагаемую программу съ цѣлью, между прочимъ, привлечь къ совмѣстной работе по собиранію этнографического материала всѣхъ интеллигентныхъ лицъ, близко соприкасающихся съ народомъ, или же дать руководство тѣмъ, которые уже имѣютъ нѣкоторый запасъ свѣдѣній и наблюдений. Въ настоящей программѣ намѣченъ рядъ вопросовъ, обнимающихъ почти всѣ стороны народнаго быта. Многимъ, можетъ быть, покажется не-посильнымъ отвѣтить на всѣ вопросы, но это и не требуется. Знакомый съ медициной можетъ собрать данные о болѣзняхъ, о способахъ лечения, о лѣкарственныхъ травахъ; интересующійся народной словесностью окажеть большую услугу музею, если запишетъ нѣсколько пѣсенъ, пословицъ и т. п. Отъ специалиста по сельскому хозяйству желательно получить свѣдѣнія объ особенностяхъ въ хозяйствѣ местныхъ крестьянъ. Достаточно, если ктонибудь отвѣтить лишь на одинъ изъ предложенныхъ вопросовъ.

Рекомендуется, при собираниі тѣхъ или иныхъ свѣдѣній, кратко, но точно указывать мѣстность, гдѣ производились наблюденія, составъ населенія, отъ котораго получены свѣдѣнія (русскіе, татары, зыряне, остыки и пр.) и при какихъ обстоятельствахъ.

Собранный материалъ, съ адресомъ лица, собиравшаго свѣдѣнія, покорнѣйше просить доставлять въ Тобольскъ, въ редакцію „Ежегодника Музея“.

1) *Описание религиозныхъ вѣрованій.*

Необходимо обратить вниманіе, насколько христіанство отразилось на міровоззрѣніи народа, какія существуютъ легенды, духовные стихи, молитвы, гимны. Не сохранилось ли обоготворенія силъ природы въ формѣ жертвоприношеній или особаго почитанія нѣкоторыхъ предметовъ. Вѣра въ нечистую силу, въ чертей, домовыхъ и т. п. Колдуны и вѣдьмы, отличие ихъ отъ знахарей. Чары. Заклинанія. Заговоры. Наговоры. Порча. Гаданія. Ворожба. Сны. Галисманы и амулеты. Счастливые и несчастливые дни и часы. Числа 3, 7, 13. Суевѣрные обычай при крещеніи, свадьбахъ, похоронахъ, сельскихъ работахъ, при уходѣ за скотомъ. Рыболовные и охотничіе обычай, гаданія и примѣты. Примѣты, относящіяся къ ёдѣ, одеждѣ, хозяйственнымъ принадлежностямъ.

2) *Домашний и общественный бытъ крестьянъ.*

Жилище. Пристройки. Огородъ. Садъ. Скотъ. Пища. Напитки. Одежда. Домашняя утварь. Занятія. Промыслы. Будничный день крестьянина. Записать характерные разговоры. Настроение. Развлечения и удовольствія. Сватки. Маскированіе. Масленица и др. праздники. Игры. Украшения. Картины и портреты. Какъ создаются слухи, сплетни? Общественные бѣдствія и отношение къ нимъ. Отношеніе къ старинѣ. Грамотность. Какія читаются книги. Пороки и преступленія.

Бракъ. Рожденіе, воспитаніе и обученіе дѣтей. Совершеннолѣтіе. Семья. Члены семьи. Личные и имущественные отношения въ семье. Раздѣлы и обычай, сопровождающіе ихъ. Болѣзни. Смерть. Поминки. Наиболѣе выдающіеся типы мужчинъ и женщинъ.

Въ чемъ проявляется общественная жизнь крестьянъ. Сходы. Артели. Общинное владѣніе. Съѣзжіе праздники. Гостепріимство. Привѣтствія. Довѣріе. Долговые обязательства. Ссоры.

3) *Собирание материаловъ для изученія народного языка и словесности.*

Для этой цѣли важно записываніе народныхъ повѣрій, преданий, сказокъ (изъ нихъ особенно любопытны тѣ, гдѣ фигурируютъ животные), пѣсенъ (особенно старинныхъ, обѣ Ильѣ Муромцѣ, Ерусланѣ, Бовѣ, Ермакѣ и пр.); интересно записать всѣ формы такъ называемыхъ рацей, которые читаются славильщиками на Рождество, пословицы, поговорки, скороговорки, загадки, шутки, остроты, сравненія, анекдоты, характерные слова для выражения похвалы, божбы, брави; списокъ словъ, употребляемыхъ

только въ извѣстной мѣстности. Характерные грамматическая и синтаксическая формы рѣчи; имена, фамилии и прозвища. Названія урочищъ. Должностная лица и ихъ названія.

4) Собирание материала для пополненія народного календаря; пріуроченные къ днамъ извѣстныхъ святыхъ повѣрья (очень любопытно собрать народные сказанія о Касьянѣ), примѣты о погодѣ, о времени сѣва хлѣбовъ.

5) Собирание материаловъ по народной медицине: какъ лѣчить разныя болѣзни, какія существуютъ наговоры, лѣкарства, причемъ важно собирать и образцы лѣкарственныхъ растеній. Акушерство. Собирание такихъ же свѣдѣній по ветеринарии: чѣмъ народъ лечитъ скотъ, какія болѣзни различаются, какъ ихъ называются. Особые услуги въ этомъ дѣлѣ, конечно, могли бы оказать врачи, могущіе переложить народные названія болѣзней на научный языкъ.

6) Для составленія карты распространенія въ губерніи кургановъ и городищъ, очень важно постепенное для разныхъ мѣстностей составление списковъ кургановъ и городищъ, съ указаніемъ ихъ географического положенія; не было ли дѣлаемо находокъ и какихъ?

7) Составленіе словарей народныхъ терминовъ, разнаю рода промысловъ, напр: сельско-хозяйственного, рыбнаго, звѣринаго (т.-е. составленіе списка названій отдельныхъ предметовъ и ихъ частей, употребляемыхъ въ сельскомъ хозяйствѣ, въ рыболовномъ дѣлѣ, охотѣ и т. п.).

8) Составленіе для разныхъ мѣстъ указателей мѣста находженія полезныхъ ископаемыхъ: бѣлая глина, руда желѣзная, мѣдная, слюда, каменный уголь, песокъ, камень и пр.

9) Описаніе некоторыхъ рѣдко встрѣчающихся производствъ, напр.: на сѣверѣ описаніе способа добыванія бересты и изготовленія куженекъ, или описаніе способа приготовленія крапивы въ пряжу и для тканья.

10) Лица, могущія имѣть доступъ въ архивы волостныхъ правленій, могли бы оказать музею услугу составленіемъ списковъ интересныхъ дѣлъ, характеризующихъ ту или иную сторону жизни края.

11) Интересно и важно указаніе для данного района всѣхъ новинокъ, начинаний и опытовъ въ сельскомъ хозяйстве, напр., указаніе распространенія улучшенныхъ земледѣльческихъ орудій и машинъ, породистаго скота, введенныхъ въ полевую культуру новыхъ растеній; опыты орошенія луговъ, осушеніе болотъ и пр.

12) Интересно составленіе для данного района свѣдѣній о

нахождении у местных жителей старинныхъ предметовъ утвари, картинъ, мебели,—а равно указанія о существованіи въ средѣ крестьянъ художниковъ, поэтовъ, пѣсенниковъ, музыкантовъ, изобрѣтателей и составленіе коллекцій ихъ произведеній.

13) Лица, имѣющія фотографическіе аппараты, могли бы собрать интереснѣйшія коллекціи снимковъ, характеризующихъ природу и человѣка; а именно были бы желательны снимки:

- а) характерныхъ типовъ народностей,
- б) местныхъ костюмовъ съ ихъ особенностями, головныхъ уборовъ или другихъ украшеній или покрова,
- в) местныхъ построекъ и домашней утвари,
- г) домашняго скота, лошадей, коровъ, овецъ, свиней, собакъ, птицы и пр.,
- д) церквей старинныхъ и ихъ внутренней обстановки; остатковъ памятниковъ старины и снимки со старинныхъ предметовъ, грамотъ и писемъ,
- е) лѣсовъ, степей, солонцевъ, рямовъ и пр.

Особенный интересъ имѣли бы снимки для стереоскопа. Каждый снимокъ рекомендуется снабжать болѣе или менѣе подробнымъ описаніемъ, поясненіями,—гдѣ произведено фотографированіе, съ кого, при какихъ обстоятельствахъ; название костюмовъ, утвари, ихъ употребленіе, обозначеніе величины лѣсныхъ, степныхъ и т. п. пространствъ; сообщеніе историческихъ свѣдѣній о церквяхъ и т. д.

14) Собирание естественно историческихъ коллекцій (подробные программы желающіе могутъ получить въ музеѣ).



Открыта подписка на 1902 г.

на политическо-общественную и литературную газету

“ЕНИСЕЙ”.

Выходитъ въ г. Красноярскъ три раза въ недѣлю.

ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ:

1. Телеграммы, помѣщаемыя въ текстѣ газеты или отдельными бюллетенями.
2. Отдѣльный официальный. Важнѣйшія правительственные распоряженія.
3. Передовыя статьи, касающіяся жизни русскихъ областей, совмѣстно съ интересами сибирскихъ губерній, соприкасающихся съ бассейномъ рѣки Енисея, а также вопросы русской политики на Востокѣ.
4. Статьи и очерки по вопросамъ Енисейского края и соприкасающихся съ нимъ губерній Сибири,—по городскому и земскому хозяйству, статьи по сельскому хозяйству, экономическая, торговая, по фабрично-заводскому производству и горной промышленности.
5. Обзоръ общественной жизни Сибири и России. Городская хроника. Театръ и музыка.
6. Политическая извѣстія, общія и, въ частности, касающіяся азіатскихъ странъ.
7. Корреспонденціи изъ различныхъ мѣстностей бассейна рѣки Енисея и соприкасающихся съ нимъ губерній, а также сообщенія изъ Россіи.
8. Научный отдѣль.—Открытія и путешествія по Сибири и ея окраинамъ, свѣдѣнія по исторіи, статистикѣ и промышленности.
9. Литературное обозрѣніе,—критикъ и библіографія, особенно сочиненій оба Азіи.
10. Фельетонъ: романы, повѣсти, рассказы, очерки, сцены, наброски, летучія замѣтки и стихотворенія.
11. Судебная хроника, безъ обсужденія решений.
12. Смѣсь. Отвѣты редакціи.
13. Справочный отдѣль: судебные свѣдѣнія, святцы, рыночныя цѣни, свѣдѣнія о приходѣ и отходѣ пароходовъ. поѣздовъ жел. дорогъ, предоставленные телеграммы и т. п.
14. Объявленія: казенные и частныя.

Подписьная цѣна:

**съ доставкой и пересылкой, на годъ 7 рублей, на полгода 4 рубля,
на четверть года 2 руб. 50 коп., на одинъ мѣсяцъ 1 рубль.**

Городскіе подписчики, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней, получаютъ бесплатно телеграммы Россійского телрафонаго Агентства.

Подписка принимается въ Красноярскѣ—въ конторѣ редакціи газеты, въ Томскѣ—въ отдѣлѣніи конторы, въ Москвѣ въ центральной конторѣ объявленій Торгового Дома Л. и Э. МЕТЦЛЬ и К°, Мясницкая ул. д. Сытова, и въ конторѣ объявленій И. К. Голубева—Покровка д. церкви Иоанна Предтечи, въ Петербургѣ—въ отдѣлѣніи конторы Т. д. Л. и Э. МЕТЦЛЬ и К°, Б.-Морская № 11. Плата за объявленія впереди текста 20 коп. за строку; позади текста 10 коп. за строку петита. **ОБЪЯВЛЕНИЯ** изъ всѣхъ мѣстъ и странъ принимаются непосредственно въ конторѣ газеты, въ Красноярскѣ, а также въ конторѣ Тор. Дома Л. и Э. Метцль и К° (Москва—Мясницкая, д. Сытова и Петербургъ—Б. Морская,

№ 11), въ конторѣ объявленій И. К. Голубева (Москва, Покровка, домъ церкви Ioanna Предтечи), въ отдѣленіи конторы редакціи (Томскъ), въ конторѣ объявленій А. З. Ремизова (Москва, Б. Дмитровка, д. Живаго) и во всѣхъ вообще конторахъ по приему объявлений и подписки.

Редакторъ-издатель Е. Кудрявцевъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА
НОВЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ
КОЛЛЕКЦІОНЕРЪ

предназначенный служить интересамъ собирателей всякаго рода коллекцій.

Программа журнала.

1. Иллюстрированный обзоръ новостей.
2. Статьи научнаго и практическаго содержанія, имѣющія отношеніе къ предметамъ, составляющимъ объектъ коллектированія. Описаніе музеевъ, замѣчательныхъ коллекцій и т. п. (съ иллюстраціями).
3. Фельетонъ. Мелкія статьи, анекдоты, біографіи известныхъ коллекціонеровъ.
4. Фальсификаціи и поддѣлки. Описаніе различнаго рода поддѣлокъ, съ цѣлью предостеречь коллекціонеровъ отъ обмана.
5. Бібліографія. Обзоръ новыхъ книгъ и каталоговъ, предназначенныхъ для коллекціонеровъ.
6. Почтовый ящикъ. Вопросы подписчиковъ и отвѣты по нимъ редакціи.
7. Объявленія.
8. Приложенія. Различные каталоги и спеціальные сочиненія, которыя редакція отъ времени до времени выдаетъ своимъ подписчикамъ въ видѣ бесплатнаго приложенія къ журналу.

Поставивъ себѣ задачей создать для русскихъ собирателей объединяющій ихъ органъ печати, настоятельная потребность въ которомъ чувствуется уже давно—редакція будетъ стремиться къ возможной разносторонности, отведеніемъ постоянныхъ отдѣловъ для всѣхъ наиболѣе важныхъ отраслей коллектированія.

Иллюстраціи статей будетъ отведено широкое мѣсто, въ спе-

ціальнихъ объявленіяхъ будетъ дано мѣсто спросу и предложенію и организованъ удобный обмѣнъ объектовъ коллектированія между собирателями.

Въ портфели редакціи уже имѣется богатый запасъ материала. Въ ряду приложений въ первую очередь намѣчены руководства по собиранію картинъ, фарфора, естественно-историческихъ коллекцій и т. д.

Журналъ будетъ выходить 2 раза въ мѣсяцъ.

Первый номеръ выйдетъ 1 декабря.

Подписная цѣна
въ годъ **2 р. 50 к.** съ доставкою и
пересылкою

Съ требованіями обращаться въ г. Псковъ, въ контору журнала „Коллекціонеръ“.

**ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА
ИЗВѢСТИЯ
МОСКОВСКАГО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА.**

Годъ VIII 1902.

Извѣстія выходятъ ЧЕТЫРЬМЯ книгами въ годъ, составляющими не менѣе 35 листовъ текста in 8°.

ПРОГРАММА ИЗВѢСТИЙ

Официальный отдѣлъ.

- I. Правительственные распоряженія, касающіяся М. С. Х. Института.
- II. Постановленія Совѣта Института и относящіяся къ нимъ приложения: а) программы и планы лекцій и практическихъ занятій въ Институтѣ; б) отчеты объ экскурсіяхъ, ежегодно совершаемыхъ студентами Института подъ руководствомъ профессоровъ, преподавателей и пр.; в) работы комиссій, назначаемыхъ Совѣтомъ Института для разслѣдованія различныхъ вопросовъ и г) отчеты о командировкахъ членовъ совѣта и другихъ лицъ, служащихъ въ Институтѣ.

III. Нѣкоторые изъ журналовъ засѣданій Сельскохозяйственного комитета, состоящаго при Институтѣ, а именно тѣ, которые имѣютъ особенное значеніе для учебной и ученой дѣятельности Института.

IV. Годичный отчетъ о состояніи Института.

V. Каталоги и описанія библіотеки, разнообразныхъ коллекцій и учебныхъ пособій, находящихся при Институтѣ.

Неофиціальний отдѣлъ.

I. Труды профессоровъ, преподавателей, ассистентовъ, студентовъ Института и постороннихъ лицъ, а именно:

- а) естественно-исторические и**
- б) статистико-экономические (преимущественно касающіеся изученія русскаго народнаго хозяйства)**

Сюда входятъ какъ отдельныя самостоятельныя изслѣдованія, такъ и совмѣстныя работы, исполненные въ лабораторіяхъ, кабинетахъ, на опытномъ полѣ, или на предполагаемой опытной станціи, пасѣкѣ, въ лѣстной дачѣ, огородѣ питомникѣ и пр.

II. Критическая и библіографическая статьи о выдающихся произведеніяхъ народнохозяйственной и естественноисторической литературы.

III. Метеорологическія наблюденія, произведенныя на обсерваторіи Института.

Работы могутъ сопровождаться рисунками, таблицами, чертежами, діаграммами и пр. и, по желанію автора, краткимъ резюме на какомъ-либо иностранномъ языке (резюме должно быть составлено самимъ авторомъ и прислано въ редакцію одновременно со статьею). Оглавление каждой книги Извѣстія, кроме русскаго языка, печатается еще на французскомъ языке.

Подписка принимается въ канцеляріи Московскаго Сельскохозяйственнаго Института и въ книжномъ магазинѣ Карбасниковъ (Москва, Варшава, Вильна, С.-Петербургъ) и „Трудъ“ (Москва, Тверская).

Подписьная цѣна въ годъ, за четыре книги 5 р.; для студентовъ высшихъ учебныхъ заведеній 2 р. 50 к.; цѣна отдельной книги 1 р. 50 к.; отдельные отиски статей естественно-историческихъ и статистико-экономическихъ высылаются названными книжными магазинами наложеннымъ платежемъ по расчету 20 коп. за листъ.

Редакторы: С. И. Ростовцовъ.

Д. Н. Прянишниковъ.

Всеобщая Маленькая Газета „С.-ПЕТЕРБУРГЪ“

Собственная типография.—Издание годъ девятый
СПб., Невский, 139.

Всѣ отдельы большихъ газетъ и всѣ новости
всего міра: придворные извѣстія, правительственное и
общественное дѣло, политика, Дальний Востокъ, война
буровъ, среди газетъ, всѣ выдающіяся происшествія,
романы, науки, исторія, докторскія замѣтки и пр., и пр.
Портреты и картины.

Выходитъ три раза въ недѣлю.

Цѣна съ доставкой и пересылкой:
2 Р. за годъ, за полгода 1 Р., за 3 мѣс. 50 к.

Редакторъ-издатель А. Н. Молчановъ.

IX ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

Открыта подписка на 1902 г.

на ежедневную*) общедоступную газету

„Сибирская Жизнь“,

издающуюся въ Томскѣ.

Въ предстоящемъ году редакціей по прежнему будетъ обра-
щено особенное вниманіе на возможно полное и разностороннее оз-
накомленіе своихъ читателей съ жизнью Сибири и на выясненіе ея
нуждъ и экономического и умственного роста. Согласно такой за-
дачѣ, статьи и замѣтки, имѣющія своимъ предметомъ прошлое и

*) Кроме дней послѣ праздниковъ.

настоящее Сибири, а также корреспонденціи изъ разныхъ концовъ Сибири и „Хроника Сибири“ будутъ составлять главные и основные отдѣлы газеты. Вмѣстѣ съ тѣмъ путемъ ежедневно получаemyхъ телеграммъ и въ постоянныхъ отдѣлахъ газеты: „Русская Жизнь“ и „Заграничная Хроника“, читатели „Сиб. Жизни“ будутъ своевременно ознакомляемы со всѣми болѣе крупными явленіями въ области государственной и общественной дѣятельности, науки и искусства какъ остальной части нашего обширнаго отечества, такъ и другихъ государствъ.

Кромѣ лицъ, принимающихъ постояннное участіе въ газетѣ, въ числѣ другихъ, любезно обѣщали продолжить свое сотрудничество и въ будущемъ году нѣкоторые профессора Томскаго университета.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

Годъ. 9 мѣс. 6 мѣс. 1 мѣс.

Съ доставкой въ Томскѣ . 4 р. 3 р. 30 к. 2 р. 30 к. 40 к.

Съ перес. въ другіе города 5 „ 4 „ — „ 3 „ — „ 50 „
съ пересылкой за границу. 9 „ 7 „ — „ 5 „ — „ 1 р.

За печатаніе въ „Сибирской Жизни“ объявленій взимается плата: впереди текста за строку петита—20 к., позади текста—10 к. За разсылку объявлений при газетѣ вѣсомъ не болѣе лота—7 р. за 1000 экземпляровъ.

Подписка и объявленія принимаются: въ книжныхъ магазинахъ и типо-литографіяхъ П. И. Макушинъ въ Томскѣ и Иркутскѣ.

Иногородніе требованія свои адресуютъ: въ г. Томскѣ, контору редакціи газеты »Сибирская Жизнь«.

Издатель П. Макушинъ.

Редакторы: П. Макушинъ.
А. Макушинъ.

5 р.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1902 г.

5 р.

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ

„СИБИРСКУЮ ТОРГОВУЮ ГАЗЕТУ“

Вступая въ пятый годъ изданія, газета будетъ преслѣдовать тѣ же задачи, какія были поставлены при возникновеніи органа, т.-е. слу-

житъ возможно полнымъ отраженіемъ сибирской торгово-промышленной и общественной жизни. Постепенно улучшая внутреннее содержаніе газеты, редакція въ настоящемъ году приложить усиленныя заботы къ выбору наиболѣе цѣннаго матеріала. Къ участію въ газетѣ привлечены новыя литературные силы и приглашено много новыхъ корреспондентовъ.

ПРОГРАММА ИЗДАНИЯ:

- | | |
|---|---|
| 1) Мѣсяцѣсловъ и астрономическая свѣдѣнія. | 7) Промышленный отдѣлъ. |
| 2) Правительственные распоряженія общія и специально касающіяся Сибири. | 8) Миссіонерскій отдѣлъ. |
| 3) Телеграммы собственныхъ агентствъ и Россійского телеграфнаго агентства. | 9) Исторія, археологія, этнографія и географія Сибири. |
| 4) Хроника городской жизни Тюмени и ближайшихъ къ ней городовъ. | 10) Переселенческое дѣло. |
| 5) Торговый отдѣлъ: отчеты о состояніи сибирскихъ рынковъ. | 11) Сельскохозяйственный и лѣсной отдѣлы. |
| 6) Ярмарки: обзоръ ярмарочной торговли какъ на главныхъ ярмаркахъ Сибири и Приуралья, такъ и второстепенныхъ. | 12) Школьный отдѣлъ. |
| | 13) Бібліографія. |
| | 14) Судебная хроника. |
| | 15) Сибирскія вѣсти: перепечатки мѣстныхъ свѣдѣній изъ сибирскихъ и другихъ газетъ. |
| | 16) Смѣсь. |
| | 17) Оправочный отдѣлъ. |
| | 18) Объявленія. |

Въ газетѣ регулярно помѣщаются торговые бюллетени собственныхъ корреспондентовъ изъ Лондона (пушнина, чай, масло, хлѣбъ), Лейпцига (пушнина), Копенгагена, Гамбурга (масло), Ханькоу (чай), Фучжоу (чайный рынокъ), Либавы, Ревеля, Архангельска, Самары, Екатеринбурга, Перми, Кургана, съ линій Сибирской и Пермской желѣзныхъ дорогъ, Москвы, Вологды (масло) и др крупныхъ центровъ торговой Россіи, имѣющихъ большое значеніе для торгов. люда Сибири.

Обращено большое вниманіе на состояніе МАСЛЯНАГО и ПУШНОГО заграничнаго рынка.

Подробныя корреспонденціи и обзоры ярмарокъ: Нижегородской, Ирбитской, Лейпцигской пушной, Ишимской, Крестовской, Тюменской. Обдорской и другихъ. Въ главныхъ торговыхъ пунктахъ Сибири имѣются собственные корреспонденты.

Газета обращаетъ большое вниманіе на общественную жизнь: всѣ выдающіеся факты и явленія ея въ Сибири, на Уралѣ и Дальнемъ Востокѣ находять себѣ мѣсто и освѣщеніе въ многочисленныхъ корреспонденціяхъ, помѣщаемыхъ изъ разныхъ мѣстностей Сибири, а также въ отдѣлахъ: "Сибирскія Вѣсти" и "Съ Дальнаго Востока". Не мало удѣляется мѣста Китайскимъ дѣламъ и положеніе Россіи и Монголіи.

Форматъ газеты будетъ увеличенъ.

Новые годовые подписчики на 1902 г., вносящие при подписке всю подписную сумму, получать газету со дня подписки до 1 января 1902 г.

БЕЗПЛАТНО

Желающие познакомиться съ газетой могутъ ее получать въ теченіи недѣли по высылкѣ 10 копѣекъ марками— почтовыми или гербовыми.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА съ доставкой и пересылкой: на 1 годъ 5 р.—11 мѣсяцевъ 4 р. 75 к.,—10 м. 4 р. 50 к., 9 м. 4 р.,—8 м. 3 р. 50 к.,—7 м. 3 р. 25 к.,—6 м. 3 р.,—5 м. 2 р. 75 к.,—4 м. 2 р. 50 к.,—3 м. 2 р.,—2 м. 1 р. 40 к.,—1 м. 70 к.

Сельскіе священники и др. члены причта, учительскій персоналъ, народныхъ училищъ и воспитанники высшихъ учебныхъ заведеній при подпискѣ на годъ получаютъ газету за 4 р., а на другіе сроки на 15% ниже противъ объявленой цѣны.

Подписываться можно на всѣ сроки, но не иначе, какъ съ 1 числа каждого мѣсяца и не далѣе, какъ до конца года.

За перемѣну адреса уплачивается 20 коп. (могутъ быть присланы почтовыми марками)

Разсрочка допускается исключительно для ГОДОВЫХЪ подписчиковъ и на слѣдующихъ условіяхъ: при подпискѣ 2 р., къ 1 марта, къ 1 апрѣля, и къ 1 мая по 1 рублю.

При невыносѣ подписаніемъ срочныхъ платежей высылка газеты ПРЕКРАЩАЕТСЯ.

Адресъ редакціи: Г. Тюмень Тобольской губ.

Редакторъ-издатель А. А. Крыловъ.

бернії. Съ прилож. извлечений изъ дневниковъ членовъ Красноуфимского отряда.—**Ката-новъ, П.** Преданіе тобольскихъ татаръ о Кучумѣ и Ермакѣ.—**Словцовъ, Борисъ.** Какъ сохранять перо и мѣха отъ моли и естественно-историческая коллекція отъ гниенія?—**Росляковъ, И. П.** Похоронные обряды остяковъ.—**Бартеневъ, В. В.** Понятіе обдорскихъ остяковъ о грѣхѣ.

Приложение I. Труды Комитета по устройству сельско-хозяйственной и кустарной выставки въ г. Курганѣ въ 1895 г. Вып. II. **Гордягинъ, А. Я.** О коллекціи почвъ Тобольской губ.

Приложение II. Труды вспомогательного Тобольского Комитета по устройству всероссийской худож.-промышлен. выставки въ Н.-Новгородѣ въ 1896 г. Вып. III. Опись предметовъ, представленныхъ изъ Тобольской губ. на всероссийскую сельско-хозяйственную выставку въ Москвѣ въ 1895 г. и на худож.-промышлен. выставку въ Н.-Новгородѣ въ 1896 г. Часть I. Сельское хозяйство.—Вып. IV. **Скалозубовъ, Н. Л.** Къ каталогу коллекцій, представленныхъ изъ Тобольской губерніи на Московскую (1895) и Нижегородскую (1896) выставки. Краткіе обзоры коллекцій по отдѣламъ.

VI ВЫПУСКЪ.—Труды Тобольского вспомогательного Комитета по устройству всероссийской худож.-промышлен. выставки въ Н.-Новгородѣ въ 1896 г. Вып. V. Каталогъ и объясненіе коллекцій, представленныхъ изъ Тобольской губ. на худож.-промышлен. выставку въ Н.-Новгородѣ въ 1896 г. Часть II. **Носовъ, И. И.** Кустарная промышленность.—Вып. VI. То же. Часть III. **Носовъ, И. И.** Переселенческий отдѣль. Части IV и V. **Юрасовъ, А. И., П. Ф. П. и Луговскій, Л. Е.** Медицинскій и тюремный отдѣлы. Часть VI. **Костюринъ, В. Ф.** Земскій отдѣль. Часть VII. **Варпаховскій, П. А., Юрасовъ, А. И. и Дунинъ-Горкавичъ, А. А.** Сѣверный отдѣль. Часть VIII. Ветеринарный отдѣль.

VII ВЫПУСКЪ.—Отчетъ по Музею за 1895 г.—**Ката-новъ, Н.** Преданіе тобольскихъ татаръ о прибытии въ 1572 г. мухаммеданскихъ проповѣдниковъ въ г. Искеръ.—**Палопенженцевъ, Николай.** Нольская смута въ Сибири въ 1814 г. Истор. оч.—**Ката-новъ, Н.** Преданіе тобольскихъ татаръ о происхожденіи киргизского народа.—**Словцовъ, И. Я.** Къ политику сибирскихъ воеводъ по отношенію къ сосѣднимъ калмыкамъ. Письмо Тобольского воеводы Хилкова къ Тюменскому воеводѣ Кафтырѣву.—**Луговскій, Л. Е.** О поѣздкѣ на сѣверъ Тобольской губерніи лѣтомъ нынѣшняго года (1896) съ цѣлью врачебно-санитарного осмотра рыбопромышленныхъ заведеній. Сообщеніе съ позднѣйшими прим. и прилож.—**Мамѣевъ, С. Н.** Рукописи библиотеки Тобольского Губернского Музея за XVII и четверть XVIII стол. Опись дозорныхъ, переписныхъ и др. книгъ городовъ Верхотурия, Пелымъ, Турина, Тюмени, Тары и Тобольска, съ ихъ уѣздами. Вып. второй (1645—1676).—**Гордягинъ, А.** Предварительный отчетъ о геоботаническихъ изслѣдованіяхъ въ южной полосѣ Тобольской губ., произведенныхъ въ 1896 г.—**Рузский, М.** Краткій фаунистический очеркъ южной полосы Тобольской губ. Отчетъ г. Тоб. губернатору о зоологическихъ изслѣдованіяхъ, произв. въ 1896 г.

VIII ВЫПУСКЪ.—**Дунинъ-Горкавичъ, А. А.** Сѣверъ Тобольской губерніи. Опытъ описанія страны, ея естественныхъ богатствъ и промышленной дѣятельности ея населенія.

IX ВЫПУСКЪ.—Левъ Евграфовичъ Луговскій († 21 іюня 1897 г.)—Огчеть по Музею за 1896 г.—**Ката-новъ, Н.** Погребальные обряды тобольскихъ татаръ.—**Ката-новъ, Н.** Преданіе тобольскихъ татаръ о грозномъ царѣ Тамерланѣ.—**Крутовскій, В. М.** Очерки Туруханского края.—**Скалозубовъ, Н.** Народный календарь. Човѣръ, приимѣты о погодѣ и сроки сельскохозяйственныхъ работъ у крестьянъ Тобольской губ.—**Соколовъ, Е. Ф.** Положеніе начального народного образования въ Тобольской губ. за 1896/7 учебный годъ. (Стат. оч.) Съ 5-ю табл.—**Палопенженцевъ, Н. И.** Къ вопросу о положеніи крѣпостныхъ въ Тобольской губ. въ концѣ прошлаго стол.—**Костюрина, М. Н.** Крестьянская свадьба въ подгородныхъ деревняхъ г. Тобольска.—**Ката-новъ, Н.** Грамоты двухъ тобольскихъ архиастырей XVIII вѣка.—**Кориковъ, Л.** Пѣсни вогуловъ.

X ВЫПУСКЪ.—**Терновскій, А. А.** Систематический каталогъ библиотеки Тобольского Губ. Музея. Съ предисловіемъ и приложеніемъ «Алфавита имёнъ личныхъ, предметныхъ и географическихъ, встрѣчающихся въ «Каталогѣ», и дополнительными примѣчаніями.

XI ВЫПУСКЪ.—Составъ должностныхъ лицъ Тоб. Губ. Музея.—Уставъ Тоб. Губ. Музея, утв. 9 марта 1899 г.—**Маяревскій, Н.** О мѣрахъ къ улучшенню народного образования въ Тобольской губерніи. Съ прилож. 10 цифровыхъ таблицъ и списка училищъ.—Списокъ растеній флоры Тобольской губерніи, предназначенныхъ для обихода или продажи.



*Любить отчество велитъ природа, Богъ,
А знать ею—вотъ честь, достоинство и добъ.*

Учрежденный въ 1887 году въ память трехсотлѣтія Сибири на средства, собранныя частною подніскою, Тобольскій Губернскій Музей въ 1891 году удостоился посвѣщенія Государя Наслѣдника Цесаревича, нынѣ благополучно царствующаго Императора Николая II-го, милостию принялаго Музей подъ Свое покровительство.

Въ 1899 году Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ былъ утвержденъ новый уставъ Музея, первый параграфъ котораго такъ опредѣляетъ цѣль его:

«Музей имѣть цѣлью ознакомленіе публики съ Тобольской губерніе и съ раз-
витиемъ въ ней культуры во всѣхъ ея формахъ и проявленіяхъ посредствомъ своихъ
«коллекцій и материаловъ по всѣмъ отраслямъ естествознанія, этнографіи, истории, ста-
тистики, археологии, промышленности и проч., а также путемъ научной разработки со-
бранныхъ материаловъ».

Нынѣ, въ 1902 году, Музей вступаетъ въ 14-й годъ своего существованія. За этотъ періодъ дѣятельность Музея выразилась: 1) въ собраніи значительныхъ коллекцій для характеристики естественныхъ условій губерніи, ея исторического и доисторического прошлаго, ея современного населения, промысловъ его и занятій, 2) въ содѣйствіи лицамъ, предпринимающимъ работы по изслѣдованию губерніи и въ организаціи новыхъ работъ по изслѣдованию, 3) въ устройствѣ библіотеки, нынѣ очень обширной, находящейся въ обмѣнѣ изданіями съ большинствомъ ученыхъ учрежденій Россіи и заключающей драгоценныиѣ материалы по Сибири вообще и Тобольской губерніи въ частности, 4) въ изданіи Ежегодника Тобольскаго Губернскаго Музея, гдѣ публикуются работы по изслѣдованию губерніи и описание коллекцій Музея и котораго въ настоящее время вышло XII выпускъ, 5) въ періодическихъ собраніяхъ членовъ Музея, гдѣ обсуждаются вопросы, касающіеся изученія губерніи и выясненія вытекающихъ отсюда нуждъ населения, 6) въ организаціи объясненій коллекцій Музея для публики въ цѣлахъ популяризации полезныхъ знаній, 7) въ подачѣ советовъ, справокъ и указаний, касающихся разныхъ свѣдѣній о губерніи вообще и специально по сельскому хозяйству и промышленности, 8) въ подготовительныхъ работахъ къ открытию въ Тобольскѣ художественнаго Музея, при чмъ этому дѣлу нынѣ положень починъ извѣстныиѣ художникомъ С. В. Ивановымъ, пожертвовавшимъ Музею свою большую картину „Въ лѣсу“ (памяти Степана Пермскаго и друг. просвѣтителей инородцевъ).

Накопленный по сіе время коллекціи и разросшаяся библіотека заняли все помѣщеніе Музея, дѣлая для публики неудобнымъ осмотръ ихъ; эта же тѣснота лишаетъ Музей возможностей открыть его двери широко для всѣхъ, такъ какъ неубраныя въ шкафы, всюду разставленыя вещи страдаютъ отъ неосторожнаго обращенія при большомъ наплывѣ народа.

Такимъ образомъ въ настоящее время для развитія дѣятельности Музея первой необходимости является расширеніе помѣщенія его.

Распорядительный Комитетъ, имѣя въ виду, что первыя средства на устройство Музея были составлены частными пожертвованіями и что въ истекшія 13 лѣтъ оно существовало главныиѣ образомъ на тѣ же частныя средства, увѣренный въ общественной поддержкѣ этому общественному учрежденію и нынѣ, пользуясь данными ему собраниемъ членовъ Музея полномочіемъ, рѣшилъ открыть подписку для сбора пожертвованій на составленіе строительного капитала для расширенія зданія Музея, согласно первоначального проекта, который на собранія тогда средства (около 14000 руб.) выполненъ быть лишь въ половинѣ.

Симъ Распорядительный Комитетъ обращается ко всѣмъ, могущимъ оказать Музею денежную помощь для расширенія его помѣщенія, съ покорѣйшею просьбою о содѣйствіи, не стѣсняясь суммой жертвованія, такъ какъ даже при самой скромной цифрѣ его однѣ участіе ихъ своимъ именемъ въ этомъ мирскомъ дѣлѣ сообщить распорядителемъ Музея бодре чувство увѣрѣнности, что дѣло ими продолжаемое, находить себѣ поддержку въ сочувствіи общества.

Пожертвованія прѣятъ направлять въ Тобольскъ, въ Распорядительный Комитетъ Тобольскаго Губернскаго Музея.

Списки жертвователей и сумма сбора будуть публиковаться въ мѣсячныхъ газетахъ.

Независимо сего Комитетъ обращается съ покорѣйшей просьбою ко всѣмъ лицамъ, желающимъ оказать Музею содѣйствіе привлечениемъ жертвователей, получать книжки для сбора пожертвованій.

Предѣдатель Комитета Н. Козловъ, консерваторъ Н. Скалезубовъ, секретарь А. Ушаровъ.